INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 4: C12N 15/00, 1/20, 5/00 C12P 21/00, 21/02, A61K 37/02 A01N 1/00, G01N 33/86 C07K 13/00

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 88/07576

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

6. Oktober 1988 (06.10.88)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP88/00266

A2

(22) Internationales Anmeldedatum: 26. März 1988 (26.03.88)

(31) Prioritätsaktenzeichen:

P 37 10 309.1 P 37 10 364.4 P 37 10 430.6 P 37 37 367.6

(32) Prioritätsdaten:

28. März 1987 (28.03.87) 28. März 1987 (28.03.87) 28. März 1987 (28.03.87) 4. November 1987 (04.11.87)

(33) Prioritätsland:

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH [DE/DE]; Postfach 200, D-6507 Ingelheim am Rhein (DE).

(72) Erfinder:und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HAUPTMANN, Rudolf [AT/AT]; Döllachstr. 22, A-2483 Ebreichsdorf (AT). MAURER-FOGY, Ingrid [AT/AT]; Lindauergasse 35, A-1238 Wien (AT). BODO, GERHARD [AT/AT]; Belghofergasse 27/5, A-1120 Wien (AT). SWETLY, Peter [AT/AT]; Hietzinger Hauptstr. 40B, A-1130 Wien (AT). STRATOWA, Christian [AT/AT]; Schellinggasse 3/9, A-1010 Wien (AT). FALKNER, Edgar [AT/AT]; Strohberggasse 9/6, A-1120 Wien (AT). ADOLF, Günther [AT/AT]; Stiftgasse 15-17/10, A-1070 Wien (AT). REUTLINGSPERGER, Christian, Maria, Peter [NL/NL]; Looiersgracht 17, NL-6211 JK Maastricht (NL).

(81) Bestimmungsstaaten: DK, FI, HU, JP, KR, NO, SU,

Veröffentlicht

Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

(54) Title: VASCULAR ANTICOAGULANT PROTEINS, DNAs WHICH CODE FOR THEM, MANUFACTURE AND APPLICATION THEREOF

DE


(54) Bezeichnung: VASCULAR-ANTIKOAGULIERENDE PROTEINE, DNA DIE DIESE KODIEREN, UND HER-STELLUNG VERWENDUNG

(57) Abstract

The subject matter of the invention concerns biologically active proteins, DNA molecules which code for them, process for manufacturing them, and the application of said proteins.

(57) Zusammenfassung

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind biologisch aktive Proteine, die für diese kodierenden DNA- -Moleküle, Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwendung.



LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

			•		
AT	Österreich	FR	Frankreich	MR	Mauritanien
AU	Australien	. GA	Gabun	MW	Malawi
BB	Barbados	GB	Vereinigtes Königreich .	NL	Niederlande
BE	Belgien	HU	Ungarn	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	IT ·	Italien	RO	Rumänien
BJ	Benin	JP	Japan .	SD	Sudan
BR	Brasilien	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SN	Senegal
CG	Kongo	LI	Liechtenstein	SU	Soviet Union
CH	Schweiz	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
CM	Kamerun	LU	Luxemburg	TG	Togo
DE	Deutschland, Bundesrepublik	MC	Monaco	US	Vereinigte Staaten von Amerika
DK	Dänemark	MG	Madagaskar		
FI	Finnland	ML	Mali		

VASCULAR ANTIKOAGULIERENDE PROTEINE, DNA DIE DIESE KODIEREN, HERSTELLUNG UND VERWENDUNG

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind biologisch aktive Proteine, die für diese kodierenden DNA-Moleküle, Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwendung.

In den meisten Säugetieren existieren Proteine, die blutgerinnungshemmende Eigenschaften aufweisen. Diese Proteine können in drei Gruppen eingeteilt werden, wobei die Einteilung auf den unterschiedlichen Wirkmechanismen beruht.

- 1. Proteine, die mit dem Gerinnungsfaktor einen Komplex bilden und dadurch den Gerinnungsfaktor unwirksam machen. Dazu gehören die Proteine:
 - a) Antithrombin-III (Thromb.Res.5, 439-452 (1974))
 - b) α_1 -Protease Inhibitor (Ann. Rev. Biochem. <u>52</u>, 655-709 (1983))
 - c) α_2 -Makroglobulin (Ann. Rev. Biochem.. <u>52</u>, 655-709 (1983))
 - d) C₁-Inhibitor (Biochemistry <u>20</u>, 2738-2743 (1981))
 - e) Protease Nexin (J. Biol. Chem. <u>258</u>, 10439-10444, (1983)).
- Proteine, die einen Gerinnungsfaktor proteolytisch zerschneiden und dadurch den Gerinnungsfaktor desaktivieren. Als einziges Protein dieser Art ist bisher Protein C beschrieben (J. Biol. Chem. 251, 355-363, (1976)).
- 3. Proteine, die die negativ geladenen Phospholipide abschirmen und/oder hydrolisieren, so daß die Phospholipid-abhängigen Reaktionen des Blutgerinnungsmechanismus gehemmt werden. Bisher

sind nur Phospholipasen, die aus verschiedenen Schlangengiftsorten isoliert wurden, beschrieben worden (Eur. J. Biochem. <u>112</u>, 25-32 (1980)).

Das stufenweise ablaufende Gerinnungssystem ist in den letzten Jahren intensiv untersucht worden. Es wird als ein sich verstärkendes Mehrstufensystem verschiedener miteinander verbundener, proteolytischer Reaktionen verstanden, bei dem ein Enzym ein Zymogen in die aktive Form umsetzt (vgl. Jackson C.M., Nemerson Y., Ann. Rev. Biochem. 49, 765-811, (1980)). Die Geschwindigkeit dieser Reaktion wird in entscheidender Weise durch die Anwesenheit von Phospholipiden und anderer Kofaktoren wie Faktor Va und Faktor VIIIa vergrößert. In vivo werden die Prokoagulationsreaktionen durch verschiedene Inhibitationsmechanismen geregelt, die einem explosiv thrombotischen Trauma nach einer geringen Aktivierung der Gerinnungskaskade vorbeugen.

Die Antigerinnungsmechanismen können wie folgt eingeteilt werden (Rosenberg, R.D., Rosenberg, J.S., J. Clin. Invest. 74, 1-6 (1984)):

1. Der Serin-Protease-Faktor X_a und Thrombin werden infolge ihrer Bindung an Antithrombin III bzw. an den Antithrombin/Heparin-Komplex inaktiviert. Sowohl die Prothrombin-Aktivierung als auch die Bildung von Fibrin kann auf diese Weise gehemmt werden. Neben Anti-thrombin III gibt es noch verschiedene andere Plasma-Protease-Inhibitoren wie beispielsweise α_2 -Makroglobulin und Antitrypsin, deren Wirkung zeitabhängig ist.

- 2. Die Entdeckung des Protein C's führte zur Aufdeckung eines weiteren Antigerinnungsmechanismus. Ist das Protein C einmal aktiviert worden, wirkt es durch die selektive Proteolyse der Proteinkofaktoren Faktor V_a und VIII_a, durch die die Prothrombinase und das Enzym, das den Faktor X umsetzt, inaktiviert werden, als Antikoagulanz.
- 3. Plasmin spaltet monomeres Fibrin 1, ein Produkt der Einwirkung von Thrombin auf Fibrinogen, wodurch der Bildung eines unlöslichen Fibrins vorgebeugt wird (Nosssel, H.L., Nature, 291, 165-167 (1981)).

Von den oben genannten, in den Gerinnungsprozeß eingreifenden körpereigenen Proteinen ist z.Zt. nur das Antithrombin III in klinischem Einsatz. Als erheblicher Nachteil hat sich jedoch die bei der Anwendung dieses Proteins auftretende Erhöhung der Blutungsneigung herausgestellt.

Alle bisher als Antikoagulantien eingesetzten Mittel, ob körpereigener oder synthetischer Natur machen in irgendeiner Weise die Gerinnungsfaktoren unwirksam und führen dadurch zu Nebenwirkungen, die sich nachteilig auf den Gerinnungsprozeß auswirken können.

Überraschenderweise konnten nun neben diesen Proteinen weitere körpereigene Stoffe isoliert werden, die zwar die gewünschten blutgerinnungshemmenden Eigenschaften unter besonderen Bedingungen zeigen, hierbei aber die Blutungsgefahr nicht erhöhen. Bei größeren Blutungen verlieren diese Proteine ihre blutgerinnungshemmenden Eigenschaften und stören dadurch bei deren Verwendung

nicht die in solchen Fällen überlebensnotwendigen Gerinnungsprozesse. Da sie erstmals isoliert wurden aus stark vaskularisiertem Gewebe, wurden sie "vascular anticoagulating proteins", VAC genannt.

Die aus stark vaskularisierten Geweben wie Nabelschnurgefäßen und Placenta isolierten Proteine weisen Molekulargewichte von ca. 70×10^3 , ca. 34×10^3 und ca. 32×10^3 auf, von denen die Substanzen mit den Molekulargewichten 34 respektive 32×10^3 aus einer einzigen Polypeptidkette bestehen. Die genaue biochemische Charakterisierung dieser Proteine, sowie deren Isolierung und Reinigung findet sich in der EP-A-O 181 465 vom 21. Mai 1986.

Proteine mit VAC Aktivitität stellen natürliche Blutgerinnungshemmstoffe dar, die bei der Blutgerinnungskaskade an zwei Stellen eingreifen.

Das erste Mal inhibieren sie bei der durch die Faktoren IXa und VIIIa katalysierten Aktivierung des Faktors X zu Xa, das zweite Mal unterbinden sie die Spaltung von Prothrombin zu Thrombin, die durch die Faktoren Xa und Va vermittel wird. Beiden Aktivierungsschritten ist gemeinsam, daß sie Kalzium-Ionen und Phospholipide benötigen. Offenbar können VAC-Proteine ebenfalls mit Phospholipiden in Wechselwirkung treten, und durch diese Bindung die Aktivierungsschritte der Gerinnnungsfaktoren blockieren.

Ihre Eigenschaften machen die Proteine zu interessanten, pharmakologisch äußerst wertvollen Wirkstoffen. Um sie jedoch in ausreichenden Mengen in hochreiner Form zur Verfügung zu haben ist deren Herstellung auf anderen als proteinreinigendem Weg aus natürlichem Gewebe erforderlich. Hierzu bietet sich die gentechnische Methode an.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war daher, Proteine mit VAC-Aktivität gentechnisch herzustellen.

Gelöst wurde diese Aufgabe dadurch, daß die Aminosäuresequenz von Teilen der aus stark vaskularisiertem Gewebe isolierten und hochgereinigten Proteine mit VAC-Aktivität (EPA 0 181 465) aufgeklärt wurde, anhand dieser Sequenzen synthetische DNA-Sonden hergestellt wurden und hiermit geeignete cDNA-Bibliotheken durchsucht wurden. Nach Isolierung von mit den Sonden hybridisierender cDNA, deren Sequenzbestimmung sowie entsprechender Manipulation wurden diese cDNA in geeigneten Wirtssystemen beispielsweise in Bakterien, Hefen oder Säugetierzellen zur Expression gebracht.

Eines von den gereinigten Proteinen wurde enzymatisch mit Trypsin gespalten. Die entstandenen Peptide wurden aufgetrennt und ausgewählte Fragmente sequenziert. Die Sequenz des N-Terminus widersetzte sich jedoch einer direkten Analyse, da die erste Aminosäure offensichtlich blockiert ist.

Die Sequenzinformationen sind in Fig. 0.1 aufgeführt.

Zur Herstellung einer geeigneten DNA-Sonde sind prinzipiell drei Wege möglich. Ist ein längerer Abschnitt des Proteins, etwa 30 oder mehr Aminosäuren lang, bekannt, besteht die Möglichkeit, unter Beachtung der bevorzugt verwendeten Codons bei Säugern eine

wahrscheinlichste Sequenz für den korrespondierenden mRNA Abschnitt zu erstellen. Eine solche Sonde ist im schlechtesten Fall etwa 66% homolog zur tatsächlichen Sequenz. Dies ist auch der Grund, weshalb die Sonde relativ lang sein müßte, um unter nicht stringenten Bedingungen hybridisieren zu können.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, für einen kurzen Peptidabschnitt, ca. sechs bis sieben Aminosäuren lang, alle erdenklichen Variationen an Oligonukleotiden zu synthetisieren. Werden solch komplexe Mischungen beim Durchsuchen von cDNA-Bibliotheken verwendet, können relativ viel "falsch" positiv reagierende Klone isoliert werden. Außerdem kann das Hybridisierungssignal sehr schwach ausfallen, da das perfekt passende Einzeloligonukleotid nur einen geringen Anteil an der Gesamtmischung ausmacht.

Der dritte Weg umgeht zwar nicht die Variabilität einer Oligonukleotidsonde, sorgt aber durch die Wahl eines speziellen Nukleosidtriphosphats (ITP) dafür, daß an die gesuchte (oder auch "falsche") cDNA alle Moleküle der Sonde binden können. So wurden zu dem Tryptischen Peptid [P30/I] passende 23 Basen lange Oligonukleotide unter Verwendung von Inosintriphosphat synthetisiert.

Wie bereits erwähnt, können VAC-Proteine aus stark vaskularisiertem Gewebe isoliert werden. Gewebe der Wahl sind Nabelschnurgefäße oder Placenta. Daher und da bekannt ist, daß in der Placenta im Gegensatz zu anderen Spezial-Geweben fast alle Gene exprimiert werden, wurden die oben erwähnten DNA-Sonden verwendet, um eine placentale cDNA-Bibliothek die aus placentalen Gewebe in an sich bekannter Weise hergestellt worden war nach cDNA-Molekülen, die für VAC-Proteine kodieren, zu durchsuchen.

Zum Durchsuchen der cDNA-Bibliothek nach für VAC-protein kodierender cDNA wurden entsprechend der Sequenzen des tryptischen Peptides P16/II zwei und des Staph A Peptides P20/I/6 ein Oligonukleotid synthetisiert (Fig.1). Diese Oligonukleotide stellen jeweils eine Mischung aller Varianten dar, die jede Kodierungsmöglichkeit der entsprechenden mRNA berücksichtigen. EBI-386 weist bei einer Kettenlänge von 20 Nukleotiden 512 Variationen auf und paßt zu dem Staph-A Peptid P20/I/6. Um die Variation bei dem Oligonukleotid für das tryptische Peptid P16/II niedriger zu halten, wurden zwei Oligonukleotide (20-mere) synthetisiert: EBI-387: 128 Variationen, EBI-388: 64 Variationen.

Weiters wurden zu dem tryptischen VAC-Peptid P30/I passend zwei Oligonukleotide unter Verwendung von Desoxyinosin als Base bei "Wobble" Positionen synthetisiert (Fig.2): EBI-118 und EBI-119. Diese Substitution wurde von E. Ohtsuka et al., J. Biol. Chem. 260/5 (1985), pp.2605-2608, sowie Y. Takahashi et al., Proc. Nat. Acad. Sci. (1985) pp.1931-1935, beschrieben. Inosin basenpaart gut mit Cytosin, stört jedoch kaum die Ausbildung der Doppel-helix, wenn andere Nukleotide als Partner angeboten werden.

Nachdem jedes dieser Oligonukleotide in bekannter Weise radioaktiv markiert worden war, wurden Abzüge von Phagen-Platten hiermit nach bekannten Verfahren hybridisiert.

Aus der Hybridisierung mit EBI-386, -387 und -388 resultierten die Phagen Lambda-Pll/3, Lambda-P6/5, Lambda-P6/6. Die Hybridisierung mit EBI-ll8 und -ll9 resultierte in den Phagen Lambda-Nrl5, Lambda-Nrl9 und Lambda-Nr22.

Die aus den Phagen isolierten DNAs wurden mit EcoRI geschnitten und die entstehenden Fragmente isoliert. Die cDNA Inserts der Klone Lambda-P11/3, Lambda-P6/5 und Lambda-P6/6 hatten Größen von etwa 1300 bis 1400 bp. Die Sequenzanalyse zeigte, daß alle drei Klone von ein und derselben mRNA abgeleitet waren. Das 5'Ende der mRNA fehlte jedoch in den cDNAs. Die Inserts der Phagen Lambda-Nr15, Lambda-Nr19 und Lambda-Nr22 hatten Längen von ca. 1600, 1100 und 1000 bp. Die Sequenzanalyse ließ eine annähernd vollständige cDNA vermuten.

Die cDNAs der beiden Phagengruppen Lambda-Pll/3,
Lambda-P6/5 und Lambda-P6/6 sowie Lambda-Nrl5,
Lambda-Nrl9 und Lambda-Nr22 sind von zwei verschiedenen
mRNAs abgeleitet, wie die Sequenzanalyse ergab. Die
EcoRI Inserts der drei Klone Lambda-Pll/3, Lambda-P6/5
und Lambda-P6/6 wurden isoliert und in den
EcoRI-geschnittenen Bluescribe Ml3 Vektor ligiert
(Vector Cloning Systems, 3770 Tansy Street, San Diego,
CA 92121, USA). Die resultierenden Klone wurden pP6/5,
pP6/6 und pP11/3 genannt.

Die EcoRI Inserts der drei Klone Lambda-Nr15, Lambda-Nr19 und Lambda-Nr22 wurden isoliert und in den EcoRI-geschnittenen Bluescribe M13 Vektor ligiert. Die resultierenden Klone wurden pRH201, pRH202 und pRH203 genannt.

Um weitere cDNA Klone zu erhalten, wurde die humane, plazentale Lambda-gtlo Bibliothek nochmals durchsucht, diesmal mit dem radioaktiv markierten EcoRI-Insert des pPll/3 als Sonde.

Insgesamt wurden 69 positiv reagierende Klone erhalten (Lambda-VACl bis Lambda-VAC69).

12 dieser Klone wurden im kleinen Maßstab wie oben beschrieben präpariert, die cDNA Inserts mit Eco RI freigesetzt und isoliert. Dabei zeigte sich, daß das Insert des Klons Lambda-VAC10 den gesamten für VAC Protein kodierenden Leserahmen enthält. Zur Charakterisierung der für VAC-alfa und VAC-beta kodierenden cDNAs wurden ein Northernblot-Experiment, Sequenzanalysen und eine genomische Southernblot-Analyse durchgeführt.

Das Ergebnis ist in Fig.3 abgebildet. Die cDNA des Klons pPl1/3 hybridisiert an eine mRNA der Größe von etwa 1700 Basen ("VAC-alpha"), die cDNA des Klons pRH 203 an eine mRNA der Größe von etwa 2200 Basen ("VAC-beta").

Da erstens die eingesetzte Radioaktivitätsmenge sowie die aufgetragene Menge mRNA pro Spur etwa gleich war und zweitens die Hybridisierung eines Genom-Blots in derselben Lösung Banden gleicher Intensität mit beiden cDNAs ergab (siehe unten), ist zu schließen, daß die kürzere mRNA ("VAC-alfa") in größeren Mengen als die längere ("VAC-beta") mRNA in Plazenta vertreten ist.

Zur Sequenzanalyse der VAC-alfa cDNA wurden die cDNA Klone pP6/5, pP6/6 und pP11/3 total, sowie die der Klone Lambda-VACl bis -12 partiell sequenziert. Das Resultat ist in Fig.4 abgebildet. Es wurden insgesamt 1465 Basen sequenziert. Die cDNA weist einen langen, offenen Leserahmen auf, der für 320 Aminosäuren kodieren kann. Wird die DNA Sequenz in eine Aminosäuresequenz übersetzt, so können alle sequenzierten Peptide der tryptischen Fragmente in dieser Sequenz untergebracht werden (Fig.5). Es handelt sich daher bei dieser cDNA um jene, deren

korrespondierende mRNA für VAC-protein kodiert. Da die Sequenzen der zweiten isolierten cDNA für ein ähnliches, aber von VAC verschiedenes Protein kodiert, wird hier der Name VAC-alfa eingeführt.

Dem ersten ATG-Codon (Basen 35-37) geht im selben Leserahmen ein Stop-Codon voran. Die Basen 30 bis 38 erfüllen ziemlich gut die Kozakregel (M. Kozak, Nature 308 (1984), pp. 241-246), die die Konsensussequenz in der Nähe des Translationsstartcodons mit CC(A/G)CCAUGG angibt, die entsprechende Sequenz hier lautet TCGCTATGG. Die 3' nichttranslatierte Region ist 471 Basen lang. 15 Basen vor Beginn des poly-A Abschnitts befindet sich die Polyadenylierungssequenz AATAAA (N.J.Proudfoot et al., Nature 263 (1976), pp. 211-214). Wird eine Kettenlänge von 150 bis 200 Basen für den Poly-A Abschnitt der mRNA gerechnet, beträgt die Gesamtlänge der mRNA auf Grund der cDNA Sequenz 1600-1650 Basen. Da im Northern Blot Experiment ein höherer Wert bestimmt wurde, ist die 5'nichttranslatierte Region in keiner cDNA komplett enthalten.

Die cDNA des Klons pP6/5 weist im Gegensatz zu allen anderen cDNA Klonen an Position 100 C statt A auf.

Dadurch würde sich das Triplett 98-100 (22. Codon) von GAA nach GAC ändern und für Asp anstelle von Glu kodieren. Diese Abweichung kann mehrere Ursachen haben: a) die Reverse Transkriptase baute ein falsches Nukleotid ein, b) es handelt sich um die Transkripte zweier alleler, an dieser Stelle verschiedener Gene oder c) es gibt zwei nicht allele Gene, die sich an dieser Position unterscheiden.

ورود واوو م

Der lange, offene Leserahmen kodiert für ein Protein mit 320 Aminosäuren, von dem das Met-l wahrscheinlich abgespalten, und das folgende Alanin an der Aminogruppe, möglicherweise durch Acylierung, blockiert wird. Das errechnete Molekulargewicht beträgt 35.896 D und ist höher als der Wert nach SDS-PAGE. Allerdings ist der Anteil geladener Aminosäuren (Asp. Glu. Lys. Arg. His) mit 30,6 % (98/320) überdurchschnittlich hoch verglichen mit dem durchschnittlichen Wert von 25,1 %. Dies würde das veränderte Wanderungsverhalten des Proteins bei der SDS-PAGE erklären. Innerhalb der stark geladenen Aminosäuren überwiegen die sauren Aminosäuren (Asp und Glu) mit 54 gegenüber den basischen (Lys und Arg) mit 41. Dies erklärt den sauren, isolektrischen Punkt des VAC-alfa Proteins (pI=4,4 bis 4,8) VAC-alfa enthält nur ein für Cystein codierendes Triplett (Aminosäure-Position 316); eine typische N-Glykosylierungsstelle (Asn-XXX-Ser/Thr) ist nicht vorhanden.

Eine Strukturanalyse der Aminosäuresequenz

(modifiziert nach Pustell, J et al., Nucleic Acids
Res. 10 (1982) pp 4765-4782) ergibt eine vierfache

Wiederholung einer 67 Aminosäure langen Sequenz

(Fig.6), im folgenden "Repeats" genannt. Innerhalb

dieser Sequenz sind 7 Aminosäuren (10,4%) in allen

vier Repeats konserviert, 15 Aminosäuren (22,4%)

kommen in drei von vier Repeats vor, an 28 Positionen

(41,8%) enthalten jeweils zwei Repeats dieselbe

Aminosäure.

Ein Vergleich mit publizierten Literaturdaten (M.J.Geisow, FEBS Letters 203 (1986), pp. 99-103, M.J.Geisow et al., TIBS 11 (1986), pp. 420-423) ergab überraschenderweise, daß VAC-alfa damit zu einer

größeren Gruppe Ca⁺⁺ abhängiger
Phospholipidbindungsproteine gehört. Es wird eine
Konsensussequenz beschrieben (Lys-Gly-fob-Gly-ThrAsp-Glu-var-var-Leu-Ile-fil-Ile-Leu-Ala-fob-Arg;
fob=hydrophob, fil=hydrophil, var=variabel), die an
der Ca⁺⁺ Bindung beteiligt sein könnte (M.J.Geisow
et al., Nature 320 (1986), pp. 636-638). Diese Sequenz
findet sich in jeder der vier wiederholten 67
Aminosäure langen Subsequenzen der erfindungsgemäßen
Proteine (Fig.6).

Auffällig ist auch der 6 Aminosäuren lange Abschnitt am Ende jeder Repeat, der fast ausschließlich aus hydrophoben Aminosäuren besteht ("oooooo" in Fig.6).

Die Sequenzanalyse der Klone Nr15, Nr19 und Nr22 ergab für die VAC-beta cDNA 1940 bp. die in einen poly-A Abschnitt übergeht (Fig.7). 16 Basen vor dem poly-A Abschnitt findet sich das Polyadenylierungssignal AATAAA. Allerdings kommt diese Konsensussequenz bereits an der Nukleotidposition 1704-1709 vor. Weshalb diese Sequenz nicht als Polyadenylierungssignal verwendet wird, ist unbekannt. Die zusätzlich erforderliche Sequenz an der 3'Seite der AATAAA Sequenz, YGTGTTYY (Gill A. et al., Nature 312 (1984), pp. 473-474) kommt erst relativ weit entfernt vor (TGTGTTAT, Position 1735-1742); möglich, daß dies die Erklärung für ein Nichtakzeptieren dieser ersten Polyadenylierungssequenz darstellt.

Die cDNA enthält einen langen, offenen Leserahmen, der vom Beginn der cDNA bis Position 1087 reicht. Er würde ein Kodierungspotential für 362 Aminosäuren beinhalten. Aus Analogiegründen zu VAC-alfa und aufgrund der Tatsache, daß auch ein 34.000 D Protein

bei der Reinigung von VAC anfällt (siehe E.P.A. 181.465) wurde das erste Methioninkodon (ATG, Position 107-109) als Translationsstart angenommen. Die Kozakregel ist hier nicht so gut erfüllt wie bei VAC-alfa (AAGAGATGG auf Position 102-110): Das resultierende Protein (VAC-beta) ist 327 Aminosäuren lang. Es besitzt 4 Cysteinreste (Aminosäureposition 161, 206, 250 und 293) und eine potentielle N-Glykosylierungsstelle (Asn-Lys-Ser, Aminosäureposition 225-227). Das errechnete Molekulargewicht beträgt 36.837 (Fig.9). Auch in VAC-beta gibt es überdurchschnittlich viele geladene Reste: 97/327 (29,6%), wobei die sauren Aminosäuren (Asp+Glu: 49) über die basischen (Lys+Arg 42) überwiegen; eine Erklärung für das nach SDS-PAGE ermittelte niedrigere Molekulargewicht.

Auch VAC-beta zeigt eine interne Wiederholung einer 67
Aminosäuren langen Sequenz Fig.8). Innerhalb dieser
Sequenz sind 7 Aminosäuren (10,4%) in allen vier
Repeats konserviert, 17 Aminosäuren (25,4%) kommen in
drei von vier Repeats vor, an 25 Positionen (37,7%)
enthalten jeweils zwei Repeats dieselbe Aminosäure.
Auch VAC-beta zeigt gute Übereinstimmung mit der 17
Aminosäuren langen Konsenussequenz. Die Ausführungen
zum VAC-alfa gelten analog für VAC-beta.
Durch gezielte Mutationen in diesem Bereich könnte
versucht werden, die biologische Aktivität der
Proteine zu verändern. Erfindungsgemäßen Mutationen
sehen beispielsweise den vollständigen oder teilweisen
Ersatz der für die 17 Aminosäuren der konservierten
Region kodierenden Bereiche vor.

Bei dem Vergleich der Proteine stellt man fest, daß der auffälligste Unterschied zwischen den Proteinen bei den N-terminalen Peptiden vorliegt. Erfindungsgemäße Modifikationen sehen daher den gegenseitigen Austausch dieser N-terminalen Peptide vor. Herstellen lassen sich diese modifizierten Proteine dadurch, daß die für diese N-terminalen Peptide kodierenden DNA-Moleküle, beispielsweise durch Oligonukleotidsynthese in an sich bekannter Weise hergestellt werden und mit der "Rest-DNA", die für die verbleibenden Repeats und die Linker-Abschnitte kodiert, ligiert wird. Mit dieser DNA versehene Expressionsvektoren können in bekannter Weise in geeigneten Wirtsorganismen zur Expression gebracht werden; das exprimierte Protein wird isoliert und gereinigt.

Die Analyse chromosomaler DNA aus humaner Plazenta nach Southern zeigt ein komplexes Bild. Die DNA wurde mit EcoRI, HindIII, BamHI und PstI geschnitten. auf Nitrozellulose transferierte DNA wurde sowohl mit einer VAC-alfa DNA (pPll/3) als auch mit einer VAC-beta DNA (pRH203) hybridisiert. Obwohl das Waschen der Filter unter stringenten Bedingungen erfolgte, ergaben sich bei jedem Verdau relativ viele Banden (Fig.10). Der Vergleich der beiden Blots zeigt, daß die Kreuzreaktion von VAC-alfa und -beta DNA unter diesen Bedingungen eher auszuschließen ist. Die Vielzahl der Banden ist entweder durch die Existenz jeweils ähnlicher Gene zu dem VAC-alfa bzw. VAC-beta Gen zu erklären, oder aber es handelt sich um jeweils ein Gen, das durch viele und/oder lange Introns unterbrochen ist.

In Fig.11 ist der Vergleich der Aminosäuresequenzen von VAC-alfa mit VAC-beta wiedergegeben. Die wiederholten Strukturen lassen sich in beiden Proteinen gleich anordnen. Die Verbindungspeptide sind ebenfalls gleich lang mit Ausnahme jener zwischen der 2. und 3. Repeat. In dieses Verbindungspeptid muß bei VAC-alfa eine Lücke eingeführt werden, um eine optimale Anpassung der beiden Sequenzen zu erlauben. Das N-terminale Peptid der beiden Proteine ist unterschiedlich lang, 19 Aminosäuren bei VAC-alfa, 25 Aminosäuren bei VAC-beta. Dieses Peptid weist auch die geringste Homologie auf. Die beiden Proteine sind an 176 von 320 Aminosäurepositionen ident, was einem Homologiegrad von 55,0% entspricht.

An dieser Stelle sei auch der Vergleich der Nukleotidsequenzen der VAC-alfa und -beta cDNAs eingefügt. Werden zwei Gene und deren Produkte miteinander verglichen, sieht man auf der DNA (=RNA) Ebene eine größere Homologie als auf der Aminosäureebene, was durch die Tatsache erklärt ist, daß bei der Nukleinsäure bereits eine Veränderung in einem Basentriplett ausreicht, um eine neue Aminosäure zu kodieren.

In Fig.12 ist der Vergleich der kodierenden Regionen von VAC-alfa und VAC-beta cDNA wiedergegeben. Überraschenderweise zeigen die DNAs nur einen Homologiegrad von 54,2%, also etwas weniger als die beiden Proteine.

In Fig.13 sind die Hydrophilizitätsprofile der beiden Proteine abgebildet. Dabei wurde der Algorithmus von Hopp und Wood verwendet (T.P.Hopp et al., Proc.Natl.Acad.Sci. 78 (1981) pp.3824-3828). Die vier

11 - 00,010.0

Repeatbereiche sind durch die Balken angedeutet, die Verbindungspeptide in der darunter angegebenen Sequenz eingerahmt. Überraschenderweise ist das Verbindungspeptid zwischen der zweiten und dritten Repeat besonders hydrophil. In diesem Peptid befindet sich sowohl bei VAC-alfa als auch bei VAC-beta ein Arginin an identer Position. Es wäre daher möglich, daß dieses Arginin einen bevorzugten Angriffspunkt für eine Protease mit trypsinartiger Spezifität darstellt. Dabei müßte das Molekül in zwei etwa gleich große Hälften zerfallen. Es wäre denkbar, daß bereits ein solches "Halbmolekül" eine biologische, beispielsweise eine antikoagulierende Wirkung entfalten kann. Neben dem gezielten Verdau des Proteins beispielsweise mit einer Protease trypsinartiger Spezifität lassen sich diese Halbmoleküle oder Halbmoleküle mit geringen Modifikationen auf vielfältige Weise darstellen. So ist es möglich, die für diese Halbmoleküle kodierenden DNA-Moleküle, die nach an sich bekannten Verfahren herstellbar sind in geeignete Expressionsvektoren so einzufügen, daß diese DNA von den Expressionskontrollsequenzen reguliert wird und durch Kultivierung eines mit diesen Vektoren transformierten Wirtsorganismus die Halbmoleküle zu exprimieren, zu isolieren und zu reinigen.

Halbmoleküle mit geringen Modifikationen erhält man beispielsweise durch Einfügung von Spaltstellen, die dem vollständigen Protein die für bestimmte Proteasen erforderliche Spezifität verleihen. So läßt sich beispielsweise ein Protein mit einer Spaltstelle mit Faktor Xa-artiger Spezifität herstellen, indem in dem Abschnitt, der für die Linker-Sequenz zwischen der zweiten und dritten Repeat-Struktur kodiert, ein Oligonukleotid eingefügt wird, das für das

Erkennungs-Tetrapeptid der Faktor-Xa-Protease kodiert. Hierdurch erhält man zunächst ein vollständiges Protein, das möglicherweise veränderte Eigenschaften, beispielsweise veränderte Stabilität gegenüber proteolytischem Angriff aufweist, andererseits aber eine hochspezifische Spaltstelle für die Faktor Xa-Protease enthält, wodurch gezielt zwei Halbmoleküle hergestellt werden und zum therapeutischem Einsatz gelangen können.

Durch gezielte Mutation der für Proteine mit VAC-Aktivität kodierenden DNA lassen sich außerdem Proteine herstellen, die einem proteolytischen Angriff besser widerstehen. So führt möglicherweise der Austausch des VAC-alfa und VAC-beta gemeinsamen Arginins zwischen der zweiten und dritten Repeat-Struktur durch z.B. Histidin zu besserer Stabilität der Proteine. Auch der gezielte Ersatz der übrigen Arginine und der Lysine durch Histidin, möglich durch Ersatz der entsprechenden Codone führt zu Proteinen, die erschwert durch Trypsin hydrolisiert werden können. Diese gezielten Mutationen lassen die biologischen, beispielsweise antikoagulierenden Eigenschaften der Proteine/Polypeptide im wesentlichen unbeeinflußt, führen andererseits jedoch zur Veränderung, beispielsweise zur Verbesserungen der Stabilität der Proteine, d.h. zu einer Veränderung der Halbwertszeit der Proteine.

In manchen Fällen ist es, beispielsweise für die Expression von Proteinen vorteilhaft, dem reifen, gewünschten Protein/Polypeptid eine Signalsequenz oder auch eine dem Wirtsorganismus eigene Proteinsequenz vorzuschalten, so daß als Expressionsprodukt ein Fusionsprotein entsteht. Die für ein Signalpeptid

** ~ 00/01210

kodierende Signalsequenz kann microbieller Herkunft sein oder aus Säugetierzellen stammen; vorzugsweise ist das Signalpeptid homolog zu dem Wirtsorganismus. Um diese Produkte in das gewünschte reife Protein überführen zu können, bedarf es einer spezifischen Spaltstelle zwischen dem Signal-/Fusionsanteil und dem reifen Protein. Hierzu kann man beispielsweise, wie oben beschrieben, an dieser Stelle ein Oligonukleotid einfügen, das für das Erkennungs- Tetrapeptid der Faktor-Xa-Protease kodiert. Hierdurch läßt sich das exprimierte Fusionsprotein gezielt mit der Faktor-Xa-Protease spalten. Man erhält das reife Protein.

Ersetzt man gezielt die für Methionin verantwortlichen Codone, außer dem an Aminosäureposition 1, durch Codone, die für Leucin, Isoleucin oder Valin kodieren, so läßt sich ein eventuell erhaltenes unreifes- oder Fusionsprotein durch BrCN-Spaltung in das reife Protein überführen.

Sollte sich erweisen, daß derart modifizierte Proteine gleiche oder gegebenenfalls verbesserte biologische Eigenschaften aufweisen, so wäre dies ein möglicher Weg zur Ausbeutesteigerung und gegebenenfalls ein Verfahren zur Herstellung von Proteinen mit besseren Eigenschaften als die natürlichen VAC-Proteine.

Als weitere gezielte Mutation ist der gezielte Austausch von einem, gegebenenfalls mehreren Cysteinen durch Serin oder Valin zu nennen, indem die entsprechenden Codone ausgetauscht werden. Beeinflußt dieser Austausch die biologische Aktivität nicht nachteilig, so könnte dieser Weg eine Verbesserung der Isolierung und/oder Ausbeute der Proteine bewirken. Nicht auszuschließen ist auch hierbei eine Verbesserung der Eigenschaften der Proteine. Als

weitere Mutation ist die Kombination verschiedener vollständiger- oder Teil- Sequenzen der für die erfindungsgemäßen Proteine kodierenden DNAs vorgesehen, wodurch Hybridproteine mit vascular-antikoagulierenden Eigenschaften erhalten werden. Alle durch diese oder ähnliche Mutationen erhältlichen Proteine, die für diese kodierenden DNAs, deren Herstellung und Verwendung sind ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfindung.

Aus Fig. 13 ist weiterhin leicht zu erkennen, daß weder VAC-alfa noch VAC-beta einen längeren, hydrophoben Bereich aufweisen, der entweder die Sekretion durch, oder das Einlagern der Proteine in eine Membran erlauben würde. Es ist daher anzunehmen, daß es sich bei VAC-alfa und VAC-beta um intrazelluläre Proteine handelt.

Wallner et al (Nature 320 (1986), pp.77-81) berichten die Struktur des humanen Lipocortin I, Saris et al. (Cell 46 (1986), pp.201-212) und Huang et al. (Cell 46 (1986), pp. 191-199) die Struktur des murinen bzw. humanen Calpactin I, das auch Lipocortin II genannt wird. Drese Proteine gehören ebenfalls zu der Klasse der Ca⁺⁺ abhängigen Phospholipidbindungsproteinen. Ihre Struktur läßt sich analog zu VAC-alfa und -beta anschreiben (Fig.14). Die Homologien zwischen VAC-alfa und VAC-beta sind jedoch ausgeprägter als jene zwischen VAC und Lipocortin:

VAC-alfa - VAC-beta : 55.0%

VAC-alfa - Lipocortin I : 41,9%

VAC-alfa - Lipocortin II : 43.8%

VAC-beta - Lipocortin I : 41,7%

VAC-beta - Lipocortin II : 44,6%

Anzunehmen ist daher, daß auch die Lipocortine aufgrund ihrer analogen Struktur antikoagulierende Wirkung haben, und demzufolge als Antikoagulanzien einzusetzen sind und

weiterhin, daß dies eine generelle Eigenschaft dieser Klasse von Ca⁺⁺ abhängiger Phospholipidbindungsproteine ist. Aufgrund der analogen Strukturen läßt sich auch erklären, daß die erfindungsgemäßen Proteine neben der antikoagulierenden Wirkung auch die Eigenschaften der breits bekannten Ca⁺⁺ abhängigen Phospholipidbindungsproteine aufweisen. Beispielhaft genannt seien hier die antiinflammatorischen Eigenschaften der Lipocortine. Die diesen Proteinen eigene Phospholipase Inhibitor-Wirkung konnte auch für die erfindungsgemäßen Proteine nachgewiesen werden.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher auch die Verwendung der erfindungsgemäßen Proteine als antiinflammatorische Mittel sowie die Verwendung der erfindungsgemäßen Proteine bei der Behandlung sämtlicher für die Lipocortine geltenden Indikationen wie beispielsweise rheumatische Erkrankungen. Auch für diesen Einsatzzweck lassen sich die, den natürlichen Proteinen entsprechenden erfindungsgemäßen Produkte in der bereits erwähnten Weise abändern und deren Eigenschaften gegebenenfalls verbessern.

Bei dem Vergleich der Proteine VAC-alfa, VAC-beta, Lipocortin I und Lipocortin II stellt man fest, daß der auffälligste Unterschied zwischen den Proteinen bei den N-terminalen Peptiden vorliegt, insbesondere zwischen den VAC-Proteinen auf der einen und den Lipocortinen auf der anderen Seite. Eine erfindungsgemäße Modifikation sieht daher den gegenseitigen Austausch dieser N-terminalen Peptide vor. Herstellen lassen sich diese modifizierten Proteine dadurch, daß die für diese N-terminalen Peptiden kodierenden DNA-Moleküle, beispielsweise durch Oligonukleotidsynthese in an sich bekannter Weise hergestellt werden und mit der "Rest-DNA", die für die

verbleibenden Repeats und die Linker-Abschnitte kodiert, ligiert wird. Mit dieser DNA versehene Expressionsvektoren können in bekannter Weise in geeigneten Wirtsorganismen zur Expression gebracht werden; das exprimierte Protein wird isoliert und gereinigt.

Viele Mitglieder der Ca⁺⁺ abhängigen Phospholipidbindungsproteine binden an gereinigte sekretorische Vesikel oder andere Bestandteile des Cytoskeletts (siehe R.H.Kretsinger et al., Nature 320 (1986), p.573 für eine Zusammenfassung). Bei der Sekretion kapseln sich die Vesikel vom Golgi-Apparat der Zelle ab, wandern zur Zellmembran und fusionieren mit ihr. Dabei wird der Inhalt der Vesikel von der Zelle freigesetzt. In Analogie zur Kupplung von Erregung mit der Muskelkontraktion wurde vorgeschlagen (W.W.Douglas, Br.J.Pharmac. 34 (1968), 451), daß auch der Stimulus und die Sekretion über Ca⁺⁺ gekoppelt ist. Dabei könnten die Ca⁺⁺ abhängigen Phospholipidbindungsproteine eine wichtige Rolle spielen. In der konservierten, 17 Aminosäuren langen Region jeder Repeat besitzt VAC-alfa 5 bis 6 Hydroxylgruppen-enthaltende Aminosäuren (Asp, Glu, Thr. Ser), jeweils drei davon an identischer Position. Bei VAC-beta finden sich in jeder Repeat vier dieser Aminosäuren. Obwohl keines der Proteine die in Calmodulin, Troponin C, S-100 und Parvalbumin beobachtete EF-Hand Struktur aufweist (R.H.Kretsinger et al., CRC Crit. Rev.Biochem. 8 (1980), pll9), die in diesen Molekülen für die Ca⁺⁺ Bindung verantwortlich ist, verleitet die Konservierung dieses Unterabschnitts in jeder Repeat zu dem Schluß, daß diese Region für die Ca++ Bindung verantwortlich ist.

Durch gezielte Mutationen in diesem Bereich könnte versucht werden, die biologische Aktivität der Proteine zu verändern. Erfindungsgemäßen Mutationen sehen beispielsweise den vollständigen oder teilweisen Ersatz der für die 17 Aminosäuren der konservierten Region kodierenden Bereiche vor:

kodierenden Bereiche vor:

a. aus den VAC-Proteinen durch Bereiche, die die
entsprechenden Aminosäuren der Lipocortine kodieren,
b. aus VAC-alfa durch Bereiche, die die entsprechenden
Aminosäuren des VAC-beta kodieren und umgekehrt,
c. aus Lipocortin I durch Bereiche, die die entsprechenden
Aminosäuren des Lipocortins II kodieren und umgekehrt,
d. aus den Lipocortinen durch Bereiche, die die
entsprechenden Aminosäuren der VAC-Proteine kodieren oder
e. bei den übrigen Polypeptiden/Proteinen durch Bereiche,
die die entsprechenden Aminosäuren der jeweils anderen
Polypeptiden/Proteine kodieren,
indem die entsprechenden für diese Aminosäuren kodierenden
Bereiche ausgetauscht werden.

Die oben erwähnte analoge Struktur läßt außerdem erwarten, daß Proteine, die diese Analogie aufweisen, sowohl antiinflammatorische als auch antikoagulierende Wirkung zeigen und daher entsprechend therapeutisch und/oder prophylaktisch einsetzbar sind.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher insbesondere die Verwendung der Polypeptide als antiinflammatorische Mittel, als antirheumatische Mittel, in den für die Lipocortine geltenden Indikationen, die Verwendung der Polypeptide/Proteine, die Repeat-Bereiche aufweisen, als blutgerinnungs- hemmende Mittel, als Thrombin-inhibierende Mittel, als antiinflammatorische Mittel, als antirheumatische Mittel, Verwendung der Lipocortine als blutgerinnungshemmende Mittel, als Thrombin-inhibierende Mittel und in den für die VAC-Proteine geltenden Indikationen, wobei die bekannten Verwendungen der zum Teil in der vorliegenden Anmeldung beschriebenen Proteine mit solchen Repeat-Bereichen ausdrücklich ausgenommen sind.

Weiterhin sind Mittel zur therapeutischen Behandlung, die neben pharmazeutisch inerten Trägerstoffen eine wirksame Menge eines dieser Polypeptide enthält, Gegenstand der Erfindung.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind auch DNA-Moleküle, die für ein Polypeptid/Protein mit Repeat-Bereichen kodieren, DNA-Moleküle, die für einen der Repeat-Bereiche kodieren, DNA-Moleküle, dadurch gekennzeichnet, daß die für die vollständigen Repeats kodierenden Bereiche umgeordnet sind, die von diesen kodierten Proteine, deren Herstellung und Verwendung.

Alle durch diese oder ähnliche Mutationen erhältlichen Proteine, die für diese kodierenden DNAs, deren Herstellung und Verwendung sind ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfindung, wobei die bekannten zum Teil in der vorliegenden Anmeldung beschriebenen Proteine, die für diese kodierenden DNAs, deren bekannte Herstellung und Verwendung ausdrücklich ausgenommen sind.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind auch DNA-Moleküle nicht-humanen Ursprungs, die von diesen kodierten Proteine, deren Herstellung und Verwendung, die in einer, der vorliegenden Erfindung analogen Weise herstellbar sind.

Gegenstand der Erfindung sind nicht nur Gen-Sequenzen, die spezifisch für die erfindungsgemäßen Proteine codieren, sondern ebenfalls Modifikationen, die leicht und routinemäßig durch Mutation, Abbau, Transposition oder Addition erhalten werden können. Jede Sequenz, die für die erfindungsgemäßen Proteine codiert (d.h. die das biologische Aktivitätsspektrum aufweist, das hier beschrieben ist) und im Vergleich mit den gezeigten

degeneriert ist, ist ebenfalls eingeschlossen; Fachleute auf diesem Gebiet sind in der Lage, DNA-Sequenzen der codierenden Regionen zu degenerieren. Ebenso ist jede Sequenz, die für ein Polypeptid mit dem Aktivitätsspektrum der erfindungsgemäßen Proteine codiert, und die mit den gezeigten Sequenzen (oder Teilen davon) unter stringenten Bedingungen hybridisiert (beispielsweise Bedingungen, die für mehr als 85 %, bevorzugt mehr als 90 % Homologie selektieren) beinhaltet.

Die Hybridisierungen werden in 6xSSC/5x Denhardt's Lösung/0,1% SDS bei 65°C durchgeführt. Der Grad der Stringenz wird im Waschschritt festgelegt. So sind für eine Selektionierung auf DNA-Sequenzen mit ca. 85 % oder mehr Homologie die Bedingungen 0,2xSSC/0,01% SDS/65°C und für eine Selektionierung auf DNA-Sequenzen mit ca. 90 % oder mehr Homologie die Bedingungen 0,1x SSC/0,01% SDS 65°C geeignet.

Die Erfindung betrifft weiterhin Expressionsvektoren, die eine für VAC kodierende DNA-Sequenz enthalten, die von einer Expressionskontrollsequenz derart reguliert wird, daß in einer mit diesem Expressionsvektoren transformierten Wirtszelle Polypeptide mit VAC-Aktivität exprimiert werden.

Die Expressionsvektoren der vorliegenden Erfindung werden z.B. hergestellt, indem man in eine Vektor-DNA, welche eine Expressionskontrollsequenz enthält, eine VAC kodierende DNA-Sequenz derart einfügt, daß die Expressionskontroll- sequenz besagte DNA-Sequenz reguliert.

Die Wahl eines geeigneten Vektors ergibt sich aus der zur Transformation vorgesehenen Wirtszelle. Geeignete Wirte sind beispielsweise Mikroorganismen, wie Hefen, z.B. <u>Saccharomyces cerevisiae</u>, und insbesondere
Bakterienstämme, die über kein Restriktions- oder
Modifikationsenzym verfügen, vor allem Stämme von
<u>Escherichia coli</u>, z.B. <u>E.coli</u> X1776, <u>E.coli</u> HB101,
<u>E.coli</u> W3110, <u>E.coli</u> HB101/LM1035, <u>E.coli</u> JA221(30)
oder <u>E.coli</u> K12 Stamm 294, <u>Bacillus subtilis</u>, <u>Bacillus stearothermophilus</u>, <u>Pseudomonas</u>, <u>Haemophilus</u>,
<u>Streptococcus</u> und andere, ferner Zellen höherer
Organismen, insbesondere etablierte humane oder
tierische Zellinien. Bevorzugte Wirtszellen sind die
gesamten Stämme von <u>E.coli</u>, insbesondere <u>E.coli</u> HB101,
<u>E.coli</u> JM101 und <u>E.coli</u> W3110.

Grundsätzlich sind alle Vektoren geeignet, welche die erfindungsgemäßen heterologen, für die VAC kodierenden DNA-Sequenzen in dem gewählten Wirt replizieren und exprimieren.

Beispiele für Vektoren, die zur Expression des VAC-Gens in einem E.coli-Stamm geeignet sind, sind Bacteriophagen, z.B. Derivate des Bacteriophagen λ , oder Plasmide, wie insbesondere das Plasmid colEl und seine Derivate, z.B. pMB9, pSF2124, pBR317 oder pBR322. Die bevorzugten Vektoren der vorliegenden Erfindung leiten sich von Plasmid pBR322 ab. Geeignete Vektoren enthalten ein vollständiges Replicon und ein Markierungsgen, welches die Selektion und Identifizierung der mit den Expressionsplasmiden transformierten Mikroorganismen auf Grund eines phänotypischen Merkmals ermöglicht. Geeignete Markierungen verleihen dem Mikroorganismus beispielsweise Resistenz gegenüber Schwermetallen, Antibiotika und dergleichen. Weiterhin enthalten bevorzugte Vektoren der vorliegenden Erfindung außerhalb der Replicon- und Markierungsgen- Regionen

Erkennungssequenzen für Restriktionsendonucleasen, so daß an diesen Stellen die für die Aminosäuresequenz von VAC kodierende DNA-Sequenz und gegebenenfalls die Expressions-Kontrollsequenz eingefügt werden können. Ein bevorzugter Vektor, das Plasmid pBR322, enthält ein intaktes Replicon, gegen Tetracyclin und Ampicillin Resistenz verleihende Markierungsgene (tet und amp und eine Reihe von nur einmal vorkommenden Erkennungssequenzen für Restriktionsendonucleasen, z.B. PstI (schneidet im amp Gen, das tet Gen bleibt intakt), BamHI, HindIII, SalI (schneiden alle im tet Gen, das amp Gen bleibt intakt), NruI und EcoRI.

Mehrere Expressionskontrollsequenzen können zur Regulation der VAC-Expression eingesetzt werden. Insbesondere werden Expressionskontrollsequenzen stark exprimierter Gene der zu transformierenden Wirtszelle verwendet. Im Falle von pBR322 als Hybridvektor und E.coli als Wirtsorganismus sind beispielsweise die Expressionskontrollsequenzen (welche unter anderem den Promotor und die ribosomale Bindungsstelle enthalten) des Lactoseoperons, Tryptophanoperons, Arabinoseoperons und dergleichen, des B-Lactamasegens, die entsprechenden Sequenzen des Phage λN -Gens oder des Phage fd-Schichtproteingens und andere geeignet. Während der Promotor des B-Lactamasegens (B-lac-Gen) bereits in Plasmid pBR322 enthalten ist, müssen die übrigen Expressionskontrollsequenzen in das Plasmid eingeführt werden. Bevorzugt als Expressionskontrollsequenz in der vorliegenden Erfindung ist diejenige des Tryptophanoperons (trp po) sowohl von Serratia marcescens als auch aus E.coli und der alkalische Phosphatase-Promotor bzw. deren Hybrid.

Neben diesen besonders gebräuchlichen Promotoren sind auch andere mikrobielle Promotoren entwickelt und benutzt worden. Die Gen-Sequenz für die erfindungsgemäßen Proteine kann beispielsweise unter der Kontrolle des Leftward-Promotors des Bakteriophagen Lambda (P_{τ}) eingesetzt werden. Dieser Promotor ist ein besonders effektiver steuerbarer Promotor. Die Steuerung wird möglich durch den Lambda-Repressor, von dem benachbarte Restriktionsschnittstellen bekannt sind. Ein temperaturempfindliches Allel dieses Repressor-Gens kann in einen Vektor, der eine Protein-Gen-Sequenz enthält, eingefügt werden. Wird die Temperatur auf 42°C erhöht, wird der Repressor inaktiviert und der Promotor aktiviert. Durch die Verwendung dieses Systems ist es möglich, eine Clon-Bank zu etablieren, in der eine funktionelle Protein-Gen-Sequenz in Nachbarschaft zu einer Ribosom-Bindungsstelle in variierenden Abständen zu dem Lambda- P_{τ} -Promotor plaziert wird. Diese Klone können dann überprüft und der mit der höchsten Ausbeute selektiert werden.

Die Expression und Translation einer Sequenz codierend für die erfindungsgemäßen Proteine kann auch unter Kontrolle anderer Regulationssysteme, die als "homolog" zu dem Organismus in seiner untransformierten Form gelten können, ablaufen. So enthält z.B. chromosomale DNA von einem Lactose-abhängigen E.coli ein Lactose oder Lac-Operon, das durch Ausschüttung des Enzyms Beta-Galactosidase den Lactose-Abbau ermöglicht.

Die Lac-Kontrollelemente können aus dem Bacteriophagen Lambda-plac5, der infektiös für E. coli ist, erhalten werden. Das Lac-Operon des Phagen kann durch Transduktion aus derselben Bakterien-Spezies stammen. Regulationssysteme, die bei dem erfindungsgemäßen Verfahren Verwendung finden können, können auch aus plasmidischer DNA stammen, die dem Organismus eigen ist. Das Lac-Promotor-Operator-System kann durch IPTG induziert werden.

Andere Promotor-Operator-Systeme oder Teile hiervon können genausogut verwendet werden: beispielsweise Colicine E_1 -Operator, Galactose-Operator, Xylose-A-Operator, tac- Promotor u.ä..

Zusätzlich zu Prokaryoten können auch eukaryotische Mikroorganismen, wie Hefekulturen verwendet werden.

Saccharomyces cerevisiae ist die am meisten verwendete von den eukaryotischen Mikroorganismen, obwohl eine Anzahl anderer Spezies allgemein erhältlich ist.

Zur Replikation und Expression in Hefe geeignete Vektoren enthalten einen Hefe-Replikationsstart und einen selektiven genetischen Marker für Hefe. Hybridvektoren, die einen Hefe-Replikationsstart enthalten, z.B. das chromosomale autonom replizierende Segment (ars), bleiben nach der Transformation innerhalb der Hefezelle extra-chromosomal erhalten und werden bei der Mitose autonom repliziert. Zur Expression in Saccharomyces wird beispielsweise das Plasmid YRp7 (Stinchcomb et al. Natur 282, 39 (1979); Kingsman et al., Gene 7, 141 (1979); Tschumper et al., Gene 10, 157 (1980)) und das Plasmid YEpl3 (Bwach et al., Gene 8, 121-133 (1979)) verwendet. Das Plasmid YRp7 enthält das TRP1-Gen, das eine Selektionierungsmarkierung für eine Hefemutante, die unfähig ist, in trypthophanfreiem Medium zu wachsen, bereitstellt; beispielsweise ATCC Nr. 44076.

=

טובוטןטט ט זו

Das Vorhandensein des TRP1 Schadens als
Charakteristikum des Hefe-Wirts Genoms stellt dann ein
wirksames Hilfsmittel dar, um Transformation
nachzuweisen, wenn ohne Tryptophan kultiviert wird.
Ganz ähnlich verhält es sich bei dem Plasmid YEp13, das
das Hefe-Gen LEU 2, das zur Ergänzung einer
LEU-2-minus-Mutante verwendet werden kann, enthält.

Weitere geeignete Markierungsgene für Hefe sind im Fall von auxotrophen Hefemutanten, im allgemeinen Gene, die Wirtsdefekte komplementieren. Entsprechende Gene sorgen für Prototrophie in einer auxotophen Hefemutante, z.B. das <u>URA3-</u> und <u>HIS3-</u> Gen. Vorzugsweise enthalten Hefe-Hybridvektoren weiterhin einen Replikationsstart und ein Markierungsgen für einen bakteriellen Wirt, insbesondere <u>E.coli</u>, damit die Konstruktion und die Klonierung der Hybridvektoren und ihrer Vorstufen in einem bakteriellen Wirt erfolgen kann. Weitere für die Expression in Hefe geeignete Expressionskontrollsequenzen sind beispielsweise diejenigen des <u>PHO3-</u> oder <u>PHO5-</u>Gens, ferner in glykolytischen Abbau involvierte Promotor, z.B. der <u>PGK-</u> und <u>GAPDH-</u>Promotor.

Andere geeignete Promotor-Sequenzen für Hefe Vektoren beinhalten die 5'-flankierende Region der Gene des ADH I (Ammerer G., Methods of Enzymology 101, 192-201 (1983)), 3-Phosphoglycerate-Kinase (Hitzeman et al., J. Biol. Chem. 255, 2073 (1980)) oder andere glykolytische Enzyme (Kawaski und Fraenkel, BBRC 108, 1107-1112 (1982)) wie Enolase, Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase, Hexokinase, Pyruvat-Decarboxylase, Phosphofructokinase, Glucose-6-Phosphat-Isomerase, Phosphoglucose-Isomerase und Glucokinase. Bei der Konstruktion geeigneter

11 - 00,0,0,0

5

Expressionsplasmide können die mit diesen Genen assoziierten Terminationssequenzen ebenfalls in den Expressions-Vektor am 3'-Ende der zu exprimierenden Sequenz eingesetzt werden, um Polyadenylierung und Termination der mRNA zu ermöglichen.

Andere Promotoren, die zudem noch den Vorteil der durch Wachstumsbedingungen kontrollierten Transkription besitzen, sind die Promotor-Regionen der Gene für Alkohol-Dehydrogena- se-2, Isocytochrom C, Saure-Phosphatase, abbauende Enzyme, die mit dem Stickstoff-Metabolismus gekoppelt sind, die oben erwähnte Glycerinaldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase und Enzyme, die für die Verarbeitung von Maltose und Galaktose verantwortlich sind. Promotoren, die durch den Hefe Mating Typ Locus reguliert werden, beispielsweise Promotoren der Gene BARI, MFal, STE2, STE3, STE5 können bei temperaturregulierten Systemen durch die Verwendung von temperaturabhängigen sir Mutationen eingesetzt werden. (Rhine Ph.D. Thesis, University of Oregon, Eugene, Oregon (1979), Herskowitz and Oshima, The Molecular Biology of the Yeast Saccharomyces, part I, 181-209 (1981), Cold Spring Harbor Laboratory). Diese Mutationen beeinflussen die Expression der ruhenden Mating-Typ Kassetten von Hefen und dadurch indirekt die Mating-Typ abhängigen Promotoren. Generell ist jedoch jeder Plasmid Vektor, der einen Hefe-kompatiblen Promotor, originäre Replikations- und Terminationssequenzen enthält, geeignet.

So können auch Hybridvektoren, die der Hefe-2µ-Plasmid-DNA homologe Sequenzen enthalten, verwendet werden. Solche Hybridvektoren werden durch Rekombination innerhalb der Zelle bereits vorhandenen 2µ-Plasmiden einverleibt oder replizieren autonom. 2µ-Sequenzen sind besonders für Plasmide mit großer Transformationshäufigkeit geeignet und gestatten eine hohe Kopienzahl.

Zusätzlich zu Mikroorganismen sind Zellkulturen multizellulärer Organismen ebenfalls geeignete Wirtsorganismen. Im Prinzip ist jede dieser Zellkulturen einsetzbar, ob von Wirbeltier- oder wirbellosen Tierzellkulturen. Größtes Interesse besteht ... jedoch an Wirbeltierzellen, so daß die Vermehrung von Wirbeltierzellen in Kultur (Gewebe-Kultur) in den letzten Jahren zu einer routinemäßigen Methode wurde (Tissue Culture, Academic Press, Kruse and Patterson, Editors (1973)). Beispiele solch nützlicher Wirtszellinien sind VERO- und HeLa-Zellen, CHO-Zellen und WI38, BHK, COS-7 und MDCK-Zellinien. Expressionsvektoren für diese Zellen enthalten üblicherweise (wenn nötig) einen Replikationsstartpunkt, einen Promotor, der vor dem zu exprimierenden Gen lokalisiert ist, gemeinsam mit allen notwendigen Ribosomenbindungsstellen, RNA-Splicing-Stelle, Polyadenylierungsstelle und transkriptionelle Terminations-Sequenzen.

Bei der Verwendung in Säugetierzellen stammen die Kontrollfunktionen auf den Expressions-Vektoren oftmals aus viralem Material. Beispielsweise stammen die üblicherweise verwendeten Promotoren aus Polyoma-, Adenovirus 2, und besonders häufig aus Simian Virus 40 (SV 40). Die frühen und späten Promotoren des SV 40 sind besonders nützlich, da beide leicht aus dem Virus als Fragment zu erhalten sind, das auch noch die virale Replikationsstelle des SV 40 enthält. (Fiers et al., Nature 273, 113 (1978)). Auch können kleinere oder größere Fragmente des SV 40 verwendet werden, vorausgesetzt, sie enthalten die annähernd 250 bp lange Sequenz, die von der HindIII Schnittstelle bis zur BglI Schnittstelle in dem viralen Replikationsstartpunkt reicht. Außerdem ist es ebenfalls möglich und oft empfehlenswert, Promotor- oder Kontroll-Sequenzen zu

verwenden, die normalerweise mit den gewünschten Gensequenzen verknüpft sind, vorausgesetzt, diese Kontroll-Sequenzen sind kompatibel zu den Wirtszellsystemen.

Ein Replikationsstartpunkt kann entweder durch entsprechende Vektorkonstruktion vorgesehen werden, um einen exogenen Startpunkt einzubauen, beispielsweise aus SV 40 oder anderen viralen Quellen (z.B. Polyoma, Adeno, VSV, PBV, etc.) oder kann durch die chromosomalen Replikationsmechanismen der Wirtszelle vorgesehen werden. Wird der Vektor in das Wirtszellenchromosom integriert, reicht die zuletztgenannte Maßnahme meistens aus.

Insbesondere betrifft die Erfindung zur Replikation und phänotypischen Selektionen befähigte Expressionsvektoren, welche eine Expressionskontrollsequenz und eine für die Aminosäuresequenz von VAC kodierende DNA-Sequenz enthalten, wobei besagte DNA-Sequenz mitsamt Transkriptionsstartsignal und -terminationssignal sowie Translationsstartsignal und -stopsignal in besagtem Expressionsplasmid unter Regulation besagter Expressionskontrollsequenz so angeordnet ist, daß in einer mit besagtem Expressionsplasmid transformierten Wirtszelle VAC exprimiert wird.

Um eine effektive Expression zu erreichen, muß das VAC-Gen richtig (in "Phase") mit der Expressionskontrollsequenz angeordnet sein. Es ist vorteilhaft, die Expressionskontrollsequenz in den Bereich zwischen dem Haupt-mRNA-Start und dem ATG der Genkodiersequenz, welche natürlich mit dem Expressionskontrollsequenz verknüpft ist (z.B. die

B-lac-Kodiersequenz bei Verwendung des B-lac-Promotors), mit dem VAC-Gen, welches vorzugsweise sein eigenes Translationsstartsignal (ATG) und Translationsstopsignal (z.B. TAG) mitbringt, zu verknüpfen. Dadurch wird eine effektive Transkription und Translation gewährleistet.

Beispielsweise wird ein Vektor, insbesondere pBR322, mit einer Restriktionsendonuklease geschnitten und, gegebenenfalls nach Modifikation des so gebildeten linearisierten Vektors, eine mit entsprechenden Restriktionsenden versehenen Expressionskontrollsequenz eingeführt. Die Expressionskontrollsequenz enthält am 3'-Ende (in Translationsrichtung) die Erkennungssequenz einer Restriktionsendonuclease, so daß der die Expressionskontrollsequenz bereits enthaltende Vektor mit besagtem Restriktionsenzym verdaut und das mit passenden Enden versehene VAC-Gen eingesetzt werden kann. Dabei entsteht ein Gemisch von zwei Hybridplasmiden, welche das Gen in richtiger bzw. in falscher Orientierung enthalten. Vorteilhaft ist es, den die Expressionskontrollsequenz bereits enthaltenden Vektor noch mit einer zweiten Restriktionsendonuclease innerhalb der Vektor-DNA zu spalten und in das entstandenen Vektor-Fragment das mit richtigen Enden versehene VAC-Gen einzusetzen. Alle Operationen am Vektor erfolgen vorzugsweise in einer Weise, daß die Funktion des Replicons und zumindest eines Markierungsgens nicht beeinträchtigt wird.

In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird ein von pBR322 abgeleiteter Vektor, welcher eine Expressionskontrollsequenz, insbesondere diejenige vom Tryptophan-Operon (trp po), enthält, die am 3'-Ende (zwischen dem Haupt-mRNA-Start und dem ersten ATG) die Erkennungssequenz für eine,

vorzugsweise kohäsive Enden bildende,
Restriktionsendonuclease, z.B. EcoRI, trägt, mit der
genannten Restriktionsendonuclease und im
Vektor-DNA-Teil mit einer zweiten
Restriktionsendonuclease, welche flache oder bevorzugt
kohäsive Enden bildet, z.B. BamHI, verdaut, wonach der
so linearisierte Vektor mit der entsprechende Enden
aufweisenden VAC-DNA (z.B. mit einem EcoRI-Ende vor dem
ATG-Start und einem BamHI-Ende nach dem
Translationsstop-Codon) verknüpft wird. Die Verknüpfung
erfolgt in bekannter Weise durch Paarung der
komplementären (kohäsiven) Enden und Ligierung, z.B.
mit T₄-DNA-Ligase.

Vorzugsweise können die erfindungsgemäßen DNA-Sequenzen auch in dem Expressionsplasmid pER103 (E. Rastl-Dworkin et al., Gene 21, 237-248 (1983) und EP-A-0.115-613 hinterlegt bei der DSM unter der Nummer DSM 2773 am 20. Dezember 1983), in dem Plasmid parpER33 (EP-A-0.115-613) oder dem Plasmid pRH100 exprimiert werden, da diese Vektoren alle Regulationselemente enthalten, die zu einer hohen Expressionsrate der klonierten Gene führen. Erfindungsgemäß wird als Expressionsvektor für das synthetische Protein Gen das Plasmid pRH100 verwendet, das den regulierbaren Tryptophanpromotor aus Serratia marcescens und eine artifizielle Ribosomenbindungsstelle enthält. Zur Herstellung des Expressionsplasmides pRH100 wurde das Plasmid pER103 (Eva Dworkin-Rastl et al., Gene 21 (1983) 237-248, EP-A-O.115-613) mit der Restriktionsendonuklease HindIII linearisiert und die Oligonukleotidsequenz

3'.

- 5' AGCTTAAAGATGAGCTCATCTTTA
- 3' ATTTCTACTCGAGTAGAAATTCGA 5'

Die über den mRNA-Weg, aus genomischer DNA oder synthetisch gewonnene, mit entsprechenden (insbesondere EcoRI- und BamHI-) Enden versehene VAC-DNA kann vor dem Einbringen in ein Expressionsplasmid auch in einen Vektor, z.B. pBR322, kloniert werden, um größere Mengen an VAC-DNA, beispielsweise für die Sequenzanalyse, zu gewinnen. Die Isolierung der Klone, welche das Hybridplasmid enthalten, wird beispielsweise mit einer VAC-DNA spezifischen, radioaktiv-markierten Oligonucleotid-Probe (siehe oben) durchgeführt. Die Charakterisierung der VAC-DNA erfolgt beispielsweise nach dem Verfahren von Maxam und Gilbert (11).

Ē

In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung werden Teilstücke der VAC-DNA synthetisiert. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung von transformierten Wirtszellen, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Wirtszelle mit einem Expressionsvektor, der eine von einer Expressionskontrollsequenz regulierte, für die Aminosäuresequenz von VAC kodierende DNA-Sequenz enthält, transformiert.

Geeignete Wirtszellen sind beispielsweise die oben genannten Mikroorganismen, wie Stämme von Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis und insbesondere Escherichia coli. Die Transformation mit dem erfindungsgemäßen Expressionsplasmiden erfolgt beispielsweise wie in der Literatur beschrieben, so für S. cerevisiae (12), B.subtilis (13) und E.coli (14). Die Isolierung der transformierten Wirtszellen erfolgt vorteilhaft aus einem selektiven Nährmedium, dem das Biocid zugesetzt wird, gegen welches das im Expressionsplasmid enthaltende Markierungs-Gen Resistenz verleiht. Wenn, wie bevorzugt, die Expressionsplasmide das amp Gen enthalten, wird dem

Nährmedium demgemäß Ampicillin zugesetzt. Zellen, welche das Expressionsplasmid nicht enthalten, werden in einem solchen Medium abgetötet.

Die Erfindung betrifft ebenfalls die auf dem genannten Weg erhältlichen transformierten Wirtszellen.

Die transformierten Wirtszellen können zur Herstellung von Verbindungen mit VAC-Aktivität verwendet werden. Das Verfahren zur Herstellung dieser Verbindung ist dadurch gekennzeichnet, daß die transformierten Wirtszellen kultiviert und das Produkt aus den Wirtszellen freigesetzt und isoliert wird.

Die Erfindung betrifft daher vor allem ein Verfahren zur Herstellung von Verbindungen mit VAC-Aktivität und von Salzen solcher Verbindungen, dadurch gekennzeichnet, daß mit einem Expressionsplasmid, welches eine von einer Expressionskontrollsequenz regulierte, für die Aminosäuresequenz von VAC kodierende DNA-Sequenz enthält, transformierte Wirtszellen in einem flüssigen Nährmedium, welches assimilierbare Kohlenstoff- und Stickstoffquellen enthält, kultiviert werden und das Produkt aus den Wirtszellen freigesetzt und isoliert wird, und, falls erforderlich, ein verfahrensgemäß erhältliches Produkt mit einem zur Aufspaltung der Disulfidbindungen geeigneten Reduktionsmittel versetzt und das erhältliche reduzierte Polypeptid gegebenenfalls mit einem zur Neuknüpfung von Disulfidbindungen geeigneten Oxidationsmittel behandelt wird, und gewünschtenfalls, eine erhältliche VAC-Verbindung in eine andere VAC-Verbindung überführt wird, ein verfahrensgemäß erhältliches Gemisch von Verbindungen mit VAC-Aktivität in die einzelnen Komponenten aufgetrennt wird und/oder,

gewünschtenfalls, ein erhaltenes Salz in das Polypeptid und ein erhaltenes Polypeptid in das entsprechende Salz desselben überführt wird.

Ī

Die vorliegende Erfindung betrifft insbesondere ein Verfahren zur Herstellung von VAC-Verbindungen.

Die Kultivierung der erfindungsgemäßen transformierten Wirtszellen erfolgt in an sich bekannter Weise. So können für die Kultivierung der erfindungsgemäßen, transformierten Wirtsmikroorganismen verschiedene Kohlenstoffquellen verwendet werden. Beispiele bevorzugter Kohlenstoffquellen sind assimilierbare Kohlenhydrate, wie Glucose, Maltose, Mannit oder Lactose, oder ein Acetat, das entweder allein oder in geeigneten Gemischen verwendet werden kann. Geeignete Stickstoffquellen sind beispielsweise Aminosäuren, wie Casaminosäuren, Peptide und Proteine und ihre Abbauprodukte, wie Trypton, Pepton oder Fleischextrakte; weiterhin Hefeextrakte, Malzextrakt, wie auch Ammoniumsalze, z.B. Ammoniumchlorid, -sulfat oder -nitrat, die entweder allein oder in geeigneten Mischungen verwendet werden können. Anorganische Salze, die ebenfalls verwendet werden können, sind z.B. Sulfate, Chloride, Phosphate und Carbonate von Natrium, Kalium, Magnesium und Calcium.

Weiterhin enthält das Medium z.B. wachstumsfördernde Substanzen, wie Spurenelemente, z.B. Eisen, Zink, Mangan und dergleichen, und vorzugsweise Substanzen, die einen Selektionsdruck ausüben und das Wachstum von Zellen, die das Expressionsplasmid verloren haben, verhindern. So wird dem Medium beispielsweise Ampicillin zugesetzt, wenn das Expressionsplasmid ein amp -Gen enthält. Ein solcher Zusatz von antibiotisch wirksamen Substanzen bewirkt auch, daß kontaminierende, Antibiotika-empfindliche Mikroorganismen abgetötet werden.

Die Kultivierungsbedingungen, wie Temperatur, pH-Wert des Mediums und Fermentationszeit, werden so ausgewählt, daß maximale VAC-Titer erhalten werden. So wird ein <u>E. coli</u> oder ein Hefe-Stamm bevorzugt unter aeroben Bedingungen in submerser Kultur unter Schütteln oder Rühren bei einer Temperatur von etwa 20 bis 40°C, vorzugsweise etwa 30°C, und einem pH-Wert von 4 bis 9, (vorzugsweise etwa 30°C, und einem pH-Wert von 4bis 9), vorzugsweise bei pH 7, während etwa 4 bis 20h, vorzugsweise 8 bis 12h, kultiviert. Dabei sammelt sich das Expressionsprodukt intrazellulär an.

Wenn die Zelldichte einen ausreichenden Wert erreicht hat, wird die Kultivierung abgebrochen und das Produkt. falls erforderlich, aus den Zellen des Mikroorganismus freigesetzt. Zu diesem Zeck werden die Zellen zerstört, z.B. durch Behandlung mit einem Detergens, wie SDS oder Triton, oder mit Lysozym oder einem gleichartig wirkenden Enzym lysiert. Alternativ oder zusätzlich kann man mechanische Kräfte, wie Scherkräfte (z.B. X-Presse, French-Presse, Dyno-Mill) oder Schütteln mit Glasperlen oder Aluminiumoxid, oder abwechselndes Einfrieren, z.B. in flüssigem Stickstoff, und Auftauen, z.B. auf 30° bis 40°C, sowie Ultraschall zum Brechen der Zellen anwenden. Die resultierende Mischung, die Proteine, Nucleinsäuren und andere Zellbestandteile enthält, wird nach der Zentrifugation in an sich bekannter Weise an Proteinen angereichert. So wird z.B. der größte Teil der Nicht-Protein-Bestandteile durch Polyäthylenimin-Behandlung abgetrennt und die Proteine einschließlich der VAC-Verbindungen z.B. durch Sättigen der Lösung mit Ammoniumsulfat oder mit anderen Salzen ausgefällt. Weitere Reingungsschritte umfassen beispielsweise chromatographische Verfahren, wie Ionenaustauschchromatographie. HPLC, Reverse-Phase-HPLC und dergleichen. So erfolgt die Auftrennung der

Mischbestandteile durch Dialyse, nach Ladung mittels Gel- oder trägerfreier Elektrophorese, nach Molekülgröße mittels einer geeigneten Sephadex-Säule, durch Affinitätschromatographie, z.B. mit Antikörpern, insbesondere monoklonalen Antikörpern, oder mit Thrombin gekuppelt an einen geeigneten Träger zur Affinitätschromatographie, oder durch weitere, insbesondere aus der Literatur bekannte Verfahren.

Beispielsweise umfaßt die Isolierung der exprimierten VAC-Verbindungen die folgenden Stufen.

Abtrennung der Zellen aus der Kulturlösung mittels Zentrifugation; Herstellung eines Rohextraktes durch Zerstören der Zellen, z.B. durch Behandlung mit einem lysierenden Enzym und/oder abwechselndem Einfrieren und Wiederauftauen; Abzentrifugieren der unlöslichen Bestandteile; Ausfällen der DNA durch Zugabe von Polyäthylenimin; Fällung der Proteine durch Ammoniumsulfat; Affinitätschromatographie des gelösten Niederschlags an einer monoklonalen Anti-VAC-Antikörper-Säule; Entsalzung der so gewonnenen Lösung mittels Dialyse oder Chromatographie an Sephadex G25 oder Sephadex G10.

Weitere Reinigungsschritte schließen Gelfiltrationen an Sephadex G50 (oder G75) und Reverse-Phase-HPLC ein. Entsalzung wieder an Sephadex G25.

Zum Nachweis der VAC-Aktivität kann der Test mit Anti-VAC-Antikörpern (z.B. aus Kaninchen/Maus erhältliche, oder aus Hybridomazellen erhältliche monoklonale Antikörper) oder können die in der EPA 0 181 465 beschriebenen Tests herangezogen werden.

Wie bereits erwähnt, ist der alkalische Phosphatasepromotor besonders geeignet für die Expression der erfindungsgemäßen Proteine.

Das Gen für die alkalische Phosphatase (PhoA) aus E.coli unterliegt einer strengen Regulation. In Gegenwart von Phosphat wird das Gen komplett abgeschaltet, bei Abwesenheit von Phosphat im Medium erfolgt Genexpression. H.Shuttleworth et al., Nucleic Acids Res. 14 (1986), p.8689 sowie C.N.Chang et al., Gene 44 (1986), pp.121-125 beschreiben die Nukleotidsequenz dieses Gens. Zur Konstruktion eines geeigneten Expressionsvektors wurde aus mehreren Oligonukleotiden die Promotorregion des PhoA Gens zusammengesetzt und in EcoRI-ClaI geschnittenes pAT153 (Amersham) eingesetzt. Vor der ribosomalen Bindungsstelle wurde eine XhoI Stelle eingeführt. Die originale EcoRI Stelle wird beim Einligieren des synthetischen DNA-Fragmentes zerstört. Nach der ribosomalen Bindungsstelle wurde ein Translationsstart-ATG vorgesehen, dessen G das erste Nukleotid einer SacI (=SstI) Stelle ist. Der Expressionsvektor läßt sich durch Schnitt mit SacI an dieser Stelle linearisieren und der 3'Überhang durch Behandlung mit DNA-Polymerase I - Klenow Fragment in Gegenwart von dGTP in ein gerades Ende überführen. Dadurch kann jedes beliebige Gen an dieser Stelle eingefügt werden, für korrekte Expression muß es mit der ersten Base der kodierenden Region beginnen.

Das HindIII-SalI Fragment des pAT-Anteils wurde entfernt und durch den alkalischen Phosphatase-Transkriptionsterminator ersetzt. Die originale SalI Stelle wurde zerstört. Dafür wurde sie vor dem Terminator zusammen mit der ebenfalls aus pAT153 deletierten BamHI Stelle wieder eingebracht.

Die Sequenz der synthetisch hergestellten DNA ist in Fig.15 abgebildet. Der resultierende Vektor wurde pRH284T genannt.

Zur Herstellung eines Vektors, der zur Expression von VAC-alfa geeignet ist, wurde in den pRH284T ein für VAC-alfa kodierendes DNA Molekül eingefügt. Hierzu wurde beispielsweise der cDNA Klon pP6/5 mit BglII und PstI geschnitten und das 980 bp lange Fragment isoliert, das den Hauptteil der kodierenden und ca. 200 bp 3'nichttranslatierte Region enthält. Mittels Oligonukleotiden wurde das fehlende 5'Ende der kodierenden Region ersetzt. Dabei wurde durch zwei Mutationen (GGC -> GGT, Gly-7 und ACT -> ACC, Thr-8) gleichzeitig eine KpnI-Schnittstelle in die VAC-cDNA eingeführt.

Die Oligonukleotide hatten folgendes Aussehen:

|EBI-678

||EBI-677 .

GCACAGGTTCTCAGAGGTACCGTGACTTCCCTGGATTTGATGAGCGGGCT CGTGTCCAAGAGTCTCCATGGCACTGACTGAAGGGACCTAAACTACTCGCCCGA

EBI-680|| .

GATGCAGAAACTCTTCGGAAGGCTATGAAAGGCTTGGGCACAGATGAGGAGAGC CTACGTCTTTGAGAAGCCTTCCGATACTTTCCGAACCCGTGTCTACTCCTCTCG EBI-

| | EBI-682

ATCCTGACTCTGTTGACATCCCGAAGTAATGCTCAGCGCCAGGAAATCTCTGCA 3'

TAGGACTGAGACAACTGTAGGGCTTCATTACGAGTCGCGGTCCTTTAGAG

EBI-6811 679

Der so hergestellte Vektor wurde pRH291 genannt (Fig. 16).

Zur Expression von VAC-beta wurde vorzugsweise als
Expressionsvektor das Plasmid pER103 verwendet
(E.Rastl-Dworkin et al., Gene 21 (1983), 237-248). Der
Vektor wurde mit HindIII linearisiert. Das
5'überhängende Ende wurde mit dATP und DNA-Polymerase
I / Klenowfragment partiell eingefüllt, und der
verbleibende Einzelstrangrest mit S1 Nuklease verdaut.
Der Vektor wurde mit BamHI nachgeschnitten und das
große Fragment isoliert (Fig.17). In den so
vorbereiteten Vektor wurde das für VAC-beta kodierende
DNA-Molekül ligiert. Hierzu wurde beispielsweise aus
dem Klon pRH203 das 440 bp lange MaeIII-BamHI Fragment
isoliert, das die Codons 13 bis 157 enthält. Das
fehlende 5'Ende wurde durch Oligonukleotide
ergänzt:

EBI-307

** ~ 00/01210

- 5' CCATGGCTTGGTAGAAGCTTGGATCGAACAGGAAGGT 3'
- 3' GGTACCGAACCACCTTTCGAACCTAGCTTGTCCTTCCACAGTG 5' EBI-306

Dabei wurden für E.coli optimale Codons verwendet (zB. R.Grantham et al., Nucleic Acids Res. 8 (1980), 1893-1912). Dieser Codonaustausch resultierte in einer neuen HindIII-Stelle bei Codon 5 bis 7. Nach dem Nachschnitt mit BamHI wurde das 5'terminale VAC-Fragment in den vorbereiteten pER103 Vektor ligiert. Der entstehende Vektor wurde pRH211 benannt. Um die für VAC-beta kodierende Region zu ergänzen, wurde aus dem Klon pRH201 das 1230 bp lange BamHI-SphI Fragment isoliert. Der ca. 200 bp lange pBR322 Abschnitt von BamHI bis SphI aus dem Plasmid pRH211 wurde entfernt und durch den entsprechenden VAC-cDNA Teil ersetzt. Es resultierte der Vektor pRH212. Das EcoRI-BamHI Fragment, das den Trp-Promotor (S.marcescens), die ribosomale Bindungsstelle und den synthetisch hergestellten Beginn des VAC-beta Gens enthält, wurde durch Sequenzieren überprüft. Der

Nachweis des plasmidkodierten VAC-beta erfolgte im Maxizell-system (A.Sancar et al., J. Bacteriol. 137 (1979), pp.692-693.).

Besonders bevorzugt für die Expression des VAC-beta ist die Konstruktion eines Expressionsvektors ausgehend von pRH284T. Hierzu wurde in den Expressionsvektor in geeigneter Weise das für VAC-beta kodierende Insert ligiert. Als Ausgangsmaterial für dieses Insert kann beispielsweise der Vektor pRH212 dienen:

Der Expressionsvektor pRH284T wurde mit SacI linearisiert und die 3' überhängenden Ende mit DNA-Polymerase I / Klenowfragment und dGTP in gerade Enden übergeführt. Der Vektor wurde mit SalI nachgeschnitten, und das große Fragment isoliert. Das HindIII-SalI Insert des Klons pRH212 wurde isoliert. Das Oligonukleotidpaar

- 5' GCTTGGTGGAA 3' EBI-684
- 3' CGAACCACCTTTCGA 5' EBI-685

wurde mit dem VAC-beta Insert und dem vorbereiteten pRH284T ligiert. E.coli HB101 wurde mit der Ligaselösung transformiert. Der resultierende Klon wurde pRH292 benannt (Fig.18).

Da in den Expressionsvektoren pRH291 (VAC-alpha) und pRH292 (VAC-beta) das Tetracyclinresistenzgen vom Promotor bis zur SalI-Stelle deletiert worden ist, können diese Vekoren keine Tetracyclinresistenz vermitteln. Tetracylin-resistente Expressionsvektoren erhält man beispielsweise durch die Konstruktion nach dem Schema in Fig. 36. VAC-alpha und VAC-beta cDNA weisen jeweils in der 3' nicht translatierten Region eine SphI Stelle auf. Im beta-Lactamase Gen des Vektors

** • 00,0,0,0

findet sich eine PvuI Stelle. Beide Erkennungssequenzen sind singulär. Daher kann durch Schnitt mit PvuI und SpHI ein Teil des beta-Lactamase-Gens, der phoA-Promotor und die den gesamten kodierenden Teil der VAC-alpha oder -beta plus etwas 3' nicht translatierter cDNA aus den beiden Expressionsvektoren freigesetzt werden. Andererseits kann aus dem Plasmid pAT153 durch Schnitt mit PvuI und EcoRI der Rest des beta-Lactamase Gens, der Replikationsursprung und das gesamte Tetracyclinresistenzgen inklusive des Promotors freigesetzt werden. Werden die SphI- bzw. EcoRI Enden durch enzymatische Behandlung gerade gemacht, erhält man hier kompatible Enden. Werden nun Vektor-Fragment und das VAC-alpha oder VAC-beta cDNA enthaltende Fragment ligiert, entstehen Expressionsvektoren, die das komplette Tetracyclin enthalten: pGN25 (VAC alpha), pGN26 (VAC-beta).

Kompetente Wirtsorganismen, beispielsweise E.coli, besonders bevorzugt E.coli HB101 wurden mit den so hergestellten Expressionsvektoren transformiert und in geeigneten Medien kultiviert.

Ein für die Expression von VAC-alfa und VAC-beta gut geeignetes Medium sei im folgenden mit seinen Komponenten-angeführt.

```
2.0 g/1
                        (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>
            1,5 g/1 K2HPO4.3H20
0,1
                  g/l KCl
0,1
                         NaCl
0.1
        - 10
                  g/1
                        NH4Cl
            5
                  g/l
0
                  g/1 \text{ MgSO}_4.7H_2O
           5
0,1
            0,1 g/1
0,001 -
             50 mg/l
                         Thiamin. HCl
        - 100 mg/l
                         (NH_4)_2Fe(SO_4)_2.6H_2O
              5 mg/l AlCl<sub>3</sub>.6H<sub>2</sub>O
0,1
            10 \text{ mg/l}
                         CoCl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O
0,1
                         KCr(SO<sub>4</sub>)2.12H<sub>2</sub>O
             5 mg/1
                         Cuso<sub>4</sub>.5H<sub>2</sub>O
              5 mg/l
0,1
              l mg/l
                         H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>
 0,05
            5 mg/l
                         Mnso<sub>4</sub>.H<sub>2</sub>o
 0.1
              5 mg/l
 0,1
                         Niso_4.6H_2O
                         Na MoO 2 2H O
             5 \text{ mg/l}
 0,1
              5 mg/l
                         znso_4.7H_2O
 0,1
                         Caseinhydrolysat (Merck Art.# 2238)
10
             30
                  g/l
                         Caseinhydrolysat (Sigma C9386)
                 g/1
           100
 0
                  mg/l Cystein
              1
 0,10
                  g/l Hefeextrakt (Difco)
             10
              2
                   g/l
                         Citronensäure
                         Glucose (Start)
             50
                   g/l
                         Glucose (Zufütterung während der
             50
                   g/1
```

Fermentation)

Besonders geeignet ist das Medium der Zusammensetzung:

Medien: 1) Vorkultur

- 10 g/l Trypton
- 5 g/l Hefeextrakt
- 4 g/l Glucose
- 9 g/1 Na₂HPO₄.2H₂O
- 1 g/l NH₄Cl
- 1 g/l KCl
- 1 ml/l 1M MgSO $_4.7H_2$ O
- 100 mg/l Ampicillin

Start-pH = 7.2

2) Hauptkultur

- 0.68 g/1 (NH₄)₂HPO₄
- 0,62 g/1 K2HPO4.3H20
- 2,33 g/1 KCl
- 0,5 g/l NaCl
- $0.53 \text{ g/l } \text{NH}_{4}\text{Cl}$
- 1,23 $g/1 MgSO_4.7H_2O$
- 0,011 g/l CaCl₂
- 10 mg/l Thiamin.HCl
- $3,92 \text{ mg/l} (NH_4)_2 \text{Fe(SO}_4)_2 \cdot 6H_2 \circ$
- 0,72 mg/l AlCl₃.6H₂O
- 0,71 mg/1 $CoCl_2.6H_2O$
- 1,5 mg/l $KCr(SO_4)_2.12H_2O$
- 0,75 mg/l $Cuso_4.5H_2^{\circ}$
- $0.19 \text{ mg/l} \text{ H}_3 \text{BO}_3$

5

- 0,51 mg/1 MnSO₄.H₂O
- 0,79 mg/l NiSO $_{4}$.6 $\overline{\text{H}}_{2}$ O
- 0.73 mg/l $Na_2MOO_4.2H_2O$
- 0,86 mg/l ZnSO₄.7H₂O
- 21 g/l Caseinhydrolysat (Merck Art.# 2238)
- g/l Caseinhydrolysat (Sigma C9386)
- 100 mg/l Cystein
 - 2 g/l Hefeextrakt
 - 1 g/l Citronensäure

Zur Fermentation wurde beispielsweise das
Vorkulturmedium mit E.coli, transformiert mit dem
entsprechenden Expressionsvektor, angeimpft und unter
Rühren und Sauerstoffzufuhr inkubiert. Ein Teil dieser
Vorkultur wurde dann in einen Fermenter mit dem
Hauptkulturmedium überführt und unter Rühren und
Belüften kultiviert. Während der Fermentationszeit
wurde die Glucosekonzentration und der
Sauerstoffpartialdruck beobachtet und entsprechend
optimiert. Nach etwa 20 Stunden Fermentationszeit
wurde der Ansatz abgekühlt, das Nährmedium von der
Biomasse abgetrennt und eingefroren.

Der Nachweis der exprimierten Proteine erfolgte beispielsweise durch Western Blot. Das Ergebnis ist in Fig. 19 weitergegeben.

"+Phosphat" ist die Kontrolle ohne Expression,
"-Phosphat" zeigt die Expression von VAC-alfa (Klon
HB101/pRH291) bzw. VAC-beta (Klon HB101/pRH292)
Protein unter der Kontrolle des alkalischen
Phosphatase Promotors. Sowohl VAC-alfa als auch
VAC-beta Protein sind bereits auf dem gefärbten Gel zu
erkennen. Die gebildete Menge an VAC-Proteinen beträgt
überraschenderweise mindestens 20 mg/1/OD600nm
Bakterienkultur.

Der Western Blot zeigt deutlich die angefärbte VAC-alfa Bande. Zusätzlich sind einige Proteine niedrigeren Molekulargewichts im Bereich bis 30 kD erkennbar, die möglicherweise durch proteolytische Spaltung am Nund/oder C-Terminus des VAC-alfa Proteins entstanden sind. Auffällig ist außerdem ein durch das Antiserum erkanntes Protein im Bereich kleiner 20 kD, das ein durch Proteolyse entstandenes Halbmolekül des VAC-alfa Proteins darstellen könnte. Überraschenderweise wurde

auch VAC-beta durch Anti-VAC-Antiserum erkannt. Da diese Bande wesentlich schwächer als die VAC-alfa Bande gefärbt ist, andererseits aber die VAC-beta Bande im Coomassie Blau gefärbten Gel in ihrer Intensität dem VAC-alfa entspricht, ist daraus zu schließen, daß die Erkennung des VAC-beta Proteins durch das Anti-VAC-Antiserum wesentlich schlechter als jene des VAC-alfa Proteins erfolgt.

Zur Isolierung und Reinigung der exprimierten Proteine wurde die gefrorene Biomasse in einem geeigneten Lyse-Puffer suspendiert. Die Zellen wurden anschließend mechanisch, beispielsweise durch eine Manton-Gaulin Presse zerstört. Nach Zugabe eines Fällungsmittels für Nicht-Protein-Bestandteile, wie Polyethylenimin, wurden die festen Bestandteile beispielsweise durch Zentrifugation entfernt. Nach Ausfällung der Proteine, vorzugsweise durch Ammoniumsulfatfraktionierung, . Auflösung des Präzipitates, Entfernung des Fällungsmittels und Klärung der Lösung wurde der so erhaltene Extrakt verschiedenen chromatographischen Reinigungsschritten unterworfen. Anstelle der Ausfällung der Proteine läßt sich der rohe VAC-Extrakt auch durch eine chromatographische Vorreinigung soweit reinigen, daß er anschließend einem Reinigungszyklus unterworfen werden kann. Als geeignetes Säulenmaterial für die Vorreinigung hat sich beispielsweise SiO, herausgestellt, doch sind auch andere Materialien mit ähnlichen Eigenschaften geeignet. Erfindungsgemäß wurde Silica Catalyst, Carrier, Grade 953 W der Firma Grace verwendet.

Ein für die Reinigung der erfindungsgemäßen Proteine geeigneter chromatographischer Reinigungszyklus bestand beispielsweise aus einer DEAE-Fast-Flow-Sepharose-, einer Sephacryl S-200 High Resolution- und einer Q-Sepharose-Fast-Flow-Chromatographie. Die Reinheit der so erhältlichen erfindungsgemäßen Proteine wurde mittels SDS-PAGE, Western Blot, Gelpermeations HPLC, Reverse HPLC und isoelektrischer Fokussierung bestimmt.

Die für sämtliche Kultivierungs-, Isolierungs- und Reinigungsschritte erforderlichen einzuhaltenden Parameter wie Temperatur, Mengenverhältnisse, Reihenfolge der einzelnen Schritte, pH-Werte, besondere Reagentien etc. sind dem Fachmann bestens bekannt. Die unten angegebenen Beispiele können, falls gewünscht, in geeigneter, dem Fachmann bekannter Weise abgewandelt werden.

Von besonderer Bedeutung ist die Frage, ob ein durch gentechnische Methoden hergestelltes VAC-Protein, im folgenden kurz r-VAC genannt, mit dem aus natürlichem Material erhältlichen VAC-Protein (s. EPA 0 181 465), im folgenden VAC genannt, identisch ist; identisch sowohl in seiner Struktur als auch in seinen biologischen Eigenschaften.

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden folgende Methoden verwendet:

- Gelpermeations-HPLC
- 2. Reverse Phase HPLC
- 3. N-terminale Sequenzierung
- 4. Tryptische Peptid Karte
- 5. SDS-Gelelektrophorese
- 6. Western Blot
- 7. Isoelektrische Fokussierung

Die Gelpermeations-HPLC weist für VAC ein Molekulargewicht von 34.000, für r-VAC von 33.000 auf, was innerhalb der Genauigkeit der Methode als gleichwertig zu betrachten ist. Es ist zu beachten, daß die verwendete Säule streng genommen nicht nach dem Molekulargewicht sondern nach der Molekülgröße differenziert.

Bei der Reverse Phase HPLC eluieren beide Proteine nach einer Retentionszeit von etwa 29 Minuten.

Die N-terminale Sequenzierung des r-VAC bis zur Aminosäure 39 ergab 100%ige Übereinstimmung mit der erwarteten Sequenz. N-terminales Methionin, oft bei gentechnisch hergestellten Proteinen zusätzlich anzutreffen, konnte überraschenderweise nicht nachgewiesen werden. Wie zu erwarten war, liegt der N-Terminus des r-VAC unblockiert vor.

Bei dem Vergleich der tryptischen Fragmentierung ergab sich ein praktisch identisches Peptidmuster.

Auch der Vergleich der beiden Proteine mittels SDS-PAGE zeigte praktisch gleichartiges Verhalten. Beide beinhalten dimere Formen, die offensichtlich über Disulfidbrücken gebunden sind und mit Dithiothreitol reduziert werden können.

Ebenso bestätigte der immunologische Vergleich durch Western Blot die Identität der beiden Proteine.

Der bei der Ermittlung des isoelektrischen Punktes festzustellende Unterschied von +0.1 pH-Einheiten bei r-VAC läßt sich durch den freien N-Terminus erklären.

Zur Überprüfung der biologischen Aktivität des r-VAC wurden verschiedene Koagulationstest durchgeführt und die Ergebnisse mit denen verglichen, die mit VAC aus natürlichem Material erhalten wurden. Alle durchgeführten Tests, der modifizierte Prothrombin Zeit Test, ebenso wie der Thrombin Test, ebenso wie die Faktor X_-Generation in Gewebefaktor-aktiviertem Plasma belegen eindeutig, daß r-VAC biologische Aktivität aufweist, und daß diese nicht zu unterscheiden ist von der des VAC aus natürlichem Material.

Die aus der cDNA abgeleiteten Aminosäuresequenz für VACB zeigt eine 54% Homologie zu VAC-α. Aufgrund dieses Befundes wurden einige biologische Aktivitäten von VAC-β mit denen von VAC-α verglichen.

- 1. Der Effekt von VAC-α und VAC-β auf die Prothrombinase-Aktivität: Fig. 47 zeigt, daß beide Proteine VAC-α und VAC-β den gleichen inhibitorischen Effekt auf die Prothrombinase-Aktivität ausüben, was den gleichen Mechanismus für die Koagulationsinhibitation vermuten läßt.
- 2. Phospholipase Inhibitationsaktivität: wie bereits erwähnt, lassen sich VAC-α aufgrund ihrer Primärstruktur und VAC-β in die Familie der Amexine einordnen. (Gusow, M.J. (1987) Febsletters 203, 99-103). Einige andere Mitglieder dieser Familie, z.B. Calpactin I und II haben sich als Phospholipase Inhibitoren herausgestellt. Ihre Aktivität beruht auf einer Calcium-abhängigen Bindung an die Phospholipide wodurch sie den Angriff der Phospholipase auf ihr Substrat blockieren (Davidson et al. (1987) J. Biol. Chem. 262, 1698-1705.

Da nun VAC-α und VAC-B Calcium-abhängig an Phospholipide binden, wurde überprüft, ob die beiden Proteine ebenso auch mögliche Antiphospholipase-Aktivitäten aufweisen. Ein Testverfahren mit 3-H-Ölsäure markiertem E.coli wurde hierzu verwendet.

Die Figuren 48 und 49 zeigen, daß sowohl VAC-α als auch VAC-β Phospholipase A₂ Aktivität inhibieren. Weiterhin sind beide Proteine unter den gewählten Bedingungen gleich aktiv. 50% Inhibition wurde bei ca. 65 mM VAC-α oder VAC-β beobachtet. Verminderung der Substrat Konzentration auf die Hälfte resultierte in einer Reduzierung der ID₅₀ von VAC auf die Hälfte. Dies ist ein Hinweis darauf, daß VAC auf der Substratebene agiert. Folglich findet VAC wahrscheinlich an die Phospholipidmembranen und inhibiert hierdurch die Phospholipase Aktivität.

Calpactin I bindet an Phospholipidmembranen auf dem mikromolaren Ca⁺⁺ Level (Drust, D.S. & Cremitz, C.E. (1988) Nature 331, 88-91). Daher wurde untersucht, ob VAC in der Lage ist, Phospholipase-Aktivität bei geringer Calcium Konzentration zu inhibtieren. Da die pankreatische Phospholipase A₂ bei Ca⁺⁺ Konzentrationen unter 50 mM inaktiv war, was das die niedrigste verwendete Konzentration. Die Figuren und 51 zeigen die Calcium-Abhängigkeit der VAC induzierten Inhibition der Phospholipase Aktivität. Bei allen Ca^{++} Konzentrationen zeigte sowohl VAC- α als auch VAC-B Inhibitor-Aktivitäten. Doch scheint ein funktioneller Unterschied zwischen VAC- α als auch VAC-B Inhibitor-Aktivitäten. Doch scheint ein funktioneller Unterschied zwischen VAC- α und VAC- β zu bestehen. Bei der niedrigsten Ca⁺⁺-Konzentration war VAC-B signifikant aktiver als VAC- α . Dies könnte implizieren, daß VAC-ß weniger Ca⁺⁺ zur Membranbindung benötigt.

Verfahrensgemäß erhältliche VAC-Proteine können in an sich bekannter Weise in andere VAC-Proteine (Peptide) überführt werden.

Untersuchungen haben gezeigt, daß Disulfidbrücken für die gerinnungshemmende Aktivität von natürlichem VAC ohne Bedeutung ist. Je nach Wahl der Wirtszelle kann nicht ausgeschlossen werden, daß eine Verknüpfung der Cystein-Reste im primären Translationsprodukt unter Bildung von Disulfidbrücken in einer Weise erfolgt, die sich vom natürlich ablaufenden Vorgang unterscheidet. Es ist möglich, daß die sich einstellende "falsche" Tertiärstruktur des Produktes eine Verminderung oder sogar den Verlust, evtl. aber auch eine Verbesserung, der wertvollen pharmakologischen Eigenschaften, insbesondere der gerinnungshemmenden Aktivität, zur Folge hat, was sich mit Hilfe der oben genannten VAC-Assays feststellen läßt. In einem solchen Fall ist es gegebenenfalls zweckmäßig, die Disulfidbindungen mit einem geeigneten Reduktionsmittel zu spalten und das reduzierte Polypeptid zur Neuknüpfung der Disulfidbindungen mit einem geeigneten Oxidationsmittel zu behandeln. Anhand der VAC-Aktivität des gebildeten Produktes läßt sich feststellen, ob die gewählten Bedingungen (Reduktionsund/oder Oxidationsmittel) zur gewünschten Steigerung der biologischen Aktivität geführt haben oder ob die Bedingungen in bekannter Weise modifiziert werden müssen.

Zur Aufspaltung von Disulfidbrücken geeignete Reduktionsmittel sind beispielsweise Thiol-Verbindungen, wie Thiophenol, 4-Nitrothiophenol, 1,4-Butandithiol und insbesondere 1,4-Dithiothreit. 11 - 00,0.0.0

Die Reduktion wird vorteilhaft in einem wäßrig-alkalischen Medium, beispielsweise in der verdünnten wässrigen Lösung eines Alkalimetallhydroxids, z.B. Natriumhydroxid, Alkalimetallcarbonats, z.B. Natriumcarbonats, oder einer organischen Base, insbesondere eines Triniederalkylamins, z.B. Triäthylamin, bei Raumtemperatur durchgeführt.

Oxidationsmittel, welche zur Neuknüpfung von Disulfidbindungen in den reduzierten Polypeptiden geeignet sind, sind beispielsweise Luftsauerstoff, welcher durch eine wässrige Lösung des Polypeptids, der gegebenenfalls eine katalytische Menge eines Übergangsmetallsalzes, z.B. Eisen-(III)-sulfat, Eisen-(III)-chlorid oder Kupfer-(II)-sulfat, beigefügt wurde, geleitet wird; Jod, auch in Form des Kaliumjodid-Adduktes KJ3, welches vorzugsweise in alkoholischer, z.B. methanolischer, oder wässrig-alkoholischer, z.B. wässrig-methanolischer Lösung eingesetzt wird; Kaliumhexacyanoferrat-(III) in wässriger Lösung; 1.2-Dijodäthan oder Azodicarbonsäuredimethylester oder -diäthylester, welche in Wasser oder in einer Mischung bestehend aus Wasser und einem mit Wasser mischbaren Alkohol, z.B. Methanol, zur Reaktion gebracht werden. Die Oxidation wird insbesondere bei Raumtemperatur ausgeführt.

Die Abtrennung der Reagentien, insbesondere der Salze und der Oxidations- bzw. der Reduktionsmittel und ihrer Folgeprodukte, von der gewünschten VAC-Verbindung erfolgt nach an sich bekannten Methoden, beispielsweise durch Molekulargewichtsfiltration, z.B. an Sephadex oder Biogel.

Ein verfahrensgemäß erhältliches Gemisch von Verbindungen mit VAC-Aktivität kann in an sich bekannter Weise in die einzelnen Komponenten aufgetrennt werden. Geeignete Trennverfahren sind beispielsweise chromatographische Verfahren, z.B. Adsorptions-Chromatographie, Ionenaustauschchromatographie, HPLC oder Reverse-Phase HPLC, ferner multiplikative Verteilung oder elektrophoretische Methoden, z.B. Elektrophorese an Celluloseacetat oder Gelelektrophorese, insbesondere Polyacrylamid- Gelelektrophorese ("PAGE").

Die erfindungsgemäß herstellbaren Verbindungen können nicht nur in freier Form. sondern auch in Form ihrer Salze, insbesondere ihrer pharmazeutisch annehmbaren Salze, vorliegen. Da sie mehrere Aminosäurereste mit freien Aminogruppen enthalten, können die erfindungsgemäßen Verbindungen z.B. in Form von Säureadditionssalzen vorliegen. Als Säureadditionssalze kommen insbesondere physiologisch verträgliche Salze mit üblichen, therapeutisch anwendbaren Säuren in Betracht; als anorganische Säuren sind die Halogenwasserstoffsäuren, wie die Chlorwasserstoffsäure, aber auch Schwefelsäure und Phosphor- bzw. Pyrophosphorsäure zu nennen; als organische Säuren sind in erster Linie Sulfonsäuren, wie die Benzol- oder p-Toluosulfonsäure oder Niederalkansulfonsäuren, wie Methansulfonsäure, sowie Carbonsäuren, wie Essigsäuren, Milchsäure, Palmitinund Stearinsäure, Äpfelsäure, Weinsäure, Ascorbinsäure und Citronensäure geeignet. Da die VAC-Verbindungen auch Aminosäurereste mit freien Carboxylgruppen enthalten, können sie auch als Metallsalz, insbesondere als Alkalimetall- oder Erdalkalimetallsalz, z.B. Natrium-, Calcium- oder Magnesiumsalz, oder auch als

Ammoniumsalz, abgeleitet von Ammoniak oder einer physiologisch verträglichen, organischen stickstoffhaltigen Base, vorliegen. Da sie aber zugleich freie Carboxylgruppen und freie Aminogruppen enthalten, können sie auch als innere Salz vorliegen.

Je nach Arbeitsweise erhält man die erfindungsgemäßen Verbindungen in freier Form, in Form von Säureadditionssalzen oder Salzen mit Basen. Aus den Säureadditionssalzen und den Salzen mit Basen können in an sich bekannter Weise, beispielsweise durch Einstellen des pH-Wertes auf den isoelektrischen Punkt, die freien Verbindungen gewonnen werden. Von letzteren wiederum lassen sich durch Umsetzen mit Säuren bzw. Basen, z.B. mit solchen, die die oben genannten Salze bilden, und Eindampfen oder Lyophilisieren therapeutisch annehmbare Säureadditionssalze bzw. Salze mit Basen gewinnen.

Die Eigenschaft von Antikörpern, spezifische Antigene zu binden, findet außerhalb des Körpers praktische Anwendung bei der qualitativen und quantitativen Bestimmung (Immuno-Assay) und bei der Reinigung der Antigene (Immunoaffinitätschromatographie). Serum immunisierter Tiere enthält normalerweise eine Vielzahl verschiedener Antikörper, die mit dem gleichen Antigen an verschiedenen Bindungsstellen mit verschiedener Affinität reagieren, dazu aber auch Antikörper gegen andere Antigene, die die früheren Erfahrungen des Individuums widerspiegeln. Die erfolgreiche Anwendung von Antikörpern zur Bestimmung und Reinigung von Antigenen erfordert aber hohe Spezifität und Reproduzierbarkeit.

Homogene Antikörper, die diese Anforderungen erfüllen, sind durch die von Köhler und Milstein (17) beschriebene Hybridoma-Technik zugänglich geworden. Prinzipiell besteht die Technik darin, daß Antikörper ausscheidende B-Lymphozyten, z.B. aus der Milz, immunisierter Tiere mit Tumorzellen verschmolzen ("fusioniert") werden. Die gebildeten Hybridoma-Zellen kombinieren die Fähigkeit zur unbegrenzten Vermehrung durch Teilung mit der Fähigkeit, einen einheitlichen Typ Antikörper zu bilden und auszuscheiden. Durch Kultivierung in einem selektiven Medium, in dem nicht fusionierte Tumorzellen absterben, Hybridoma-Zellen sich aber vermehren, und durch geeignete Manipulationen können Klone, d.h. Zellpopulationen, die sich von einer einzigen Hybridoma-Zelle ableiten und genetisch identisch sind, gewonnen und kultiviert und die durch die Zellen produzierten monoklonalen Antikörper isoliert werden.

Die vorliegende Erfindung betrifft monoklonale Antikörper gegen VAC, Hybridomazellen, die solche Antikörper produzieren und Verfahren zu ihrer Herstellung. Bevorzugt sind Hybridomazellinien und die von diesen ausgeschiedenen monoklonalen Antikörper, die spezifisch mit VAC reagieren. Das Verfahren zur Herstellung von monoklonalen Anti-VAC-a und Anti-VAC-B-Antikörpern ist dadurch gekennzeichnet, daß man Mäuse mit VAC immunisiert, B-Lymphozyten derart immunisierter Tiere mit Myelomazellen fusioniert, die gebildeten Hybridomazellen kloniert, dann in vitro oder durch Injektion in Mäusen kultiviert und aus den Kulturen Antikörper isoliert.

Die Erfindung betrifft ferner Immuno-Affinitätschromatographie-Säulen und Test-Kits für Immunoassays, die diese Antikörper enthalten. Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren werden Mäuse, z.B. Balb/c-Mäuse, auf an sich bekannte Weise immunisiert. In einer bevorzugten Ausführungsform wird VAC etwa wöchentlich oder auch in größeren Abständen während mehreren Wochen, beispielsweise 5 bis 12 Wochen, injiziert, bis sich eine genügende Zahl Antikörper-produzierender B-Lymphozyten gebildet hat.

Zur Steigerung der Immunogenität des eingesetzten VAC wurde es an stark immunogene Träger wie beispielsweise heterologes Albumin oder "keyhole limpet hemocyanin" (KLH) gekoppelt. Bevorzugt wurden verschiedene VAC/KLH Präparationen eingesetzt, wobei nach einem Immunisierungsschema so lange immunisiert wurde, bis sich genügend Antikörper-produzierende Zellen gebildet hatten, beispielsweise bis zu ca. 40 Wochen. B-Lymphozyten enthaltende Organe, z. B. Milzzellen, der immunisierten Mäuse werden entnommen und mit solchen Myelomazellen fusioniert, die aufgrund einer Mutation in einem selektiven Kulturmedium nicht wachsen. Solche Myelomazellen sind bekannt und sind beispielsweise jene mit der Bezeichnung X63-Ag8, X63-Ag8.6.5.3, MPC-11, NS1-Ag4/1; MOPC-21 NS/1 oder SP 2/0. In einer bevorzugten Ausführungsform werden Milzzellen immunisierter Mäuse mit Myelomazellen der Zell-Linie X63-Ag8.6.5.3 fusioniert.

Die Fusion wird nach an sich bekannten Verfahren durch Mischen der B-Lymphozyten und der Myelomazellen unter Zugabe eines Zellfusionsagens, wie Polyethylenglykol, Sendai-Virus, Calciumchlorid oder Lysolecithin durchgeführt. Vorzugsweise wird in Gegenwart von Polyethylenglykol, beispielsweise mit einem Molekulargewicht zwischen 1000 und 4000, fusioniert.

Nach der Fusion werden die entstandenen Hybride nach einem an sich bekannten Verfahren in einem selektiven Kulturmedium, das mit Hypoxanthin, Aminopterin und Thymidin (HAT-Medium) komplementiert ist, kultiviert. Nicht fusionierte Myelomazellen können in diesem Medium nicht wachsen und sterben ebenso wie normale Lymphozyten.

Die Überstände der Hybridoma-Kulturen können mit an sich bekannten Verfahren auf ihren Gehalt an spezifischen Antikörpern geprüft werden, beispielsweise mit Radio-Immunoassay, ELISA oder Agglutinierung. Dabei wird überraschenderweise festgestellt, daß mit dem beschriebenen Verfahren Hybridoma-Zellen gewonnen werden können, die Antikörper spezifisch gegen VAC ausscheiden. Die Hybridomazellen, die Antikörper der gewünschten Spezifität produzieren, werden aus dem aus der Fusionierung hervorgegangenen Gemisch verschiedenster Hybridomazellen durch Klonieren herausselektioniert. Dazu werden nach einem an sich bekannten Verfahren, das "limiting dilution" genannt wird, Kulturen ausgehend von einer einzigen wachsenden Zelle angesetzt.

Zur Massenproduktion werden die Hybridoma-Zellklone, die Antikörper der gewünschten Spezifität produzieren, entweder in an sich bekannten Medien in vitro kultiviert oder zur Vermehrung in Mäuse injiziert. In einer bevorzugten Ausführungsform werden Hybridomazellen in mit Pristan vorbehandelte Mäuse injiziert, Aszites-Flüssigkeit entnommen und daraus durch Fällung mit Ammoniumsulfat-Lösung Antikörper isoliert.

Die mit Hilfe dieser Hybridomazellen gewonnenen VAC spezifischen Antikörper können auf an sich bekannte Weise für die Herstellung von

Immuno-Affinitätschromatographie- Säulen verwendet werden. In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird ein geeignetes Trägermaterial (suspendiert in einer Pufferlösung) mit einer Antikörper-Lösung versetzt, ungebundene Anteile werden anschließend ausgewaschen und unbesetzte Stellen des Trägermaterials blockiert.

Die mit Hilfe der Hybridomazellen gewonnenen VAC spezifischen Antikörper können auf an sich bekannte Weise für die Herstellung von Test-Kits verwendet werden. Diese Test-Kits können auf verschiedenen Methoden beruhen, beispielsweise auf Radio-Immuno-Assay, Latex-Agglutinierung, Tüpfel-Tests, Kompetitive oder Sandwich-Radio-Immunoassay, Enzym-Immunoassay, Immuno-Fluoreszenz oder immunochemischen Enzym-Tests. Solche Kits können neben gewöhnlichen Antikörpern verschiedener Herkunft Antikörper-Konjugate mit Enzymen oder Fluoreszenzträgern enthalten, dazu VAC markiert mit radioaktiven Isotopen wie J , oder konjugiert mit Enzymen, beispielsweise mit Meerrettich-Peroxidase oder alkalischer Phosphatase, ferner Enzymsubstrate,

geeignete Puffer, Gele, Latex, Polystyrol oder andere

Die gemäß der vorliegenden Erfindung erhältlichen bekannten Proteine (Peptide) weisen wertvolle pharmakologische Eigenschaften auf und können prophylaktisch oder insbesondere therapeutisch angewendet werden.

Füllmaterialien und Träger.

Die erfindungsgemäßen neuen VAC Verbindungen können daher in Analogie zu natürlichem VAC zur Therapie und Prophylaxe von Thrombosen und Thromboembolien, einschließlich zur Prophylaxe von postoperativen Thrombosen, zur akuten Schock-Therapie (z. B. bei septischem oder polytraumatischem Schock), zur Therapie von Verbrauchskoagulopathien, bei Hämodialysen, Hämoseparationen, Blutkonserven und im extrakorporalen Kreislauf verwendet werden.

Die Erfindung betrifft ebenfalls pharmazeutische Zusammensetzungen, welche wenigstens eine der erfindungsgemäßen Verbindungen oder deren pharmazeutisch annehmbaren Salze, gegebenenfalls zusammen mit einem pharmazeutisch annehmbaren Träger und/oder Hilfsstoffen, enthalten. Diese Zusammensetzungen können insbesondere bei den oben angegebenen Indikationen Verwendung finden, wenn sie z. B. parenteral, wie intravenös, intracutan, subcutan oder intramuskulär, oder topisch verabreicht werden.

Die Erfindung betrifft ebenfalls die Verwendung der erfindungsgemäßen neuen Verbindungen und diese enthaltende pharmazeutische Zusammensetzungen für die prophylaktische und therapeutische Behandlung des menschlichen und tierischen Körpers, insbesondere bei den oben angegebenen Krankheitsbildern, in erster Linie zur Hemmung der Gerinnung des Blutes innerhalb und außerhalb des menschlichen und tierischen Körpers.

Die Dosierung hängt in erster Linie von der spezifischen Verabreichungsform und vom Zweck der Therapie bzw. Prophylaxe ab. Die Größe der Einzeldosen sowie das Verabreichungsschema kann am besten anhand einer individuellen Beurteilung des jeweiligen

Krankheitsfalles bestimmt werden: die dazu erforderlichen Methoden zur Bestimmung von relevanten Blutfaktoren sind dem Fachmann geläufig. Im Normalfall liegt bei einer Injektion die therapeutisch wirksame Menge der erfindungsgemäßen Verbindungen im Dosisbereich von etwa 0,005 bis etwa 0,1 mg/kg Körpergewicht. Bevorzugt wird der Bereich von etwa 0,01 bis etwa 0,05 mg/kg Körpergewicht. Die Verabreichung erfolgt durch intravenöse, intramuskuläre oder subcutane Injektion. Dementsprechend enthalten pharmazeutische Präparate zur parenteralen Verabreichung in Einzeldosis-Form in Abhängigkeit von der Applikationsart pro Dosis etwa 0,4 bis etwa 7,5 mg der erfindungsgemäßen Verbindung. Neben dem Wirkstoff enthalten diese pharmazeutischen Zusammensetzungen üblicherweise noch einen Puffer, z. B. einen Phosphatpuffer, der den pH-Wert zwischen etwa 3,5 und 7 halten soll, und ferner Natriumchlorid, Mannit oder Sorbit zur Einstellung der Isotonie. Sie können in gefriergetrockneter oder gelöster Form vorliegen, wobei Lösungen ein antibakteriell wirkendes Konservierungsmittel, z. B. 0,2 bis 0,3 % 4-Hydroxybenzoesäuremethylester oder -ethylester, enthalten können. Ein Präparat für die topische Anwendung kann als wässrige Lösung, Lotion oder Gelee, ölige Lösung oder Suspension, oder fetthaltige oder insbesondere Emulsions-Salbe vorliegen. Ein Präparat in Form einer wässrigen Lösung erhält man beispielsweise dadurch, daß man die erfindungsgemäßen Wirkstoffe oder ein therapeutisch, annehmbares Salz davon in einer wässrigen Pufferlösung von pH 4 bis 6,5 löst und gewünschtenfalls einen weiteren Wirkstoff, z. B. ein Antiinflammatorikum, und/oder ein polymeres Haftmittel, z. B. Polyvinylpyrrolidon, und/oder ein Konservierungsmittel zufügt. Die Konzentration des

Wirkstoffs beträgt etwa 0,1 bis etwa 1,5 mg, vorzugsweise 0,25 bis 1,0 mg, in 10 ml einer Lösung bzw. 10 g eines Geles.

Eine ölige Applikationsform für die topische Verabreichung erhält man beispielsweise durch Suspendieren der erfindungsgemäßen Wirkstoffe oder eines therapeutisch annehmbaren Salzes davon in einem Oel, gegebenfalls unter Zusatz von Quellmitteln, wie Aluminiumstearat, und/oder grenzflächenaktiven Mitteln (Tensiden), deren HLB-Wert ("hydrophilic-lipophilicbalance") unter 10 liegt, wie Fettsäuremonoester mehrwertiger Alkohole, z. B. Glycerinmonostearat, Sorbitanmonolaurat, Sorbitanmonostearat oder Sorbitanmonooleat. Eine fetthaltige Salbe erhält man z. B. durch Suspendieren der erfindungsgemäßen Wirkstoffe oder deren Salze in einer streichbaren Fettgrundlage, gegebenenfalls unter Zusatz eines Tensids vom HLB-Wert unter 10. Eine Emulsionssalbe erhält man durch Verreiben einer wässerigen Lösung der erfindungsgemäßen Wirkstoffe oder deren Salze in einer weichen. streichbaren Fettunterlage unter Zusatz eines Tensids, dessen HLB-Wert unter 10 liegt. Alle diese topischen Applikationsformen können auch Konservierungsmittel enthalten. Die Konzentration des Wirkstoffes beträgt 0,1 bis 1,5 mg, vorzugsweise 0,25 bis 1,0 mg, in etwa 10 g der Grundmasse.

Neben den oben beschriebenen und ihren analogen pharmazeutischen Zusammetzungen, welche für einen direkten medizinischen Einsatz am Körper des Menschen oder eines Säugetieres bestimmt sind, betrifft die vorliegende Erfindung auch pharmazeutische Zusammensetzungen und Präparate zur medizinischen Anwendung außerhalb des lebenden Körpers des Menschen

oder der Säugetiere. Solche Zusammensetzungen und Präparate verwendet man in erster Linie als gerinnungshemmenden Zusatz zu Blut, welches außerhalb des Körpers einer Zirkulation oder Behandlung (z.B. extrakorporaler Kreislauf oder Dialyse in künstlichen Nieren), Konservierung oder Modifizierung (z.B. Hämoseparation) unterzogen wird. In ihrer Zusammensetzung sind derartige Präparate, wie Vorratslösungen oder auch Zubereitungen in Einzeldosis-Form, den oben beschriebenen Injektionspräparaten ähnlich; zweckmäßigerweise wird aber die Wirkstoffmenge bzw. -konzentration auf das Volumen des zu behandelnden Blutes bezogen. Je nach dem spezifischen Zweck beträgt die geeignete Dosis etwa 0,01 bis etwa 1,0 mg Wirkstoff/1 Blut, wobei die obere Grenze ohne Gefahr noch überschritten werden darf.

Insbesondere betrifft die Erfindung die in den Belegbeispielen beschriebenen, für die für VAC-Proteine kodierenden DNA-Moleküle, solche DNA-Moleküle enthaltende Expressionsplasmide, mit solchen Expressionsplasmiden transformierte Mikroorgansimen, monoklonale Antikörper gegen VAC, Hybridoma-Zellen, die solche Antikörper produzieren, und Test-Kits für Immunoassays, die solche Antikörper enthalten, die in den Beispielen beschriebenen Verfahren zu ihrer Herstellung und das in den Beispielen beschriebene Verfahren zur Herstellung von Proteinen/Polypeptiden mit VAC-Aktivität mit Hilfe der transformierten Mikroorganismen, sowie die in den Beispielen beschriebenen neuen VAC-Verbindungen.

Wird in der vorliegenden Anmeldung von vascular-antikoagulierenden Proteinen oder in der Kurzform VAC-Protein gesprochen, so bedeutet das wenn nicht anders angegeben, daß hiermit Polypeptide/ Proteine gemeint sind, die im wesentlichen die Eigenschaften aufweisen, die den Proteinen eigen sind, die in der EPA 181 465 erstmals beschrieben wurden. Diese Eigenschaften lassen sich durch die dort angegebenen Test- und Charakterisierungsverfahren feststellen und überprüfen (VAC-Aktivität).

Weiterhin fallen unter diese Definition auch die Polypeptide/Proteine, die Aggregationen wie beispielsweise Dimere, Trimere oder Tetramere darstellen, auch wenn diese in der aggregierten Form per se nicht oder nur eingeschränkte biologische Aktivitäten aufweisen, unter der Voraussetzung, daß diese in vivo oder in vitro in zumindest eine aktive Komponente zu überführen sind.

Werden im Rahmen der vorliegenden Erfindung
Polypeptide/ Proteine erhalten, die per se nicht oder
nur eingeschränkte biologische Aktivitäten aufweisen,
beispielsweise Fusionsproteine oder sogenannte
"pro-drugs", Polypeptide/Proteine, die für den Fachmann
in an sich bekannter Weise in die aktiven Komponenten
überführbar sind, beispielsweise durch in vitro oder in
vivo Prozessierung oder Polypeptide/Proteine, die erst
in vivo ihre Aktivität entfalten, so sollen auch diese
unter die Definition vascular-antikoagulierende-, kurz
VAC-Proteine gefaßt sein und damit zum Gegenstand der
vorliegenden Erfindung gehören.

Unter "Verbindungen mit VAC-Aktivität" werden auch solche, von den genannten transformierten Wirtszellen exprimierte Polypeptide verstanden, welche eine VAC-Wirkung und eine positive Reaktion mit anti-VAC-Antikörpern zeigen und welche die Primärstruktur von VAC oder eine davon abgeleitete

Struktur aufweisen. Unter VAC-Verbindungen mit einer von der Primärstruktur von VAC abgeleiteten Struktur werden modifizierte VAC-Verbindungen verstanden, wobei die Modifizierung in einer Verkürzung der Primärstruktur des VAC, in einer Umordnung der Repeat-Struktur oder in einer Modifizierung, die zu einer Veränderung der Stabilität bzw. Aktivität führt.

VAC-DNA/Gen steht in der vorliegenden Erfindung für die DNA-Moleküle, die für die oben definierten VAC-Proteine kodieren.

Die folgenden Beispiele und Zeichnungen dienen zur Illustration der Erfindung und sollen sie in keiner Weise einschränken.

Um die nachfolgenden Beispiele zu vereinfachen, werden oft wiederkehrende Methoden kurz beschrieben.

Plasmide werden mit einem kleinen "p" bezeichnet, gefolgt von Großbuchstaben und Ziffern.
Ausgangsplasmide sind käuflich oder ohne Einschränkung öffentlich erhältlich. Sie können auch aus solchen Plasmiden mittels publizierter Methoden konstruiert werden.

"Schneiden" oder "Verdauen" von DNA bezieht sich auf die katalytische Spaltung der DNA mittels Restriktionsendonukleasen (Restriktionsenzyme) an für diese spezifischen Stellen, Restriktionsstellen genannt. Restriktionsendonukleasen sind käuflich erhältlich und werden unter den von den Herstellern empfohlenen Bedingungen (Puffer, Rinderserumalbumin (BSA) als Trägerprotein, Dithiothreit (DTT) als Oxidationsschutz) eingesetzt.

Restriktionsendonukleasen werden mit einem Großbuchstaben, meist gefolgt von Kleinbuchstaben und normalerweise einer römischen Ziffer bezeichnet. Die Buchstaben hängen von dem Mikroorganismus ab, aus dem die betreffende Restriktionsendonuklease isoliert wurde (z.B.: Sma I: Serratia marcescens). Ublicherweise wird etwa lug DNA mit einer oder mehreren Einheiten des Enzyms in etwa 20 µl Pufferlösung geschnitten. Normalerweise wird eine Inkubationsdauer von 1 Stunde bei 37°C verwendet, kann aber laut den Verwendungsvorschriften des Herstellers variiert werden. Nach dem Schneiden wird manchmal die 5'Phosphatgruppe durch Inkubation mit alkalischer Phosphatase aus Kalbsdarm (CIP) entfernt. Dies dient zur Verhinderung einer ungewünschten Reaktion der spezifischen Stelle in einer nachfolgenden Ligasereaktion (z.B. Zirkularisierung eines linearisierten Plasmids ohne Insertierung eines zweiten DNA-Fragmentes). Wenn nicht anders angegeben, werden DNA-Fragmente nach dem Schneiden mit Restriktionsendonukleasen normalerweise nicht dephosphoryliert. Reaktionsbedingungen für die Inkubation mit alkalischer Phospatase sind z.B. dem Ml3 Cloning und Sequencing Handbuch (Cloning and Sequencing handbook, Fa Amersham, PI/129/83/12) zu entnehmen.

Nach der Inkubation wird Protein durch Extraktion mit Phenol und Chloroform entfernt, und die DNA aus der wäßrigen Phase durch Zusatz von Äthanol präzipitiert.

"Isolierung" eines bestimmten DNA Fragments bedeutet die Auftrennung der geschnittenen DNA auf einem z.B. 1% Agarosegel. Nach der Elektrophorese und dem Sichtbarmachen der DNA im UV-Licht durch Anfärben mit Äthidiumbromid (EtBr) wird das gewünschte Fragment anhand mitaufgetragener Molekulargewichtsmarker lokalisiert und durch weitere Elektrophorese an DE 81 Papier (Schleicher und Schuell) gebunden. Die DNA wird durch Spülen mit Niedrigsalzpuffer (200 mM NaCl, 20 mM Tris pH=7,5, 1 mM EDTA) gewaschen und anschließend mit einem Hochsalzpuffer (1 M NaCl, 20 mM Tris pH=7,5, 1 mM EDTA) eluiert. Die DNA wird durch Zusatz von Äthanol präzipitiert.

"Southern Analyse" ist jene Methode, durch die die Gegenwart eines bestimmten DNA-Fragments in einem DNA-Gemisch durch Hybridisierung mit einer bekannten, markierten Oligonukleotidsonde oder einem markierten DNA Fragment nachgewiesen wird. Southern Analyse bedeutet im folgenden, so nicht anders spezifiziert, die Auftrennung des DNA Gemischs auf einem 1% Agarosegel, Denaturierung und Transfer auf Nitrozellulosefilter (Schleicher und Schuell, BA 85) mittels der Methode von E. Southern, J. Mol. Biol. 98 (1978), pp.503-517, und Hybridisierung wie beschrieben in R. Hauptmann et al., Nucleic Acids Res. 13 (1985), pp.4739-4749.

"Transformation" bedeutet das Einbringen von DNA in einen Organismus, so daß die DNA dort replizierbar ist, entweder extra-chromosomal oder als chromosomale Integrante. Transformation von E.coli folgt der im Ml3 Cloning and Sequencing Handbuch (Cloning and Sequencing Handbook, Fa Amersham, PI/129/83/12) angegebenen Methode.

"Sequenzieren" einer DNA bedeutet die Analyse der Nukleotidsequenz in einer DNA. Dazu wird die DNA mit verschiedenen Restriktionsenzymen geschnitten, und die Fragmente in entsprechend geschnittene Ml3 mp8, mp9, mpl8 oder mpl9 Doppelstrang DNA eingebracht, oder die DNA wird mittels Ultraschall, nachfolgender Reparatur der Enden und Größenselektion in Sma I geschnittene, dephosphorylierte Ml3 mp8 DNA (Shotgun Methode) eingebracht. Nach der Transformation von E.coli JM 101 wird Einzelstrang DNA aus rekombinanten Ml3 Phagen entsprechend dem Ml3 Cloning and Sequencing manual (Cloning and Sequencing Handbook, Fa Amersham, PI/129/83/12) isoliert und nach der Sanger'schen Dideoxymethode (F. Sanger et al., Proc. Natl. Acad. Sci. 74 (1977), pp.5463-5467) sequenziert. Die Auswertung der Sequenzen erfolgt mittels der ursprünglich von R. Staden entwickelten (R. Staden, Nucleic Acids Res. 10 (1982), pp.4731-4751) und von Ch. Pieler modifizierten (C. Pieler 1987, Dissertation, Universität Wien) Computerprogramme.

"Ligieren" bezieht sich auf den Prozeß der Bildung von Phosphodiesterbindungen zwischen zwei Enden von Doppelstrang-DNA Fragmenten. Üblicherweise werden zwischen 0,02 und 0,2 µg DNA-Fragmente in 10 µl mit etwa 5 units T4-DNA Ligase ("Ligase") in einer geeigneten Pufferlösung ligiert (T.Maniatis et al., Molecular cloning, 1982, p.474).

"Präparation" von DNA aus Transformanten bedeutet die Isolierung der Plasmid DNA aus Bakterien mittels der alkalischen SDS Methode modifiziert nach Birnboim und Doly (T.Maniatis et al., Molecular cloning, 1982, pp.368-369) unter Weglassen des Lysozyms. Dabei werden die Bakterien aus 1,5 bis 50 ml Kultur verwendet.

"Oligonukleotide" sind kurze Polydesoxynukleotide, die chemisch synthetisiert werden. Dazu wurde der Applied Biosystems Synthesizer Modell 381A verwendet. Die Oligonukleotide werden entsprechend dem Modell 381A User Manual (Applied Biosystems) aufgearbeitet und durch Polyacrylamidgelelektrophorese (PAGE) gereinigt.

"Phosphorylieren" bedeutet die enzymatische Uebertragung des gamma-Phosphatrestes aus ATP auf eine freie 5'OH-gruppe einer Nukleinsäure, meist ein Oligonukleotid. In 10 µl Lösung werden bis zu 100 pMol des Oligonukleotids mit 10 Einheiten T 4 -Poly-nukleotidkinase in Gegenwart von 100 pMol ATP in geeigneter Pufferlösung (70 mM Tris, pH=7,6, 10 mM MgCl₂, 5 mM DTT) 30 Minuten bei 37'C phosphoryliert. Die Reaktion wird meist durch 10 Minuten Erhitzen auf 100'C gestoppt.

Einige verwendete Abkürzungen sollen kurz erklärt werden:

bp: Basenpaare

BSA: Rinderserumalbumin

DTT: Dithiothreit

EDTA: Aethylendinitrilotetraessigsäure,

diNatriumsalz

SDS: Natriumdodecylsulfat

Tris: Tris(hydroxymethyl)-aminomethan

Denhardt: 0.02% Ficoll, 0.02% Polyvinylpyrrolidon,

0,02% BSA

LB: 10 g/l Trypton, 5 g/l Hefeextrakt, 5 g/l

NaCl

1x SSC: 150 mM NaCl, 15 mM tri-Natriumcitrat, pH=7

TE: 10 mM Tris pH=8,0, 1 mM EDTA

Verzeichnis der Abbildungen:

0.1:	Tryptische Fragmente aus Placenca-vac				
	HPLC der tryptischen Peptide aus Placenta-VAC				
0.3:	HPLC der tryptischen Peptide aus Nabelschnur-VAC				
0.4:	Gelpermeations-HPLC von Placenta- und				
	Nabelschnur-VAC				
	Reverse-Phase-HPLC von Placenta-VAC				
	SDS-Gelelektrophorese von Placenta-VAC				
	Screening-Oligonukleotide EBI-386, -387 und -388				
2:	Screening-Oligonukleotide EBI-118 und EBI-119				
3:	Northern Blot Analyse mit VAC-alfa und VAC-beta cDNA				
4:	VAC-alfa cDNA Sequenz				
5:	Anordnung der Peptidsequenzen in der VAC-alfa cDNA				
	abgeleiteten Aminosäuresequenz				
6:	Vierfach wiederholte Subsequenz im VAC-alfa Protein				
7:	Vac-beta cDNA Sequenz				
8:	Vierfach wiederholte Subsequenz im VAC-beta Protein				
9:	Aminosäurezusammensetzung von VAC-alfa und VAC-beta				
10:	Genomische Southern Blot Analyse mit VAC-alfa und				
	VAC-beta cDNA				
11:	Aminosäurevergleich von VAC-alfa mit VAC-beta				
12:					
13:	Hydrophilizitätsplot von VAC-alfa und VAC-beta				
14:	Vergleich von VAC-alfa, VAC-beta, Lipocortin I und				
	Lipocortin II				
15:	Sequenz des Promotor- und Terminator Teils in pRH284				
16:	Konstruktion von pRH291				
17:	Konstruktion von pRH212				
18:					
19:	: SDS-Gelelektrophorese der exprimierten Proteine				
	a) Coomassie Blau gefärbtes Proteingel				
	b) Western Blot				
•	Legende: M = Molekulargewichtsmarke				
	+Phosphat = Inhibition der VAC Expression				
	-Phosphat = VAC Expression (pho Promotor				
	i				

20: Reinigung von VAC-alfa; Coomassie Blau gefärbtes SDS-Gelektrophorese-Gel

Banden:

- 1: roher Extrakt
- 2: Ammoniumsulfatpellet (gelöst und dialysiert)
 12: 5 µg DEAE-FF-Sepharose Fraktionen
 1-11
- 3: VAC-Pool nach DEAE-FF-Sepharose Chromatographie
- 4: VAC-Pool nach Sephacryl-S 200 HR Chromatographie
- 5: gereinigtes VAC nach Q-Sepharose-FF-Chromatographie
- 6: gereinigtes, natürliches VAC aus Human-Placenta
- 7: Molekulargewichtsmarker (Pharmacia; 94kD, 67kD, 43kD, 30kD, 20kD und 14kD)
- 21: Sephacryl S-200 HR Chromatographie von vorgereinigtem $r\text{-VAC-}\alpha$
- .22: Q-Sepharose-FF-Chromatographie von vorgereinigtem $r\text{-VAC-}\alpha$
- 23: Gelpermeations-HPLC von natürlichem VAC
- 24: Gelpermeations-HPLC von rekombinantem VAC- α
- 25: Reverse Phase HPLC von natürlichem VAC
- 26: Reverse Phase HPLC von rekombinantem $VAC-\alpha$
- 27: HPLC der tryptischen Fragmente aus natürlichem VAC
- 28: HPLC der tryptischen Fragmente aus rekombinantem $VAC-\alpha$

- 29: SDS-Gel von einem Vergleich zwischen natürlichem und rekombinantem VAC- α in An- oder Abwesenheit von DTT
- 30: SDS-Gel von rekombinantem VAC- α in An- oder Abwesenheit von DTT
- 31: Western Blot Analyse von natürlichem VAC und rekombinantem VAC- α
- 32: Isoelektrische Fokussierung von natürlichem VAC und rekombinantem $VAC-\alpha$
- 33: Modifizierter Prothrombin Zeit Test mit natürlichem und rekombinantem VAC
- 34: Thrombin Zeit Test mit natürlichem und rekombinantem VAC
- 35: Faktor Xa Bildung im Plasma durch natürliches und rekombinantes VAC
- 36: Bindung von VAC an Phospholipid-Doppelschichten
- 37: Konstruktion von pGN25 und pGN26.
- 38: Reinigung von rekombinantem VAC B; Coomassie Blau gefärbtes SDS-Gelelektrophorese-Gel.
- 39: Reinigung von rekombinantem VAC B; in process Proben.
- 40: Gelpermeation HPLC von rekombinantem VAC 8.
- 41: Reverse Phase HPLC von rekombinantem VAC 8.

- 42: Reverse Phase HPLC von rekombinantem VAC B. nach Inkubation.
- 43: Aminosäureanalyse von rekombinantem VAC в.
- 44: N-terminale Sequenzierung von rekombinantem VAC β.
- 45: SDS-Gel von rekombinantem VAC ß in An- oder Abwesenheit von DTT.
- 46: Isoelektrische Fokussierung von rekombinantem VAC 8.
- 47: Effekt von VAC-α und VAC-β auf die Prothrombinase Aktivität. Prothrombin Aktivierung wurde in Anwesenheit variierender Mengen VAC-α (o) oder VAC-β () wie beschrieben gemessen.
- 48: Effekt von VAC- α auf die Phospholipase A_2 Aktivität.

 Phospholipase A_2 Aktivität wurde wie beschrieben bestimmt. VAC- α induzierte Inhibition wurde entweder bei 13,2 μ M Phospholipid o (offene Kreise) oder bei 6,6 μ M Phospholipid gemessen (ausgefüllte Kreise).
- Aktivität.

 Die Bestimmung der % Inhibtion erfolgte wie beschrieben. Inhibition wurde entweder bei 13,2

 µM Phospholipid o (offene Kreise) oder bei 6,6

 µM Phospholipid gemessen (ausgefüllte Kreise).

- 50: Auswirkung von Ca⁺⁺ auf die VAC-α induzierte Inhibition der Phospholipase Aktivität.

 Die Inhibition wurde bei 6.6 μM Phospholipid und 1 mM (offener Kreis), 0.5 mM (ausgefüllter Kreis), 0.1 mM (offenes Quadrat) oder 0.05 mM Ca⁺⁺ (ausgefülltes Quadrat) bestimmt.
- 51: Auswirkung von Ca⁺⁺ auf die VAC-β induzierte
 Inhibition der Phospholipase Aktivität. Die
 Inhibition wurde bei 6,6 μM Phospholipid und 1 mM
 (offener Kreis), 0,5 mM (ausgefüllter Kreis),
 0,1 mM (offenes Quadrat) oder 0,05 mM Ca⁺⁺
 (ausgefülltes Quadrat) bestimmt.

Beispiel O

Das aus Nabelschnurgefäßen und/oder Placenta isolierte und gereinigte Material wurde mit Hilfe einer Reverse-Phase HPLC nachgereinigt.

Stationare Phase: Bakerbond WP-RP 18, 4,6x250 mm, 5µm

Teilchen, 300 A Poren ...

Mobile Phase A: 0,1% Trifluoressigsäure in Wasser, pH

2,2

Mobile Phase B: 0,1% Trifluoressigsaure in Acetonitril

Gradient: 20-68% B in 24 min

Fluß: 1 ml/min

Detektion: UV, 214 nm

Anschließend an diese Reinigungsstufe wurden beide Materialien, jeweils die Substanz, die das Molekulargewicht 32.000 aufwies, mit Trypsin verdaut.

Reaktionsbedingungen:

30 μg VAC aus Placenta in 135 μl 0,15 M NH₄HCO₃, pH 8,0

- + 2% w/w Trypsin (Worthington)
 - 6 Stunden bei 37°C
- + 2% w/w Trypsin (Worthington), über Nacht bei 37°C

30 μg VAC aus Nabelschnur in 100 μl 1%

 NH_4HCO_3 , pH 8,0

+ 2% w/w Trypsin (Worthington)

6 Stunden bei 37°C

+ 2% w/w Trypsin (Worthington), über Nacht bei 37°C Die erhaltenen Bruchstücke wurden mit Hilfe von HPLC aufgetrennt und einer Sequenzierung mit einem Gasphasensequenator Typ 470A von Applied Biosystems, Programm O2 RPTH zugeführt.

HPLC-Trennbedingungen:

Stationare Phase: µBondapak Cl8, 3,8x300 mm,

10 µ Teilchen

Mobile Phase A: 0,1% Trifluoressigsäure in Wasser,

pH 2,2

Mobile Phase B: 0,1% Trifluoressigsäure in

Acetonitril

Gradient: 0-55% B in 55 min

Fluß: 1 ml/min

Detektion: UV, 214 nm (obere Spur)

280 nm (untere Spur)

Neben dem tryptischen Verdau wurde das über Reverse-Phase-HPLC gereinigte Material auch noch einer BrCN-Spaltung unterzogen. Auch diese Spaltpeptide wurden sequenziert und mit den Daten der Peptide aus dem tryptischen Verdau verglichen.

BrCN-Spaltung:

lll µg über RP-HPLC gereinigtes VAC wurden in 111 µl 70% Ameisensäure gelöst. Diese enthielt bereits den 250- fachen molaren Überschuß an BrCN (90 µg). Die Inkubation erfolgte im Dunkeln, 17 Stunden bei Raumtemperatur. 100 µl wurden für die HPLC-Auftrennung verwendet.

HPLC-Säule: µBondapak C 18

Mobile Phase A: 0,1% Trifluoressigsäure in Wasser

Mobile Phase B: 0,1% Trifluoressigsaure in

Acetonitril

Gradient: 0 - 70% B in 70 min

Fluß: 1 ml/min

Detektion: UV, 214 und 280 nm

Ein Vergleich der hiermit erzielten Ergebnisse sowie die Analyse mittels Gelpermeations-HPLC und SDS-Gelelektrophorese belegt die Identität von VAC aus Placenta und VAC aus Nabelschnur

Gelpermeations HPLC:

Stationäre Phase: Waters I-125, 7,8x600 mm, 10 µm

Teilchen

Mobile Phase: 0,5M Na₂SO₄, 0,02 M

Na₂PO₄, pH 7,0, 25%

Propylenglykol, 0,04% Tween 20

Fluß: 0,5 ml/min

Detektion: UV, 214 nm

SDS-Gelelektrophorese

SDS-Gel: 15%

Gelstärke: 0,7 mm

Elektrophoresebedingungen: 20 mA/Platte, 2-3 Stunden

Laufzeit

Färbung: Coomassie Blue

Proben: :8 µg VAC aus Nabelschnur bzw.

:7 µg VAC aus Placenta

Beispiel l

Herstellung einer humanen plazentalen cDNA-Bibliothek

a) Gesamt-RNA Isolierung aus Plazenta

GT: 5 M Guanidinium-Thiocyanat, 50 mM Tris

pH=7,4, 25 mM EDTA. Vor Gebrauch 8%(v/v)

beta-Mercaptoäthanol zusetzen. 20 ml GT

werden 5 bis 10 Minuten vor Gebrauch auf Eis
gekühlt, GT soll dabei nicht präzipitieren.

GH: 6 M Guanidium-Hydrochlorid, 25 mM EDTA, 10 mM beta-Mercaptoäthanol, pH= 7,0. Eiskühlen.

lg tiefgefrorene und mechanisch pulverisierte Plazenta werden in 20 ml GT (0°C) 20 Sekunden mit maximaler Geschwindigkeit mit einem Polytron (Brinkmann) gemixt. Das Volumen des Homogenats wird bestimmt, in 0,3 vol Äthanol (-20°C) gegossen, gemischt und sofort bei 12000 rpm 5'bei -10°C (Beckman JA 21 Zentrifuge, JS13.1 Rotor) zentrifugiert. Ein eventueller Proteinfilm sowie der Überstand werden entfernt. 10 ml eiskaltes GH werden dem Pellet zugesetzt und 10 Sekunden mit dem Polytron homogenisiert. Die Suspension wird 5 Minuten bei -10°C und 12000 rpm zentrifugiert. Der Überstand wird in ein steriles Corexröhrchen transferiert, das Pellet verworfen. Zum Überstand werden 0,025 vol 1 M Essigsäure und 0,75 vol kalter Äthanol (-20°C) zugesetzt und gut durchmischt. Nach ca.2 Stunden Inkubation bei -20°C wird 10 Minuten bei 6000 rpm bei -20°C (JA20 Rotor) zentrifugiert. Der Proteinfilm und der Überstand werden sorgfältig entfernt. 2 ml GH (0°C) werden zum Pellet zugegeben,

das Pellet resuspendiert, und die Suspension in ein 15ml Corexröhrchen transferiert. Mit weiteren 8ml GH wird das alte Corexröhrchen nachgespült, die Lösung mit den 2ml vereint. Es ist wichtig, daß das gesamte Pellet suspendiert ist, eventuell ist durch mildes Sonikieren nachzubehandeln. 0,025 vol 1 M Essigsäure und 0,5 vol kalter Äthanol (-70°C) werden zugesetzt und ca. 2 Stunden bei -20°C inkubiert. Zentrifugation (6000 rpm, 10 min, JA20 Rotor), Lösen und Präzipitieren werden zweimal wiederholt, wobei die totale GH-Menge auf 5 ml halbiert wird. Nach der letzten Zentrifugation soll kein Proteinfilm mehr über der Lösung sichtbar sein, sonst ist dieser Reinigungsschritt zu wiederholen. Das Pellet wird mit 5 ml Diäthylpyrocarbonat behandeltem Wasser (0°C) 2 Minuten gevortext. Die klare Lösung wird dekantiert, zu dem eventuell zurückbleibenden Pelletresten wird nochmals Wasser gegeben und gevortext, bis die Lösung klar ist. Durch Zusatz von 0,1 vol 3 M Na-Azetat (pH=5,8), 2,5 vol Äthanol und 1 Stunde Inkubation bei -70°C wird die RNA 10 Minuten bei 6000 rpm bei 4°C abzentrifugiert. Lösen und präzipitieren wird einmal wiederholt. Letztendlich wird die RNA in Aethanol bei -20°C aufbewahrt.

b)poly-A+-RNA Isolierung

0,5 mg oligo dT-Zellulose (Collaborative Research, Typ 3, Bindungskapazität: 5 mg poly-A⁺-RNA/g) werden im Bindungspuffer suspendiert (200 mM NaCl, 0,2 % SDS, 10 mM Tris, pH=7,4, 1 mM EDTA). 1 ml dieser Suspension wird in eine Säule pepackt und nacheinander mit 10 ml Wasser, 10 ml 0,1 N NaOH, 10 ml Wasser und letztlich mit 10 ml Bindungspuffer gewaschen. Die Gesamt-RNA wird aus der alkalischen Lösung durch Zentrifugieren (10 Min., 6000 rpm, JA20 Rotor pelletiert. Ca. 10 mg RNA werden in 4,5 ml Wasser gelöst. Nach Zusatz von

50 µl 2% SDS wird die Lösung 3 Min. auf 70°C erhitzt und unmittelbar auf Eis gekühlt. Nach dem Zusatz von 50 μ l 1M Tris (pH=7,4), 10 μ l 0,5 M EDTA und 200 ul 5 M NaCl wird die Lösung sofort auf die Säule aufgetragen. Die aus der Säule tropfende Lösung wird wieder auf die Säule aufgetragen. Diese Prozedur wird insgesamt dreimal wiederholt. Anschließend wird die Säule mit 30 ml Bindungspuffer gewaschen. Die gebundene RNA wird mit 5 ml 0,2% SDS eluiert. Die Säule wird mit 10 ml Wasser, 10 ml 0,1 N NaOH und 10 ml H₂O gewaschen und mit 10 ml Bindungspuffer äquilibriert. Die RNA Lösung wird nochmals 3 Minuten auf 70°C erhitzt, rasch auf Eis abgekühlt, 50 μl 1 M Tris pH=7,4, $10 \cdot \mu l$ 0,5 M EDTA und 200 μl 5 M NaCl zugesetzt und auf die Säule aufgetragen. Die durchlaufende Lösung wird insgesamt dreimal auf die oligo-dT Säule aufgetragen. Nach dem Waschen wird die RNA mit 30 ml 0,2% SDS eluiert.

Durch Zugabe von 0.1 vol 3M Na-Azetat pH=5.6 und 2.5 vol Aethanol sowie Inkubation bei -20°C (16 Stunden) wird die RNA ausgefällt. Die RNA wird abzentrifugiert (10 000 rpm, 15 Min., JA-20 Rotor) und in Wasser mit einer Konzentration von 1 µg/µl gelöst.

c) Konstruktion der Lambda-gtl0 cDNA Bibliothek

Die Synthese der cDNA, das Methylieren der internen EcoRI-Stellen, das Anbringen von EcoRI Linkern, das Nachschneiden mit EcoRI, die Abtrennung der kurzen DNA-Fragmente, das Ligieren mit den Lambda-gtlO Armen und das in vitro Verpacken der ligierten DNA erfolgte mit dem cDNA Synthese System von Amersham (RPN 1256) sowie dem cDNA Kloniersystem Lambda-gtlO (Amersham, RPN 1257). Die beigefügten Arbeitsvorschriften wurden genau eingehalten. Ausgehend von etwa 3 µg wurden mRNA letztendlich ca. 0,5xlO rekombinante Lambda-gtlO Phagen erhalten.

Beispiel 2

cDNA Isolierung

a) <u>Durchsuchen der Lambda-gtl0 Bibliothek mit</u> <u>Oligonukleotiden</u>

Zum Durchsuchen der cDNA-Bibliothek nach für VAC-protein kodierender cDNA wurden entsprechend der Sequenzen des tryptischen Peptides P16/II zwei und des Staph A Peptides P20/I/6 ein Oligonukleotid synthetisiert (Fig.1). Diese Oligonukleotide stellen jeweils eine Mischung aller Varianten dar, die jede Kodierungsmöglichkeit der entsprechenden mRNA berücksichtigen. EBI-386 weist bei einer Kettenlänge von 20 Nukleotiden 512 Variationen auf und paßt zu dem Staph-A Peptid P20/I/6. Um die Variation bei dem Oligonukleotid für das tryptische Peptid P16/II niedriger zu halten, wurden zwei Oligonukleotide (20-mere) synthetisiert: EBI-387: 128 Variationen, EBI-388: 64 Variationen.

Weiters wurden zu dem tryptischen VAC-Peptid P30/I passend zwei Oligonukleotide unter Verwendung von Desoxyinosin als Base bei "Wobble" Positionen synthetisiert (Fig.2): EBI-118 und EBI-119. Diese Substitution wurde von E. Ohtsuka et al., J. Biol. Chem. 260/5 (1985), pp.2605-2608, sowie Y. Takahashi et al., Proc. Nat. Acad. Sci. (1985) pp.1931-1935, beschrieben. Inosin basenpaart gut mit Cytosin, stört jedoch kaum die Ausbildung der Doppelhelix, wenn andere Nukleotide als Partner angeboten werden.

Jeweils 60 pMol jedes Oligonukleotids wurden mit 60 pMol gamma- 32 P-ATP (Amersham, PB 218, 5000 Ci/mMol) in 30 μ l Lösung unter Verwendung von 20 Einheiten T_4 Polynukleotidkinase phosphoryliert. Die Lösung

enthielt 70 mM Tris pH 7,5, 10 mM MgCl₂ und 5 mM DTT, die Inkubationsdauer betrug 30 Minuten. Durch Zugabe von 30 mM EDTA und 5 Minuten Erhitzen auf 70°C wurde die Reaktion gestoppt. Das markierte Oligonukleotid wurde durch Säulenchromatographie über Biogel P6DG (Biorad) von nicht eingebauter Radioaktivität getrennt. Pro Oligonukleotid wurden zwischen 70 und 110x10 cpm Phosphor-32 eingebaut.

Je 15 pMol EBI-118 und EBI-119 wurden in 90 μ l unter Einsatz von 45 pMol gamma- 32 P-ATP (Amersham, PB 218, >5000 Ci/mMol) mit 10 Einheiten $_4$ -Polynukleotidkinase phosphoryliert und anschließend über Biogel P6DG gereinigt. Insgesamt wurden 70x10 cpm Phosphor-32 eingebaut.

Ungefähr 1,2x10 pfu (Plaque forming units)
rekombinante Phagen einer humanen, plazentalen cDNA
Bibliothek im Phagen Lambda-gtl0 wurden verwendet, um
E.coli C600 zu infizieren. Etwa 50.000 Phagen wurden pro
13.5 cm Petrischale plattiert (LB, 10 mM MgSO₄, 15 g/l
Bacto-Agar). Nachdem die Plaques fast konfluent waren,
wurden von jeder Platte 2·Abzüge auf
Nitrozellulosefilter hergestellt (Schleicher und
Schuell, BA 85) (T. Maniatis et al., Molecular Cloning,
1982, pp 320-321).

Die Filter wurden 3x20 Minuten in TE bei 100°C behandelt und anschließend über Nacht bei 65°C gewaschen:

Waschlösung: 50 mM Tris pH=8

1 M NaCl

1 mM EDTA

0,1 % SDS

Danach wurden die Filter 4 Stunden bei 49°C prähybridisiert:

Prähybridisierlösung:

6 x SSC

5 x Denhardt
0,1 % SDS
1 mM Na-Pyrophosphat
50 mM NaH₂PO₄ pH=6,5
100 μM ATP
80 μg/ml denaturierte Hering Sperm DNA

Die Hybridisierung erfolgte in der gleichen Lösung unter

Einsatz der gesamten Menge markierter Oligonukleotide.

Die doppelten Abzüge der Platten 1 bis 6 wurden mit

EBI-386, jene der Platten 7-12 mit EBI-387 und EBI-388

16 Stunden bei 49°C hybridisiert. Die Abzüge der Platten

13-24 wurden 16 Stunden mit EBI-118 und EBI-119 bei 37°C

hybridisiert. Nach erfolgter Hybridisierung wurden die

Filter zweimal mit 6x SSC/0,01% SDS gespült, 2 x 30

Minuten bei Raumtemperatur mit 6x SSC / 0,01% SDS und 3

x 20 Minuten in der gleichen Lösung bei 49°C bzw. 37°C

gewaschen. Nach dem Lufttrocknen wurden die Filter an

Kodak X-Omat S Film bei -70°C unter Verwendung einer

Verstärkerfolie exponiert.

Lambda-Phagen, die auf beiden Filtern Hybridisierung mit dem Oligonukleotid zeigten, wurden unter Verwendung desselben Hybridisierungsprotokolls zur Homogenität gereinigt.

Aus der Hybridisierung mit EBI-386, -387 und -388 resultierten die Phagen Lambda-Pll/3, Lambda-P6/5, Lambda-P6/6. Die Hybridisierung mit EBI-118 und -119 resultierte in den Phagen Lambda-Nr15, Lambda-Nr19 und Lambda-Nr22.

b) Isolierung der cDNA Inserts

E.coli C 600 wurde mit 2,5 x 10 pfu (Plague forming units) Phagen infiziert und mit 6 ml Topagarose (0,7 % Agarose, 10 mM MgSO₄, LB) auf 13,5 cm Agarplatten (LB, 10 mM MgSO, 1,5% Agarose, 0,2% Glukose) plattiert. Nach 5 1/2 Stunden Inkubation bei 37°C waren die Plagues konfluent. Die Platten wurden 30 Minuten bei 4°C gekühlt und die Agarose mit 10 ml Lambda-Diluent (10 mM Tris, pH=8, 10 mM MgSO₄, 0,1 mM EDTA) überschichtet. Die Phagen wurden über Nacht bei 4°C unter leichten Schütteln eluiert. Die überstehende Phagensuspension (ca. 8 ml) wurde in Corexröhrchen transferiert und 10 Minuten bei 15.000 rpm (4°C, JA 21 Zentrifuge) zentrifugiert. Der Überstand wurde in Polycarbonatröhrchen dekantiert und bei 50.000 rpm (20°C, L70 Beckman-Zentrifuge, 20°C, 50 Ti Rotor) bis omega $t = 3x10^{10}$ (ca 23 Minuten) zentrifugiert. Die pelletierten Phagen wurden nach Entfernen des Überstandes in 0,5 ml Lambda-Diluent resuspendiert und in Eppendorf Röhrchen transferiert. Die Suspension wurde durch kurzes Zentrifugieren von nichtsuspendierten Teilchen befreit, der Überstand in ein neues Röhrchen gefüllt. Nach Zusatz von 10 μg/ml RNaseA und l μg/ml DNase I wurde 30 Minuten bei 37°C inkubiert. Nach Zugabe von 25 mM EDTA, 25 mM Tris, pH=8, 0,2% SDS wurde 30 Minuten bei 70°C inkubiert. Als nächstes wurde 1 vol Phenol/Chloroform (1:1) zugegeben, und Proteine durch Kippen des Röhrchens extrahiert. Nach 2 Minuten Zentrifugation in der Eppendorfzentrifuge wurde die wäßrige Phase mit l vol Chloroform extrahiert (nur Kippen, nicht Vortexen). Nach der Phasentrennung durch Zentrifugation wurden dem Ueberstand 1/20 vol 3 M Na-Azetat und 1 ml Athanol zugesetzt. Dabei fiel die Phagen DNA fadenförmig aus. Nach 5 Minuten Inkubation bei 0°C wurde die DNA abzentrifugiert (10 Minuten). Das Pellet wurde einmal mit 70 % Äthanol gewaschen, getrocknet und über Nacht in 50 µl TE gelöst (4°C).

Die DNAs wurden mit EcoRI geschnitten und die entstehenden Fragmente auf einem 1% Agarosegel getrennt. Die cDNA Inserts der Klone Lambda-P11/3, Lambda-P6/5 und Lambda-P6/6 hatten Größen von etwa 1300 bis 1400 bp. Die Sequenzanalyse zeigte, daß alle drei Klone von ein und derselben mRNA abgeleitet waren. Das 5'Ende der mRNA fehlte jedoch in den cDNAs. Die Inserts der Phagen Lambda-Nr15, Lambda-Nr19 und Lambda-Nr22 hatten Längen von ca. 1600, 1100 und 1000 bp. Die Sequenzanalyse ließ eine annähernd vollständige cDNA vermuten. Die cDNAs der beiden Phagengruppen Lambda-P11/3, Lambda-P6/5 und Lambda-P6/6 sowie Lambda-Nr15, Lambda-Nr19 und Lambda-Nr22 sind von zwei verschiedenen mRNAs abgeleitet, wie die nachfolgende Sequenzanalyse ergab.

Die EcoRI Inserts der drei Klone Lambda-Pl1/3,
Lambda-P6/5 und Lambda-P6/6 wurden isoliert und in den
EcoRI-geschnittenen Bluescribe M13⁺ Vektor ligiert
(Vector Cloning Systems, 3770 Tansy Street, San Diego,
CA 92121, USA). Die resultierenden Klone wurden pP6/5,
pP6/6 und pP11/3 genannt.

Die EcoRI Inserts der drei Klone Lambda-Nr15, Lambda-Nr19 und Lambda-Nr22 wurden isoliert und in den EcoRI-geschnittenen Bluescribe Ml3 Vektor ligiert. Die resultierenden Klone wurden pRH201, pRH202 und pRH203 genannt.

c) Weitere VAC cDNA Klone

Um weitere cDNA Klone zu erhalten, wurde die humane, plazentale Lambda-gtlO Bibliothek nochmals durchsucht, diesmal mit dem EcoRI-Insert des pPll/3 als Sonde.

Dieses DNA-Fragment wurde durch Nicktranslation radioaktiv markiert (T.Maniatis, Molecular Cloning, 1982, pp.109-112, keine DNase I verwendet). Insgesamt wurden 4x10⁵ Phagen auf 8 Platten durchsucht. Die Behandlung der Nitrozellulosefilter erfolgte wie in T.Maniatis, Molecular Cloning, 1982, pp.320-321 beschrieben. Die Hybridisierungslösung enthielt 6xSSC, 5x Denhardt's, 0,1% SDS sowie 20x10⁶ cpm pPl1/3 Insert. Die Hybridisierungsdauer betrug 16 h bei 65°C. Die Filter wurden danach 3x10 Minuten bei Raumtemperatur mit 6xSSC/0,01% SDS und 3x45 Minuten bei 65°C und mit 0,2xSSC gewaschen. Insgesamt wurden 69 positiv reagierende Klone erhalten (Lambda-VAC1 bis Lambda-VAC69).

12 dieser Klone wurden im kleinen Maßstab wie oben beschrieben präpariert, die cDNA Inserts mit Eco RI freigesetzt und auf einem 1% Agarosegel aufgetrennt. Dabei zeigte sich, daß das Insert des Klons Lambda-VAC10 den gesamten für VAC Protein kodierenden Leserahmen enthält.

Beispiel 3

Charakterisierung der cDNAs kodierend für VAC-alfa und VAC-beta

a) Northern Blot Experiment

Zu 2 µg poly-A⁺ RNA wurden 5 µl Wasser, 16 µl Formamid, 6 µl Formaldehyd und 3 µl 0,1 M NaOH zugesetzt, die Lösung 10 Minuten bei 68°C inkubiert und anschließend auf Eis gekühlt. Nach Zusatz von 5 µl Farbstofflösung (je 0,4% Bromphenolblau und Xylencyanol in 50% Glyzerin, 1 mM EDTA) wurde die RNA auf einem

11 0 00,0,0,0

Formamid-Agarosegel aufgetrennt (1,5% Agarose, 10 mM Na-Phosphat pH=7,6, 1 mM EDTA, 5 mM Na-Azetat, 6% Formaldehyd, Elektrophorese 100 V, 3 Stunden, Laufpuffer wie Gelpuffer, ohne Formaldehyd). Als Referenz wurde Gesamt-RNA aufgetragen. Diese Spur wurde nach der Elektrophorese abgetrennt und mit EtBr angefärbt, um die Lage der 28 und 18 S rRNA zu bestimmen. Der Rest des Gels wurde zweimal 10 Minuten in loxSSC gewaschen, und die RNA mit 20xSSC auf Nitro-zellulosefilter übertragen. Das Filter wurde mit 2xSSC gewaschen, getrocknet und 2 Stunden im Vakuum bei 80°C gebacken. Jeweils 1 µg pPll/3 und pRH203 wurden mit dem Multiprime DNA labelling System (Amersham, RPN 1601) radioaktiv markiert. Das Nitro-zellulosefilter wurde 2 h bei 65°C in 6xSSC/5x Denhardt's/0,1% SDS prähybridisiert. Jeweils eine Spur wurde mit 180x10 cpm pPl1/3 bzw. pRH203 hybridisiert (16h 65°C). Die Filter wurden zweimal 30 Minuten bei Raumtemperatur mit 6xSSC/0,01% SDS und zweimal 30 Minuten bei 65°C mit 0,2xSSC/0,01% SDS gewaschen, getrocknet und an Kodak X-Omat S Film mit Verstärkerfolie exponiert.

Das Ergebnis ist in Fig.3 abgebildet. Die cDNA des Klons pPll/3 hybridisiert an eine mRNA der Größe von etwa 1700 Basen ("VAC-alpha"), die cDNA des Klons pRH 203 an eine mRNA der Größe von etwa 2200 Basen ("VAC-beta").

Da erstens die eingesetzte Radioaktivitätsmenge sowie die aufgetragene Menge mRNA pro Spur etwa gleich war und zweitens die Hybridisierung eines Genom-Blots in derselben Lösung Banden gleicher Intensität mit beiden cDNAs ergab (siehe unten), ist zu schließen, daß die kürzere mRNA ("VAC-alfa") in größeren Mengen als die längere ("VAC-beta") mRNA in Plazenta vertreten ist.

b) Sequenzanalyse der VAC-alfa cDNA

Die cDNA Klone pP6/5, pP6/6 und pP11/3 wurden total, sowie die der Klone Lambda-VACl bis -12 partiell sequenziert. Das Resultat ist in Fig.4 abgebildet. Es wurden insgesamt 1465 Basen sequenziert. Die cDNA weist einen langen, offenen Leserahmen auf, der für 320 Aminosäuren kodieren kann. Wird die DNA Sequenz in eine Aminosäuresequenz übersetzt, so können alle sequenzierten Peptide in dieser Sequenz untergebracht werden (Fig.5). Es handelt sich daher bei dieser cDNA um jene, deren korrespondierende mRNA für VAC-protein kodiert. Da die Sequenzen der zweiten isolierten cDNA (siehe unten) für ein ähnliches, aber von VAC verschiedenes Protein kodiert, wird hier der Name VAC-alfa eingeführt.

Dem ersten ATG-Codon (Basen 35-37) geht im selben Leserahmen ein Stop-Codon voran. Die Basen 30 bis 38 erfüllen ziemlich gut die Kozakregel (M. Kozak, Nature 308 (1984), pp. 241-246), die die Konsensussequenz in der Nähe des Translationsstartcodons mit CC(A/G)CCAUGG angibt, die entsprechende Sequenz hier lautet TCGCTATGG. Die 3' nichttranslatierte Region ist 471 Basen lang. 15 Basen vor Beginn des poly-A Abschnitts befindet sich die Polyadenylierungssequenz AATAAA (N.J.Proudfoot et al., Nature 263 (1976), pp. 211-214). Wird eine Kettenlänge von 150 bis 200 Basen für den Poly-A Abschnitt der mRNA gerechnet, beträgt die Gesamtlänge der mRNA auf Grund der cDNA Sequenz 1600-1650 Basen. Da im Northern Blot Experiment ein höherer Wert bestimmt wurde, ist die 5'nichttranslatierte Region in keiner cDNA komplett enthalten.

Die cDNA des Klons pP6/5 weist im Gegensatz zu allen anderen cDNA Klonen an Position 100 C statt A auf.

Dadurch würde sich das Triplett 98-100 (22. Codon) von GAA nach GAC ändern und für Asp anstelle von Glu kodieren. Diese Abweichung kann mehrere Ursachen haben:

a) die Reverse Transkriptase baute ein falsches

Nukleotid ein, b) es handelt sich um die Transkripte zweier alleler, an dieser Stelle verschiedener Gene oder c) es gibt zwei nicht allele Gene, die sich an dieser Position unterscheiden.

Der lange, offene Leserahmen kodiert für ein Protein mit 320 Aminosäuren, von dem das Met-l wahrscheinlich abgespalten, und das folgende Alanin an der Aminogruppe, möglicherweise durch Acylierung, blockiert wird. Das errechnete Molekulargewicht beträgt 35.896 D und ist höher als der Wert nach SDS-PAGE. Allerdings ist der Anteil geladener Aminosäuren (Asp. Glu, Lys, Arg, His) mit 30,6 % (98/320) überdurchschnittlich hoch verglichen mit dem durchschnittlichen Wert von 25,1 %. Dies würde das veränderte Wanderungsverhalten des Proteins bei der SDS-PAGE erklären. Innerhalb der stark geladenen Aminosäuren überwiegen die sauren Aminosäuren (Asp und Glu) mit 54 gegenüber den basischen (Lys und Arg) mit 41. Dies erklärt den sauren, isolektrischen Punkt des VAC-alfa Proteins (pI=4,4 bis 4,8) VAC-alfa enthält nur ein für Cystein codierendes Triplett (Aminosäure-Position 316); eine typische N-Glykosilierungsstelle (Asn-XXX-Ser/Thr) ist nicht vorhanden. Eine Strukturanalyse der Aminosäuresequenz (modifiziert nach Pustell, J et al., Nucleic Acids Res. 10 (1982) pp 4765-4782) ergibt eine vierfache Wiederholung einer 67 Aminosäure langen Sequenz (Fig.6), im folgenden "Repeats" genannt. Innerhalb dieser Sequenz sind 7 Aminosäuren (10,4 %) in allen vier Repeats konserviert, 15 Aminosäuren (22,4 %)

kommen in drei von vier Repeats vor, an 28 Positionen (41,8%) enthalten jeweils zwei Repeats dieselbe Aminosäure.

Ein Vergleich mit publizierten Literaturdaten (M.J.Geisow, FEBS Letters 203 (1986), pp. 99-103, M.J.Geisow et al., TIBS 11 (1986), pp. 420-423) ergab überraschenderweise, daß VAC-alfa damit zu einer größeren Gruppe Ca ++ abhängiger Phospholipidbindungsproteine gehört. Es wird eine Konsenussequenz beschrieben (Lys-Gly-fob-Gly-Thr-Asp-Glu-var-var-Leu-Ile-fil-Ile-Leu-Ala-fob-Arg; fob=hydrophob, fil=hydro-phil, var=variabel), die an der Ca++ Bindung beteiligt sein könnte (M.J.Geisow et al., Nature 320 (1986), pp. 636-638). Diese Sequenz findet sich in jeder der vier wiederholten 67 Aminosäure langen Subsequenzen der erfindungsgemäßen Proteine (Fig.6). Auffällig ist auch der 6 Aminosäuren lange Abschnitt am Ende jeder Repeat, der fast außchließlich aus hydrophoben Aminosäuren besteht ("oooooo" in Fig.6).

c) Sequenzanalyse der VAC-beta cDNA

Die VAC-beta cDNA Sequenz der Klone Nr15, Nr19 und Nr22 ergab 1940 bp und geht in einen poly-A Abschnitt über (Fig.7). 16 Basen vor dem poly-A Abschnitt findet sich das Polyadenylierungssignal AATAAA. Allerdings kommt diese Konsenussequenz bereits an der Nukleotidposition 1704-1709 vor. Weshalb diese Sequenz nicht als Polyadenylierungssignal verwendet wird, ist unbekannt. Die zusätzlich erforderliche Sequenz an der 3'Seite der AATAAA Sequenz, YGTGTTYY (Gill A. et al., Nature 312 (1984), pp. 473-474) kommt erst relativ weit entfernt vor (TGTGTTAT, Position 1735-1742); möglich, daß dies die Erklärung für ein Nichtakzeptieren dieser ersten Polyadenylierungssequenz darstellt.

Die cDNA enthält einen langen, offenen Leserahmen, der vom Beginn der cDNA bis Position 1087 reicht. Er würde ein Kodierungspotential für 362 Aminosäuren beinhalten. Aus Analogiegründen zu VAC-alfa und aufgrund der Tatsache, daß auch ein 34.000 D Protein bei der Reinigung von VAC anfällt (siehe E.P.A. 181.465) wurde das erste Methioninkodon (ATG, Position 107-109) als Translationsstart angenommen. Die Kozakregel ist hier nicht so gut erfüllt wie bei VAC-alfa (AAGAGATGG auf Position 102-110).

Das resultierende Protein (VAC-beta) wäre 327
Aminosäuren lang. Es besitzt 4 Cysteinreste
(Aminosäureposition 161, 206, 250 und 293) und eine
potentielle N-Glykosylierungsstelle (Asn-Lys-Ser,
Aminosäureposition 225-227). Das errechnete
Molekulargewicht beträgt 36.837 (Fig.9). Auch in
VAC-beta gibt es überdurchschnittlich viele geladene
Reste: 97/327 (29,6%), wobei die sauren Aminosäuren
(Asp+Glu: 49) über die basischen (Lys+Arg 42)
überwiegen; eine Erklärung für das nach SDS-PAGE
ermittelte niedrigere Molekulargewicht.

Auch VAC-beta zeigt eine interne Wiederholung einer 67
Aminosäuren langen Sequenz Fig.8). Innerhalb dieser
Sequenz sind 7 Aminosäuren (10,4%) in allen vier
Repeats konserviert, 17 Aminosäuren (25,4%) kommen in
drei von vier Repeats vor, an 25 Positionen (37,7%)
enthalten jeweils zwei Repeats dieselbe Aminosäure.
Auch VAC-beta zeigt gute Übereinstimmung mit der 17
Aminosäuren langen Konsenussequenz. Die Ausführungen
zum VAC-alfa gelten analog für VAC-beta.

\$

d) Genomische Southernblot Analyse

Die Analyse chromosomaler DNA aus humaner Plazenta nach Southern zeigt ein komplexes Bild. Die DNA wurde mit EcoRI, HindIII, BamHI und PstI geschnitten. auf Nitrozellulose transferierte DNA wurde sowohl mit einer VAC-alfa DNA (pP11/3) als auch mit einer VAC-beta DNA (pRH203) hybridisiert. Das Waschen der Filter geschah unter stringenten Bedingungen (siehe Punkt a)), d.h. mit 0,2xSSC und 65°C. Trotzdem ergaben sich bei jedem Verdau relativ viele Banden (Fig.10). Der Vergleich der beiden Blots zeigt, daß die Kreuzreaktion von VAC-alfa und -beta DNA unter diesen Bedingungen eher auszuschließen ist. Die Vielzahl der Banden ist entweder durch die Existenz jeweils ähnlicher Gene zu dem VAC-alfa bzw. VAC-beta Gen zu erklären, oder aber es handelt sich um jeweils ein Gen, das durch viele und/oder lange Introns unterbrochen ist.

Beispiel 4

Protein-Analyse

In Fig.11 ist der Vergleich der Aminosäuresequenzen von VAC-alfa mit VAC-beta wiedergegeben. Die wiederholten Strukturen lassen sich in beiden Proteinen gleich anordnen. Die Verbindungspeptide sind ebenfalls gleich lang mit Ausnahme jener zwischen der 2. und 3. Repeat. In dieses Verbindungspeptid muß bei VAC-alfa eine Lücke eingeführt werden, um eine optimale Anpassung der beiden Sequenzen zu erlauben. Das N-terminale Peptid der beiden Proteine ist unterschiedlich lang, 19 Aminosäuren bei VAC-alfa, 25 Aminosäuren bei VAC-beta. Dieses Peptid weist auch die geringste Homologie auf. Die beiden Proteine sind an 176 von 320 Aminosäurepositionen ident, was einem Homologiegrad von 55,0% entspricht.

An dieser Stelle sei auch der Vergleich der Nukleotidsequenzen der VAC-alfa und -beta cDNAs eingefügt. Werden zwei Gene und deren Produkte miteinander verglichen, sieht man auf der DNA (=RNA) Ebene eine größere Homologie als auf der Aminosäureebene, was durch die Tatsache erklärt ist, daß bei der Nukleinsäure bereits eine Veränderung in einem Basentriplett ausreicht, um eine neue Aminosäure zu kodieren.

In Fig.12 ist der Vergleich der kodierenden Regionen von VAC-alfa und VAC-beta cDNA wiedergegeben. Uberraschenderweise zeigen die DNAs nur einen Homologiegrad von 54,2%, also etwas weniger als die beiden Proteine.

In Fig.13 sind die Hydrophilizitätsprofile der beiden Proteine abgebildet. Dabei wurde der Algorithmus von Hopp und Wood verwendet (T.P.Hopp et al., Proc.Natl.Acad.Sci. 78 (1981) pp.3824-3828). Die vier Repeatbereiche sind durch die Balken angedeutet, die Verbindungspeptide in der darunter angegebenen Sequenz eingerahmt. Dabei fällt auf, daß das Verbindungspeptid zwischen der zweiten und dritten Repeat besonders hydrophil ist. In diesem Peptid befindet sich sowohl bei VAC-alfa als auch bei VAC-beta ein Arginin an identer Position. Es wäre daher möglich, daß dieses Arginin einen bevorzugten Angriffspunkt für eine Protease mit trypsinartiger Spezifität darstellt. Dabei müßte das Molekül in zwei etwa gleich große Hälften zerfallen. Es wäre denkbar, daß bereits ein solches "Halbmolekül" eine biologische, beispielsweise eine antikoagulierende Wirkung entfalten kann. Auf der anderen Seite könnte vielleicht der Austausch dieses Arginins durch z.B. Histidin den VAC-proteinen eine größere Stabilität vermitteln.

Aus Fig. 13 ist weiterhin leicht zu erkennen, daß weder VAC-alfa noch VAC-beta einen längeren, hydrophoben Bereich aufweisen, der entweder die Sekretion durch, oder das Einlagern der Proteine in eine Membran erlauben würden. Es ist daher anzunehmen, daß es sich bei VAC-alfa und VAC-beta um intrazelluläre Proteine handelt.

Wallner et al (Nature 320 (1986), pp.77-81) berichten die Struktur des humanen Lipocortin I, Saris et al. (Cell 46 (1986), pp.201-212) und Huang et al. (Cell 46 (1986), pp. 191-199) die Struktur des murinen bzw. humanen Calpactin I, das auch Lipocortin II genannt wird. Diese Proteine gehören ebenfalls zu der Klasse der Ca + abhängigen Phospholipidbindungsproteinen. Ihre Struktur läßt sich analog zu VAC-alfa und -beta anschreiben (Fig.14). Die Homologien zwischen VAC-alfa und VAC-beta sind jedoch ausgeprägter als jene zwischen VAC und Lipocortin:

VAC-alfa - VAC-beta : 55,0%

VAC-alfa - Lipocortin I : 41,9%

VAC-alfa - Lipocortin II : 43,8%

VAC-beta - Lipocortin I : 41,7%

VAC-beta - Lipocortin II : 44,6%

Anzunehmen ist daher, daß auch die Lipocortine aufgrund ihrer analogen Struktur antikoagulierende Wirkung haben, und demzufolge als Antikoagulanzien einzusetzen sind und weiterhin, daß dies eine generelle Eigenschaft dieser Klasse von Catabhängiger Phospholipidbindungsproteine ist.

Viele Mitglieder der Ca⁺⁺ abhängigen Phospholipidbindungsproteine binden an gereinigte sekretorische Vesikel oder andere Bestandteile des Cytoskeletts (siehe R.H.Kretsinger et al., Nature 320 (1986), p.573 für eine Zusammenfassung). Bei der Sekretion kapseln sich die Vesikel vom Golgi-Apparat der Zelle ab, wandern zur Zellmembran und fusionieren mit ihr. Dabei wird der Inhalt der Vesikel von der Zelle freigesetzt. In Analogie zur Kupplung von Erregung mit der Muskelkontraktion wurde vorgeschlagen (W.W.Douglas, Br.J.Pharmac. 34 (1968), 451), daß auch der Stimulus und die Sekretion über Ca⁺⁺ gekoppelt ist. Dabei könnten die Ca⁺⁺ abhängigen Phospholipidbindungsproteine eine wichtige Rolle spielen. In der konservierten, 17 Aminosäuren langen Region jeder Repeat besitzt VAC-alfa 5 bis 6 Hydroxylgruppen-enthaltende Aminosäuren (Asp, Glu, Thr, Ser), jeweils drei davon an identischer Position. Bei VAC-beta finden sich in jeder Repeat vier dieser Aminosäuren. Obwohl keines der Proteine die in Calmodulin, Troponin C, S-100 und Parvalbumin beobachtete EF-Hand Struktur aufweist (R.H.Kretsinger et al., CRC Crit. Rev.Biochem. 8 (1980), pll9), die in diesen Molekülen für die Ca⁺⁺ Bindung verantwortlich ist, verleitet die Konservierung dieses Unterabschnitts in jeder Repeat zu dem Schluß, daß diese Region für die Ca⁺⁺ Bindung verantwortlich ist.

Durch gezielte Mutationen in diesem Bereich könnte versucht werden, die biologische Aktivität von VAC-Proteinen zu verändern.

Beispiel 5

Ş

Expression von VAC-alfa in E.coli

a) <u>pRH284T: Expressionsvektor mit dem alkalischen</u>
<u>Phosphatasepromotor und Terminator</u>

Das Gen für die alkalische Phosphatase (PhoA) aus E.coli unterliegt einer strengen Regulation. In Gegenwart von Phosphat wird das Gen komplett abgeschaltet, bei Abwesenheit von Phosphat im Medium erfolgt Genexpression. H.Shuttleworth et al., Nucleic Acids Res. 14 (1986), p.8689 sowie C.N.Chang et al., Gene 44 (1986), pp.121-125 beschreiben die Nukleotidsequenz dieses Gens.

Aus mehreren Oligonukleotiden wurde die Promotorregion des PhoA Gens zusammengesetzt und in EcoRI-ClaI geschnittenes pAT153 eingesetzt. Vor der ribosomalen Bindungsstelle wurde eine XhoI Stelle eingeführt. Die originale EcoRI Stelle wird beim Einligieren des synthetischen DNA-Fragmentes zerstört. Nach der ribosomalen Bindungsstelle wurde ein Translationsstart-ATG vorgesehen, dessen G das erste Nukleotid einer SacI (=SstI) Stelle ist. Der Expressionsvektor läßt sich durch Schnitt mit SacI an dieser Stelle linearisieren und der 3'Überhang durch Behandlung mit DNA-Polymerase I - Klenow Fragment in Gegenwart von dGTP in ein gerades Ende überführen. Dadurch kann jedes beliebige Gen an dieser Stelle eingefügt werden, für korrekte Expression muß es mit der ersten Base der kodierenden Region beginnen.

Das HindIII-SalI Fragment des pAT-Anteils wurde entfernt und durch den alkalischen Phosphatase-Transkriptionsterminator ersetzt. Die originale SalI Stelle wurde zerstört. Dafür wurde sie vor dem Terminator zusammen mit der ebenfalls aus pAT153 deletierten BamHI Stelle wieder eingebracht. Die Sequenz der synthetisch hergestellten DNA ist in Fig.15 abgebildet.

b) Expressionsklon pRH291 .

Der cDNA Klon pP6/5 wurde mit BglII und PstI geschnitten und das 980 bp lange Fragment isoliert, das den Hauptteil der kodierenden und ca. 200 bp 3'nichttranslatierte Region enthält. Mittels Oligonukleotiden wurde das fehlende 5'Ende der kodierenden Region ersetzt. Dabei wurde durch zwei Mutationen (GGC -> GGT, Gly-7 und ACT -> ACC, Thr-8) gleichzeitig eine KpnI-Schnittstelle in die VAC-cDNA eingeführt.

Die Oligonukleotide hatten folgendes Aussehen:

|EBI-678

| | EBI-677

5' GCACAGGTTCTCAGAGGTACCGTGACTGACTTCCCTGGATTTGATGAGCGGGCT 3
CGTGTCCAAGAGTCTCCATGGCACTGACTGAAGGGACCTAAACTACTCGCCCGA
EBI-680||

GATGCAGAAACTCTTCGGAAGGCTATGAAAGGCTTGGGCACAGATGAGGAGAGCCTACGTCTTTGAGAAGCCTTCCGATACTTTCCGAACCCGTGTCTACTCCTCTCG

| | EBI-682

TAGGACTGTGACATCCCGAAGTAATGCTCAGCGCCAGGAAATCTCTGCA 3'
TAGGACTGAGACAACTGTAGGGCTTCATTACGAGTCGCGGTCCTTTAGAG 5'
679|| EBI-681|
Die Oligonukleotide EBI-680, -677, -678 und -682 wurden
am 5'Ende phosphoryliert. EBI-678 und -680, EBI-677
und-679 sowie EBI-682 und -681 wurden paarweise auf
100°C erhitzt und langsam abgekühlt (je 100 pMol in 20
ul). Die Doppelstrang-Oligonukleotide wurden vereint
und ligiert. pRH284T wurde mit SacI linearisiert, das
3'überhängende Ende durch Behandlung mit DNA-Polymerase
I / Klenow Fragment in Gegenwart von dGTP zu einem
geraden Ende reduziert, und mit BamHI
nachgeschnitten.Ca. 30 ng Vektor, 200 ng cDNA und

250 nMol Oligonukleotide wurden in 15 μl Lösung ligiert. Kompetente E.coli HBlOl wurden mit der Ligaselösung transformiert. Der resultierende Klon wurde pRH29l benannt (Fig.16).

Beispiel 6

Vac-beta Expression in E.coli

a) Expressionsklon pRH212

Als Expressionsvektor wurde das Plasmid pER103
verwendet (E.Rastl-Dworkin et al., Gene 21 (1983),
237-248). Der Vektor wurde mit HindIII linearisiert.
Das 5'überhängende Ende wurde mit dATP und
DNA-Polymerase I / Klenowfragment partiell eingefüllt,
und der verbleibende Einzelstrangrest mit S1 Nuklease
verdaut. Der Vektor wurde mit BamHI nachgeschnitten und
das große Fragment isoliert (Fig.17). Aus dem Klon
pRH203 wurde das 440 bp lange MaeIII-BamHI Fragment
isoliert, das die Codons 13 bis 157 enthält. Das
fehlende 5'Ende wurde durch Oligonukleotide
ergänzt:

EBI-307

- 5' CCATGGCTTGGTGGAAGCTTGGATCGAACAGGAAGGT 3
- 3' GGTACCGAACCACCTTTCGAACCTAGCTTGTCCTTCCACAGTG 5'
 EBI-306

Dabei wurden für E.coli optimale Codons verwendet (zB. R.Grantham et al., Nucleic Acids Res. 8 (1980), 1893-1912). Dieser Codonaustausch resultiert in einer neuen HindIII-Stelle bei Codon 5 bis 7. Das Oligonukleotid EBI-306 wurde phosphoryliert, mit EBI-307 hybridisiert und mit dem VAC-beta Fragment ligiert. Nach dem Nachschnitt mit BamHI wurde das

5'terminale VAC-Fragment in den vorbereiteten pER103
Vektor ligiert. Der entstehende Klon wurde pRH211
benannt. Um die für VAC-beta kodierende Region zu
ergänzen, wurde aus dem Klon pRH201 das 1230 bp lange
BamHI-SphI Fragment isoliert. Der ca. 200 bp lange
pBR322 Abschnitt von BamHI bis SphI aus dem Plasmid
pRH211 wurde entfernt und durch den entsprechenden
VAC-cDNA Teil ersetzt. Es resultierte der Klon pRH212.
Das EcoRI-BamHI Fragment, das den Trp-Promotor
(S.marcescens), die ribosomale Bindungsstelle und den
synthetisch hergestellten Beginn des VAC-beta Gens
enthält, wurde durch Sequenzieren überprüft.

b) Expression von VAC-beta (pRH212)

Der Nachweis des plasmidkodierten VAC-beta erfolgte im Maxizell-system (A.Sancar et al., J. Bacteriol. 137 (1979), pp.692-693.). Ecoli CSR603 (F, thr-1, leuB6, proA2, phr-1, recA1, argE3, thi-1, uvrA6, ara-14, lacYl, galK2, xyl-5, mtl-1, gyrA98 (nalA98), rpsL31, tsx-33, Lambda, supE44) wurde mit pRH212 transformiert und bis zu einer OD bei 37°C gezüchtet. 20 ml Kultur wurden in einer offenen Petrischale mit einer UV-Germicidlampe (15W) aus 50 cm Entfernung 5 Sekunden lang bestrahlt und anschließend 1 Stunde weiter inkubiert. Der Kultur wurden 100 µg D-Cycloserin zugesetzt. Nach 16 Stunden wurden die Bakterien abzentrifugiert, zweimal mit Hershey-Salzlösung gewaschen (5,4g/l NaCl, 3,0 g/l KCl, l.1 g/1 NH_4C1 , 15 $mg/1 CaCl_2x2H_2O$, 0,2 g/1 $MgCl_2x6H_2O$, 0,2 mg/l $FeCl_3x6H_2O$, 87 mg/l $KH_{2}PO_{4}$, 12.1 g/1 Tris <math>pH=7.4), in 5 ml Hersheymedium resuspendiert (pro 100 ml Hersheysalze: 2.0 ml 20% Glukose, 0.5 ml 2% Threonin, 1.0 ml 1% Leucin, 1,0 ml 2% Prolin, 1,0 ml 2% Arginin, 0,1 ml 0,1% Thiamin-HCl) und mit 20 µg/ml Indolacrylsäure 2

Stunden inkubiert. Nach Zusatz von 5 µCi/ml 35_{S-Methionin} und weiterer Inkubation bei 37°C (1 Stunde) wurden die plasmidkodierten Proteine radioaktiv markiert. Die Bakterien wurden abzentrifugiert und in 200 µl SDS-Probenpuffer aufgenommen (Lämmli-Gel System, z.B. L.G.Davies et al., Methods in Molecular Biology (1986) pp.306-310). Die markierten Produkte wurden auf einem 15% Acrylamidgel aufgetrennt. Das Gel wurde getrocknet und an Kodak X-Omat S Film exponiert. Als Referenz wurde gereinigtes VAC-alfa Protein mitlaufen gelassen und durch Anfärben sichtbar gemacht. VAC-alfa läuft etwas schneller als das pRH212 kodierte VAC-beta, wie es auch dem Molekulargewicht nach zu erwarten war. Die Expression von VAC-beta ist außerdem durch Zugabe des Induktors Indolacrylsäure stimulierbar (Fig.18).

c) Expressionsklon pRH292

Der Expressionsvektor pRH284T wurde mit SacI linearisiert und die 3'überhängenden Ende mit DNA-Polymerase I / Klenowfragment und dGTP in gerade Enden übergeführt. Der Vektor wurde mit SalI nachgeschnitten, und das große Fragment isoliert.Das HindIII-SalI Insert des Klons pRH212 wurde isoliert. 0,2 pMol des Oligonukleotidpaares

- 5' GCTTGGTGGAA 3' EBI-684
- 3' CGAACCACCTTTCGA 5' EBI-685

wurde mit 0,2 pMol VAC-beta Insert und 0,015 pMol vorbereiteten pRH284T ligiert. E.coli HB101 wurde mit der Ligaselösung transformiert. Der resultierende Klon wurde pRH292 benannt (Fig.18).

Beispiel 7

Nachweis der Expression von Vac-alfa und Vac-beta in E.coli

a) Anzucht der Klone HB101/pRH291 und HB101/pRH292

Medien: 1) Vorkultur

- 10 g/l Trypton
 - 5 g/l Hefeextrakt
 - 4 g/l Glucose
 - 9 g/l Na₂HPO₄.2H₂O
 - 1 g/l NH Cl
 - 1 g/1 KC1
 - 1 ml/1 1M MgSO $_4$.7H $_2$ O
- 100 mg/l Ampicillin

Start-pH = 7,2

2) Hauptkultur

0,68 g/1 (NH₄)₂HPO₄

0,62 g/1 K2HPO4.3H2O

2,33 g/1 KCl

0.5 g/l NaCl

0,53 g/l $NH_{\Delta}Cl$

 $1.23 \text{ g/l MgSO}_4.7H_2\text{O}$

0,011 g/1 CaCl₂

10 mg/l Thiamin.HCl

 $3,92 \text{ mg/l} (NH_4)_2 \text{Fe(SO}_4)_2.6H_2^{O}$

0.72 mg/l AlC13.6H20

 $0.71 \text{ mg/1} \text{ CoCl}_{2}^{-}.6\text{H}_{2}^{-}\text{O}$

1.5 mg/l $KCr(SO_4)_2$.12H₂O

 $0.75 \text{ mg/1} \text{ Cuso}_{4}.\overline{5}\text{H}_{2}^{2}\text{O}$

0,19 mg/l H_3BO_3

```
0.51 \text{ mg/l}
                   MnSO<sub>4</sub>.H<sub>2</sub>O
                   Niso<sub>4</sub>.6H<sub>2</sub>O
  0.79 \text{ mg/l}
  0.73 \text{ mg/l} \text{ Na}_{2}^{\text{MoO}}_{4}.\overline{2}_{2}^{\text{H}}_{2}^{\text{O}}
                    ZnSO, 7H,0
  0.86 \text{ mg/l}
                    Caseinhydrolysat (Merck Art.# 2238)
            g/1
 21
            g/l Caseinhydrolysat (Sigma C9386)
·25
                    Cystein
          mg/l
100
            g/l Hefeextrakt
   2
                    Citronensäure
   1
            g/1
                    Glucose.H<sub>2</sub>O (Start bzw. Feed)
 11
            g/1
```

700 ml Vorkulturmedium wurden mit dem Expressionsklon angeimpft und bei 37°C unter Rühren (1000 rpm (=Umdrehungen pro Minute), Magnetstab) und Sauerstoffzufuhr (5 vvm (=vol/vol/min), Belüftungsfritte) 12 bis 15 Stunden inkubiert. 600 ml dieser Vorkultur wurden in einen Fermenter mit 12 l Hauptkulturmedium überführt. Die Hauptkultur wurde unter folgenden Bedingungen fermentiert:

Rührsystem: Blattrührer bei 1000 rpm

Belüftung: 1,0 vvm

Temperatur: 28°C

pH: 6,5 (25% NH₃ zur Korrektur)

Während der Fermentation wurde die Glucosekonzentration gemessen. Bei Absinken auf 5 g/l wurde 10 g/l Glucose nachgefüttert. Alle weiteren Nachfütterungen zu je 10 g/l erfolgten bei einem Absinken der Glucosekonzentration im Fermenter auf 10 g/l. Fiel der Sauerstoffpartialdruck auf etwa 0.05 atm ab, wurde der Druck im Fermenter auf 0.3 bar erhöht. Nach 20 Stunden wurde auf 15°C abgekühlt, die Biomasse über eine CEPA-Zentrifuge vom Nährmedium abgetrennt und bei -70°C eingefroren.

b) Nachweis des rekombinanten Vac-alfa bzw. Vac-beta Proteins

Lösungen:

Probenpuffer:

125 mM Tris pH=6,8

4 % SDS

10 % Mercaptoäthanol

10 % Glyzerin

0,02 % Bromphenolblau

Acrylamidgel:

Sammelgel:

Trenngel:

3 % Acrylamid

13,5 % Acrylamid

0,1 % Bisacrylamid 0,45 % Bisacrylamid

125 mM Tris pH=6,8

375 mM Tris pH=8.8

0,1 % SDS

0,1 % SDS

Laufpuffer:

14,4 g/l Glycin

3,025 g/l Tris

ml 20% SDS

Proteingel-Färbelösung: Entfärbelösung:

0,1% Coomassieblau

5% Methanol

50 % Methanol

10% Essigsäure

10 % Essigsäure

Glycerinlösung:

7% Essigsäure

2% Glyzerin

Transferpuffer:

10x Transferpuffer:

lx Transferpuffer:

24,2 g/l Tris

100 ml/l lox Transferpuffer

112,6 g/l Glycin

200 ml/l Methanol 1 ml/l Empigen

Blocklösung:

PBS:

1%	Tween 20			
1%	₹ BSA (Rinderserumalbumin)			
10%	fötales	Kälberserum	(GIBCO)	
in PBS				

0.2 g/l KCl 1.15 g/l Na₂PO₄ 0.2 g/l KH₂PO₄ 0.1 g/l MgCl₂ 0.7 g/l CaCl₂

8 g/1 NaC1

alkalische-Phosphatase-Puffer:

100 mM Tris pH=9,5 100 mM NaCl 5 mM MgCl₂

Am Ende der Fermentation wurde die optische Dichte der Brühe bestimmt und ein Aliquot entnommen. Die Bakterien wurden in einer Eppendorfzentrifuge pelletiert, mit einer Konzentration von 20 OD 600nm

(optische Dichte bei 600 nm) in Probenpuffer resupendiert und fünf Minuten bei 100°C denaturiert. Unlösliche Anteile wurden durch Zentrifugieren in der Eppendorfzentrifuge pelletiert. 5 µl Aliquots wurden auf das Acrylamidgel geladen. Als Referenz dienten Expressionsklone, die ständig bei hoher Phosphatkonzentration gezüchtet worden waren (0,08 mM Phosphat). Unter diesen Bedingungen wurde der alkalische Phosphatasepromotor nicht aktiviert.

Die Proteine wurden bei 6,5 V/cm (Sammelgel) bzw. bei 13 V/cm (Trenngel) entsprechend dem Molekulargewicht aufgetrennt, bis der Bromphenolblaufarbstoff das Ende des Gels erreicht hatte. Eine Hälfte des Gels wurde mit Coomassieblau gefärbt. Dazu wurde das Gel 30 Minuten in der Färbelösung bewegt und anschließend eine Stunde in der Entfärbelösung behandelt. Zur besseren Entfernung des überschüssigen Farbstoff wurde ein mit Aktivkohle gefüllter Dialysenschlauch in die Entfärbelösung getaucht. Das Gel wurde abschließend 30 Minuten in der Glyzerinlösung behandelt und mittels eines Geltrockners getrocknet.

Die Proteine der zweiten Gelhälfte wurden auf ein Nitrozellulosefilter übertragen. Dazu wurde der Sandwich Whatman 3MM Papier-Gel-Nitrozellulose (Schleicher-Schuell, BA85)-Whatman 3MM Papier in einer Biorad-Transferapparatur in 1x Transferpuffer zwei Stunden einer Spannung von 150 V (Stromstärke 1000 mA) unter Kühlung ausgesetzt. Das Nitrozellulosefilter wurde über Nacht bei Raumtemperatur in 50 ml Blocklösung behandelt. Das Filter wurde drei Stunden in 5 ml Blocklösung / 1:1000 verdünntes Rabbit-Anti-Vac-Antiserum inkubiert und anschließend 30 Minuten in

Fließwasser, sowie dreimal 15 Minuten in PBS / 1% Tween 20 (Merck-Schuchardt # 822184) gewaschen. Das Filter wurde in 20 ml Blocklösung mit einer 1:2000 Verdünnung des Anti-Rabbit IgG (Fc) alkaline phosphatase conjugate (Promega-ProtoBlot Immunoscreening System) drei Stunden bei Raumtemperatur inkubiert. Es wurde wie oben in Fließwasser und PBS / 1% Tween 20 gewaschen. Der Nachweis des gebundenen Antikörper-alkalische Phosphatase-Konjugates erfolgte durch eine Farbreaktion (Promega-ProtoBlot Immunoscreening System). 66 µl NBT (50 mg/ml Nitro-blue-tetrazolium in 70% Dimethylformamid) und 33 ul BCIP (50 mg/ml 5-Bromo-4-chloro-3-indoly1-phosphat in Dimethylformamid) wurden in 10 ml alkalische-Phosphatase-Puffer gelöst. Das Nitrozellulosefilter wurde bis zur Farbentwicklung in dieser Lösung inkubiert und anschließend 30 Minuten mit Fließwasser gewaschen. Das Filter wurde getrocknet und in Plastikfolie eingeschweißt.

In Figur 19 ist das Resultat wiedergegeben.
"+Phosphat" ist die Kontrolle ohne Expression,
"-Phosphat" zeigt die Expression von Vac-alfa (Klon
HB101/pRH291) bzw. Vac-beta (Klon HB101/pRH292)
Protein unter der Kontrolle des alkalischen
Phosphatase Promotors. Sowohl Vac-alfa als auch
Vac-beta Protein sind bereits auf dem gefärbten Gel zu
erkennen. Die gebildete Menge an Vac-Proteinen beträgt
überraschenderweise mindestens 20 mg/l/OD600nm
Bakterienkultur.

Der Westernblot zeigt deutlich die angefärbte Vac-alfa Bande. Zusätzlich sind einige Proteine niedrigeren Molekulargewichts im Bereich bis 30 kD erkennbar, die möglicherweise durch proteolytische Spaltung am Nund/oder C-Terminus des Vac-alfa Proteins entstanden sind. Auffällig ist außerdem ein durch das Antiserum erkanntes Protein im Bereich kleiner 20 kD, das eventuell ein durch Proteolyse entstandenes Halbmolekül des Vac-alfa Proteins darstellen könnte. Überraschenderweise wurde auch Vac-beta durch das Anti-Vac-Antiserum erkannt. Da diese Bande wesentlich schwächer als die Vac-alfa Bande gefärbt ist, andererseits aber die Vac-beta Bande im Coomassie Blau gefärbten Gel in ihrer Intensität dem Vac-alfa entspricht, ist daraus zu schließen, daß die Erkennung des Vac-beta Proteins durch das Anti-Vac-Antiserum wesentlich schlechter als jene des Vac-alfa Proteins erfolgt.

Beispiel 8

Reinigung von rekombinantem VAC-alpha

Ausgangsmaterial: E.coli HB101/pRH 291.

Die Zellen waren zentrifugiert und bei -70°C eingefroren worden.

a) Zell Homogenisierung und Extraktion

103,5 g gefrorener Zellkuchen wurde in 500 ml eiskaltem Lyse-Puffer (100 mM TRIS/HCl, 50 mM EDTA und 200 mM NaCl, pH 7,5) suspendiert und mit einem Ultra-Turrax (5 kurze Impulse) zur Zerstörung von Klumpen behandelt. Die Suspension wurde danach 3-mal durch eine Manton-Gaulin Presse bei 6.000 psi geführt. Zuletzt wurde die Presse mit 300 ml Lyse-Puffer gespült. Zur homogenisierten Suspension

wurde langsam eine 5%ige Lösung PEI

(Polyethylenimin, Molekulargewicht 30.000-40.000),
das mit 5 N HCl auf pH8 eingestellt worden war, bis
zu einer Endkonzentration von 0,5% PEI, hinzugefügt.
Nach 30-minütigem Rühren in einem Eisbad wurde die
Lösung bei 9.000 g, 60 min. und 4°C unter Verwendung
einer Beckmann J2-21 Zentrifuge geklärt. (roher
Extrakt).

b) Ammoniumsulfat Fraktionierung:

Festes Ammoniumsulfat wurde langsam zum gerührten rohen Extrakt bis zu einer Sättigung von 30% (176 g/l) gegeben. Der Niederschlag wurde nach einer Nacht im Kühlraum entfernt. Der klare Überstand wurde langsam bis zu einer Sättigung von 65% mit festem Ammoniumsulfat versetzt (235 g/l Überstand) und zwei Stunden gerührt. Das Präzipitat wurde dann durch Zentrifugation bei 10.000 g 30 min. bei 4°C gesammelt. Es wurde in 500 ml 20 mM TRIS/HCl + 50 mM NaCl, pH 7.4 gelöst und gegen denselben Puffer so lange dialysiert, bis alles Ammoniumsulfat entfernt worden war (bestimmt durch das Ausbleiben einer BaSO₄-Bildung nach Zugabe von BaCl₂ zum Dialysat).

c) Chromatographie an DEAE-SEPHAROSE FAST FLOW

Das Dialysat wurde durch Zentrifugation geklärt und auf eine 160 ml DEAE-FF-Sepharose-Kolonne (Pharmacia), die mit 20 mM TRIS/HCl + 50 mM NaCl pH 7,4 equilibriert worden war, aufgetragen. Sobald der OD des Eluates den Puffer-Level erreichte, wurde ein Gradient von 50 - 500 mM NaCl in 20 mM TRIS/HCl pH 7,4 gefahren (insgesamt 10 Kolonnen-Volumina des linearen Gradienten).

Das Eluat wurde bei OD kontrolliert und durch SDS-PAGE und Western Blot, unter Verwendung eines Kaninchen-Antiserums gegen Placenta-VAC hergestellt, wie für das Rinder-VAC in der EPA O 181 465 beschrieben, und eines Schweine Anti-Kaninchen IgG gekuppelt an alkalischer Phosphatase, analysiert. VAC-enthaltende Fraktionen wurden gesammelt, wobei einige Fraktionen am Ende des Hauptpeaks verworfen wurden. Der VAC-Pool wurde unter Verwendung einer AMICON Ultrafiltrationszelle und eines PM 10-Typ Ultrafilters konzentriert.

d) Chromatographie an Sephacryl S-200 "High Resolution"

Eine Pharmacia K 26/100 Kolonne (500 ml) wurde mit
Sephacryl S-200 HR (Pharmacia) beladen und mit 20 mM
Bis-TRIS/HCl + 100 mM NaCl pH 6,3 bei einer
Durchflußrate von 15-20 ml/Stunde equilibriert.
6-15 ml Aliquots des konzentrierten
DEAE-FF-Sepharose-Pools (total 87,4 ml) und
anschließend der Bis-TRIS-Puffer (s.o.) wurden auf
die Säule aufgetragen. Das Eluat wurde bei OD 280 nm
überwacht. Der VAC repräsentierende Peak war der
letzte auffällige Peak des UV-Profils wie durch
SDS-PAGE und Western Blots von Aliquots gezeigt
werden konnte. Er wurde gesammelt, die Pools aller
Versuche vereinigt (insgesamt 7) und gegen 20 mM
Bis-TRIS/HCl pH 6,3 dialysiert.

e) Chromatographie an einer Q-SEPHAROSE-FAST-FLOW

Eine 40 ml Kolonne (K 16/20) einer Q-Sepharose-Fast-Flow (Pharmacia) wurde an das FPLC-System (Pharmacia) angeschlossen und mit 20 mM Bis-TRIS/HCl pH 6.3 equilibriert. Der dialysierte VAC-Pool wurde auf die Säule aufgetragen und so lange mit 20 mM Bis-TRIS gewaschen, bis der OD des Eluates wieder den Puffer-Level erreicht hatte. Ein NaCl-Gradient in 20 mM Bis-TRIS/HCl pH 6.3 wurde zur Elution verwendet:

0-105 mM NaCl in 1 Kolonnen-Volumen (40 ml) 105-245 mM NaCl in 20 Kolonnen-Volumen (800 ml) 245-350 mM NaCl in 2 Kolonnen-Volumen (80 ml)

VAC konnte im letzten prominenten Peak des
UV-Profils identifiziert werden, der bei ungefähr
0,14 M NaCl eluierte. Die Reinheit wurde mittels
SDS-PAGE, Western Blot, Reverse HPLC und
isoelektrischer Fokussierung bestimmt. Der VAC-Pool
wurde bei -20°C aufbewahrt.

Beispiel 9

Vergleich Rekombinantes/natürliches VACa

Verwendete Methoden:

- a) Gelpermeations-HPLC
- b) Reverse Phase HPLC
- c) N-terminale Sequenzierung
- d) Tryptic Peptid Map
- e) SDS-Gelelektrophorese
- f) Western Blot
- g) Isoelektrische Fokussierung

Für den Vergleich wurde einerseits natürliches VAC, andererseits rekombinantes VAC-alfa verwendet. Im folgenden werden die Versuchsbedingungen für die einzelnen Analysenmethoden beschrieben.

a) Gelpermeations-HPLC

Säule: Waters Protein Pak I 125, 2 x (7,8 x

300 mm), 10 μm Teilchendurchmesser

Eluens: 0,5 M Na₂SO₄, 0,02 M NaH₂PO₄,

pH 7,0, 0,04% Tween 20, 25%

Propylenglykol

Fluß: 0,5 ml/min

Detektion: UV-Absorption, 214 nm

Die Chromatogramme von natürlichem und rekombinantem VAC-alfa zeigen den Hauptpeak des VAC-Monomeren bei einem Molekulargewicht von 34.000 bzw. 33.000. Daneben gibt es jeweils einen geringen Anteil von früher eluierendem Dimeren des VAC. Die Eichung der Molekulargewichtsskala erfolgte über 4 Standardproteine. Die Säule trennt streng genommen nach Molekülgröße und nicht nach Molekulargewicht.

b) Reverse Phase HPLC

Säule: Bakerbond WP C_{18} , 4,6 x 250,

5 μm Teilchendurchmesser, 30 nm

Porendurchmesser

Eluens A: 0,1% Trifluoressigsäure in Wasser

Eluens B: 0,1% Trifluoressigsäure in Acetonitril

Gradient: 20% B für 2 min, 20 - 68% B in 24 min,

68% B für 10 min, 68 - 20% B in 1 min

Fluß: 1.0 ml/min

Detektion: UV-Absorption, 214 nm und 280 nm

Die Chromatogramme von natürlichem und rekombinantem VAC zeigen für VAC eine Retentionszeit von etwa 29 min. Die daneben vorliegenden sehr kleinen Peaks sind nur zum Teil Verunreinigungen der VAC-Probe. Alle mit BW gekennzeichneten Peaks stammen aus dem Blindwert der Säule.

c) N-terminale Sequenzierung

Sequenziert wurde ein über Reverse Phase HPLC entsalzter Peak von rekombinantem VAC-alfa. Die Sequenzierung erfolgte mit einem Gasphasensequenator der Firma Applied Biosystems (Modell 470A) mit dem Programm 40APTH. Die Probe wurde in 50 µl 70% HCOOH gelöst. Am Sequenator wurden 2 x 25 µl aufgetragen. Mit einer Ausgangsmenge von 2,3 nMol konnte bis zur Aminosäure 39 sequenziert werden. Es wurde 100%ige Übereinstimmung mit der erwarteten Sequenz (aus natürlichem Protein und cDNA) gefunden. Zusätzliches N-terminales Met konnte nicht nachgewiesen werden (\leq 1%). Der N-Terminus liegt bei rekombinantem VAC-alfa frei und nicht blockiert vor wie bei natürlichem VAC.

d) Tryptic Peptid Map

Verglichen wurden natürliches VAC und rekombinantes VAC-alfa. Aus beiden Proben wurde VAC über Reverse Phase HPLC entsalzt, getrocknet und in 0,1% NH4HCO3 gelöst. Für die Spaltung wurden 4 Gewichts% Trypsin (Worthington, TPCK behandelt, gelöst zu je 1 mg/ml in Wasser) zugesetzt, nach 6 Stunden Inkubation bei 37°C nochmals 4 Gewichts% Trypsin. Nach weiterer Inkubation über Nacht wurden die entstandenen Peptide über Reverse Phase HPLC getrennt. Die beiliegenden Chromatogramme (214 nm und 280 nm) zeigen ein praktisch identisches Peptidmuster.

Säule: Waters $\mu Bondapak$ C , 3,8 x 300 mm, 10 μm Teilchendurchmesser 10 nm Porendurchmesser

Eluens A: 0,1% Trifluoressigsäure in Wasser

Eluens B: 0,1% Trifluoressigsäure in Acetonitrill

Gradient: 0 - 55% B in 55 min, 55% B für 15 min, 55 - 0% B in 1 min

Fluß: 1,0 ml/min

Detektion: UV-Absorption, 214 nm und 280 nm

e) SDS-Gelelektrophorese

SDS-Gelelektrophorese wurde weitgehend nach der Originalvorschrift von U.K. Laemmli durchgeführt (Nature 227, 680-685 (1979)). Die Silberfärbung

erfolgte nach der Methode von Oakley (Anal. Biochem. 105, 361-363 (1980)). Das erste Gel zeigt einen Vergleich zwischen natürlichem und rekombinantem VAC-alfa. Der Gehalt an dimerem VAC wurde durch Scannen mit einem Laserdensitometer quantifiziert und betrug 2% beim natürlichen und 4% beim rekombinantenm VAC. Das zweite Gel zeigt nur rekombinantes VAC-alfa, aufgetragen mit und ohne DTT (Dithiothreitol, Reduktionsmittel). Daraus ist ersichtlich, daß das SDS-stabile Dimere offensichtlich über Disulfidbrücken gebunden ist, die mit DTT reduziert werden können.

Stammlösungen der Reagenzien

. עובועןטט טיד

15% Ammonium-persulfat-Lösung (APS)

1,2 g

150 mg Ammonium-persulfat werden in 1 ml dest. Wasser gelöst.

30% Acrylami Acrylamid	d + 0,8% Bis Acrylam Bis-acrylamid	<u>id</u> Wass	ser	auf
15 g	0,4 g	50	m1	
30 g	0,8 g	100	ml	

Das Acrylamid wird in dem entsprechenden Wasservolumen gelöst und vor der Verwendung filtriert.

150 ml

Trenngel-Puffer

45 q

1,5 M TRIS-HCL, 0,4% SDS (Sodium-dodecylsulfat), pH 8,8 18,16 g TRIS + 0,4 g SDS mit konz. HCl auf pH 8,8 einstellen und mit dest. Wasser auf 100 ml auffüllen.

Stackinogel-Puffer

0,5 M TRIS-HCl, 0,4% SDS, pH 6.8 6,04 g TRIS + 0,4 g SDS mit konz. HCl auf pH 6,8 einstellen und mit dest. Wasser auf 100 ml auffüllen.

Laufpuffer

25 mM TRIS, 192 mM Glycin, 0,1% SDS, 0,005% Na-azid pH 8,5 12 g TRIS + 57,6 g Glycin + 4 g SDS + 0,2 g Natriumazid werden in ca. 3,5 l dest. Wasser gelöst, auf pH 8,5 eingestellt und auf 4,0 l aufgefüllt. Es empfiehlt sich die Leitfähigkeit des neuen Laufpuffers mit den vorhergehenden Chargen zu vergleichen.

0,05% Coomassie-Blue-Färbelösung

0,55 g Coomassie Brillant Blue R 850 werden in 500 ml Methanol gelöst, 30 min gerührt und filtriert. Dazu gibt man 100 ml Eisessig und 500 ml dest. Wasser.

Entfärbelösung

¥ ¥

- a) Manuelles Entfärben Die Entfärbelösung entspricht der Färbelösung ohne Farbstoff: 500 ml Methanol + 500 ml dest. Wasser + 100 ml Eisessig
- o) Elektrophoretisches Entfärben in 7,5% Essigsäure

4 x SDS Auftragepuffer (ca. 1 Monat haltbar)

Farbstoffkonzentrat:

Bromphenolblau 50

mg

Glycerin

0,5 ml

Wasser (dest.) auf

Die Lösung ist ca. 3 Monate haltbar.

Auftragepuffer:

Farbstoffkonzentrat

SDS

0,8 g

Glycerin

. Wasser (dest.) auf

I x SDS Auftragepuffer

Verdünnung 1:4 des 4 x SDS Auftragepuffers mit dest. Wasser.

Silberfärbung nach Oakley

Reagenzien

Destainer:

Ethanol

200 ml

Essigsäure (conc.)

Dest. Wasser auf

1000

10% Glutardialdehyd-Lösung:

25% Glutardialdehyd-Lösung

20 ml

bzw. 40 ml

Dest. Wasser auf

50 ml

bzw. 100 ml

Die Lösung muß im Kühlschrank aufbewahrt werden.

0,1 N ammoniakalische Silberlösung:

Erst direkt vor Gebrauch herstellen!

0,1 N Silbernitrat (16,9 g/l)

23 ml 46 ml

25% Ammoniaklösung

0,95 ml 1,9 ml

0,36% Natriumhydroxid (1,8 g/0,5 1) 10,5 ml 21 ml dest. Wasser auf 50 ml 100 ml

Entwickler-Lösung:

Unmittelbar vor Gebrauch herstellen!

0,5% Citronensäure (1,25 g/250 ml) 5 ml
dest. Wasser 1 l
37% Formaldehyd 1 ml

Entfärbe-Lösung (Photo-Fixierer):

Kodak-Fixierer (Photolabor) Verdünnung 1:4 mit dest. Wasser. Die Verdünnung ist mehrfach verwendbar, jedoch nimmt die Dauer des Entfärbens nach häufigerer Verwendung zu.

2% Glycerin-Lösung:

23 g Glycerin 87% in 1 l dest. Wasser

Durchführung der Silberfärbung nach Oakley

Nach beendeter Elektrophorese wurde das Gel an einer Ecke markiert und durchlief danach folgende Färbeschritte im Schüttler:

- 30 min im Destainer-Bad
- 30 min in 20% Glutardialdehyd-Lösung (50 ml)
- 30 min in fließendem Wasser oder über Nacht in ca.
 2 l Wasser
- 10 min in ammoniakalischer Silberlösung (50 ml)
- 3 min in fließendem Wasser
- ca. 5 min in Entwickler-Lösung

Der Entwicklungsvorgang wurde nicht nach einer exakten Zeitdauer beendet, sondern dann, wenn die Banden ausreichend gefärbt waren oder spätestens wenn sich der Hintergrund zu färben begann. Gestoppt wurde die Entwicklung durch

 30 min Wässern der Gele (in einer Wanne oder unter Fließwasser)

Die Entwicklung dauerte auch noch an, wenn das Gelbereits im Wasser war! (Diffusionszeit).

Das Entfärben des Gels war nur dann erforderlich, wenn der Hintergrund zu stark gefärbt war!

- ca. 5-10 min in Kodak-Fixierer, bis ein optimaler Kontrast zwischen den Banden und dem Hintergrund erreicht war. Achtung! Das Entfärben erfolgte auch noch nach unmittelbarem Abstoppen in fließendem Wasser (Diffusionszeit).
- 30 min in 2% Glycerin-Lösung

Danach konnte das Gel auf Filterpapier bei 80°C 1 Std. getrocknet werden.

f) Western Blot

Der immunologische Nachweis erfolgte für VAC mit rabbit anti VAC Serum (1:1000 verdünnt) und mit swine anti rabbit IgG (1:500 verdünnt), das mit Alkalischer Phosphatase konjugiert ist. Zum Nachweis der Enzymaktivität der Alkalischen Phosphatase wurden die Substrate BCIP (5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphat) und NBT (Nitro Blue Tetrazolium) eingesetzt. Die vergleichende Proteinfärbung auf der Nitrocellulose erfolgte mit Amidoschwarz.

Western-blotting im semi-dry Verfahren

1. Materialien:

Semy-dry Electroblotter (Fa. Sartorius) SM 175 56; Filterpapier in der Größe des zu blottenden Gels; Nitrocellulose-Membran (Porengröße 0,45 μm) in . Gelgröße;

2. Reagenzien

20% Methanol

Anodenpuffer 1: pH 10,4

O,3 M TRIS	3,63	g/80	ml			
20% Methanol		20	m1			
Anodenpuffer 2: pH 10.4						
25 mM TRIS	0,3	g/80	ml			
20% Methanol		20	m l			
				·		
Kathodenpuffer: pH·9,4						
25 mM TRIS	0,3	g/80	m1			
40 mM ε-Aminocapronsäure	0,52	g/80	ml	(MW		

131,3)

20 ml

Amidoschwarz-Protein-Färbemedium

0,5% (w/v) Amidoschwarz 0,5 g in 40 ml
50% Methanol 50 ml
10% Essigsäure 10 ml

<u>Entfärber</u>

Methanol - Wasser - Essigsäure

5 . - 5 . - 1

PBS (Phosphate buffered saline) 10x K	onzentrat pH 7.2
136 mM Natriumchlorid	80 g
26 mM Kaliumchlorid	2 · g
80 mM di-Natriumhydrogenphosphat	11,3 g
(80 mM di-Natriumhydrogenphosphat .1	2H ₂ O 28,7 g)
14 mM Kalium-dihydrogenphosphat	2 g
mit dest. Wasser auffüllen auf	1 1
vor Gebrauch 1/10 verdünnen !!!	

Blocking Puffer:

1% BSA

0,1% Tween 20

in lx PBS

Waschpuffer:

- 1 x PBS
- 1 x PBS + 0,1% Tween 20
- 1 x PBS

Färbepuffer für Alkalische Phosphatase-Färbung:

pH 9,9

1,22 g 100 mM TRIS 0,58 g 100 mM Natriumchlorid 0,10 g 5 mM Magnesiumchlorid. 6H,0 100 ml mit dest. Wasser auffüllen auf

NBT (Nitro-Blue Tetrazolium) - Lösung

50 mg NBT (Fa. Sigma N-6876)/ml 70% Dimethylformamid

BCIP (5-Bromo-4-chloro-3-indoly1-phosphat) - Lösung 50 mg BCIP (Fa. Sigma B-8503)/ml in 100% Dimethylformamid

Färbemedium für Alkalische Phosphatase

.10 ml Färbungspuffer 0.033 ml BCIP 0,065 ml NBT

Antikörperreagenzien:

Rabbit anti VAC-Serum mit alkalischer Phosphatase konjugiert.

3. Durchführung des Blots

Das Blotten erfolgte bei 0.8 mA/cm² Gelfläche über 60 min

- 4. Nachweis der Proteine auf der Nitrocellulose-Membran
- 4.1. Proteinfärbung mit Amidoschwarz

Der für die Proteinfärbung vorgesehene Anteil der Nitrocellulose-Membran wurde abgeschnitten und 5 Minuten in Amidoschwarz-Färbelösung gelegt. Danach wurde die mehrfach verwendbare Färbelösung abgegossen und überschüssige Färbelösung von der Nitrocellulose-Membran mit Wasser abgespült.

4.2 Immunologischer Nachweis

4.2.1 Blockierung der Nitrocellulose-Membran

Vor dem immunologischen Nachweis wurde die Nitrocellulose-Membran mindestens 60 min (oder auch über Nacht) mit 1% BSA in lxPBS mit 0.1% Tween 20 blockiert.

4.2.2. Nachweis mit Enzym-markierten Antikörpern

Nach dem Blockieren wurde die Nitrocellulose-Membran mit rabbit anti VAC Serum (in geeigneter Verdünnung in Blockierungsmedium) 60 min inkubiert.

Danach wurde 3x gewaschen: lx PBS, PBS mit 0.1% Tween, 20.1x PBS. Darauf erfolgte die Inkubation der Membran mit swine anti rabbit IgG, das mit Alkalischer Phosphatase konjugiert war (ebenso in einer geeigneten Verdünnung in Blockierungsmedium über 60 min). Danach wurde erneut 3x mit PBS gewaschen wie oben angegeben.

4.2.3 Enzymatische Färbung des Blots

Die Nitrocellulose-Membran wurde in Färbemedium gelegt (für ein Minigel reichten 10 ml aus) und im Schüttler langsam bewegt, bis sich eine ausreichende Anfärbung der Banden zeigte. Die Färbung wurde durch Auswaschen des Färbemediums mit Wasser beendet, danach die Nitrocellulose-Membran an der Luft getrocknet.

5. Bewertung des Western-Blots

Die immunologisch/enzymatisch nachgewiesenen Banden des Blots wurden mit den Banden der Proteinfärbung des Blots und auch mit dem entsprechenden Bandenmuster der SDS-Elektrophorese verglichen und einander zugeordnet.

7. Isoelektrische Fokussierung

Der isoelektrische Punkt (pI) für rekombinantes VAC-alfa liegt mit 4,9 um 0,1 pH-Einheiten höher als für natürliches VAC (4,8).

Polyacrylamidgel-Isoelektrische Fokussierung (PAGIF oder IEF)

<u>Material und Reagenzien</u>

Polyacrylamidgelplatten für Isoelektrische Fokussierung auf Folie aufpolymerisiert. (LKB - "PAGplate", SERVA - "Servalyt Precotes")

Elektrodenlösungen für die jeweiligen pH-Bereiche:

pH 3,5-9,5 (LKB-PAGplate)

Anodenlösung: 1 M Phosphorsäure Kathodenlösung: 1 M Natronlauge pH 5,5-8,5 (LKB-PAGplate)

Anodenlösung: 0,4 M HEPES (mit Na-azid)

Kathodenlösung: 0,1 M NaOH;

pH 4,0-6,5 (LKB-PAGplate)

Anodenlösung: 0,5 M Phosphorsäure + 0,1 M

Glutaminsäure

Kathodenlösung: 0,1 M Beta-Alanin (mit Na-azid)

pH 3,5-9,5 (SERVALYT-Precotes)

Anodenlösung: 25 mM Asparaginsäure + 25 mM

Glutaminsäure

Kathodenlösung: 2 M Ethylendiamin + 25 mM Arginin Base

+ 37,5 mM Lysin Base

Kühlvermittler: Kerosin (Fa. SERVA)

Fixierlösung:

10% Trichloressigsäure (TCA) mit 5% Sulfosalicylsäure

0,05% Coomassie Blue Färbelösung

Entfärber: 500 ml Methanol + 500 ml Wasser +

100 ml Eisessig

Proben:

Die Proben sollen salzarm oder besser noch salzfrei sein. Höhere Salzkonzentration müssen vor der IEF gegen ca. 5-10 mM Puffer oder Wasser dialysiert werden. NaCl kann jedoch bis zu 100 mM enthalten sein, ohne daß die Lauffronten gestört werden.

Fixierung des IEF-Gels vor Proteinfärbung

Das Gel wurde ca. 20 min in die Fixierlösung gelegt, jedoch ohne dabei zu schütteln! (Es löste sich dabei leicht von der Folie ab) Danach wurde 5 min gewässert.

Proteinfärbung der IEF-Gele mit Coomassie Blue

Die fixierten Gele wurden ca. 2 Std. in Färbelösung gelegt und dabei nur sehr leicht bewegt.

Entfärben der IEF-Gele

Nach der Färbung wurde die überschüssige Färbelösung mit Wasser abgespült und durch häufiges Wechseln des Entfärbers das Gel entfärbt. Nach ausreichendem Entfärben wurde das Gel wieder gewässert, bis der Entfärber ausgewaschen war.

Trocknen der IEF-Gele

Die Gele wurden auf eine nasse, wasserdurchlässige Klarsichtfolie oder Dialysemembran gelegt, mit der wasserundurchlässigen Seite nach oben und 1 Std. bei 80°C getrocknet.

Beispiel 10

Biologische Aktivität von rekombinantem VAC

A. Modifizierter Prothrombin Zeit Test (s.EPA 0 181 465)

Zitriertes, Plättchen freies Plasma (PFP) wurde in An- oder Abwesenheit von rekombinantem VAC (r-VAC) oder natürlichem VAC zwei Minuten bei 37°C gerührt. Nach der Inkubation wurde eine Lösung aus brain tissue factor und Ca⁺⁺ zugegeben. Die Fibrinbildung wurde beobachtet, die Gerinnungszeit optisch registriert. Die Ergebnisse sind in Fig. 33 dargestellt und belegen, daß r-VAC und VAC die

Fibrinbildung dosisabhängig inhibieren. Die spezifischen Aktivitäten des r-VAC und des VAC bewegen sich in derselben Größenordnung.

B. Thrombin Zeit Test (s. EPA 01 181 465)

Zitriertes PFP wurde in An- oder Abwesenheit von r-VAC oder VAC zwei Minuten bei 37°C gerührt. Nach der Inkubation wurde Thrombin und Ca⁺⁺ zugegeben. Die Fibrinbildung wurde optisch beobachtet. Sowohl r-VAC als auch VAC inhibieren nicht die Thrombin-induzierte Fibrinbildung wie aus Fig. 34 zu entnehmen ist. Folglich inhibieren sowohl r-VAC als auch VAC die Thrombinbildung, nicht jedoch die Thrombinwirkung.

C. Faktor Xa-Bildung in Gewebefaktor-aktiviertem Plasma (s. EPA 0 181 465)

Zitriertes PFP wurde in An- oder Abwesenheit von r-VAC oder VAC zwei Minuten bei 37°C gerührt. Anschließend wurde eine Lösung von "brain tissue factor" und Ca $^{++}$ zum PFP gegeben, um so die Koagulation in Gang zu setzen. Zu bestimmten Zeiten wurden Proben entnommen und in einem Puffer 1000fach verdünnt. 10 μ l dieser Lösung wurden zu 40 μ l einer Mischung, die die nachfolgenden Komponenten des Prothrombinase-Komplexes enthielten, zugegeben.

0,6 nM Faktor Va
50 µM Phospholipide (80% Dioleoyl-phospatidylcholin/20% Dioleoyl-phosphatidylserin).
1,0 µM Prothrombin

Nach einer Reaktionszeit von zwei Minuten wurde der Anteil an aktiviertem Prothrombin durch die amidolytische Aktivität unter Verwendung des chromogenen Substrats S 2238 beurteilt. Die Menge an amidolytischer Aktivität, die so gemessen wurde, ist der Menge an aktivem Faktor X_a in dem PFP direkt proportional.

Nach 1000-facher Verdünnung bei Anwesenheit von VAC in dem PFP konnte keine Auswirkung auf die Prothrombin-Aktivierung beobachtet werden.

Eine typische Faktor X_a-Bildungskurve und die Auswirkungen von r-VAC und VAC sind in Fig. 35 dargestellt. Durch diese Ergebnisse kann festgestellt werden, daß r-VAC die Gewebefaktorinduzierte Faktor X-Aktivierung im Plasma, in dosisabhängiger Weise wie VAC inhibiert.

Die Ergebnisse zeigen weiterhin indirekt, daß sowohl r-VAC als auch VAC den Faktor X_a direkt nicht in einer zeitabhängigen Weise inaktivieren. Diese Aussage kann aus der Form der Kurve hergeleitet werden. Nachdem ein Maximum erreicht ist, beginnt die Menge an aktivem Faktor X_a in dem PFP, einer Kinetik Pseudo 1. Ordnung folgend, abzunehmen. Diese Abnahme resultiert vermutlich aus der Inaktivierung des Faktors X_a durch Antithrombin III. Die Geschwindigkeitskonstante Pseudo 1. Ordnung, die aus diesen Daten berechnet wurde, beträgt ca. 0,25 min⁻¹ und ändert sich nicht bei Abwesenheit von r-VAC und VAC.

Diese Daten belegen eindeutig, daß r-VAC
VAC-Aktivität zeigt. Obwohl die spezifische
Aktivität von r-VAC in diesem Koagulationstest
identisch ist mit der von VAC und obwohl r-VAC
Faktor X und Thrombin direkt nicht inaktiviert,
wurden zusätzlich noch Untersuchungen zur
r-VAC-Bindung an Phospholipide durchgeführt, um
zweifelsfrei die Zugehörigkeit der VAC-Aktivität zum
r-VAC zu demonstrieren.

Die Bindung von r-VAC und VAC an eine Phospholipid-Doppelschicht, die aus Dioleoylphosphatidylcholin und Dioleoylphosphatidylserin (80%/20%) besteht, wurde durch Verwendung eines automatischen Ellipsometers bestimmt. Dies Verfahren wurde von Cuypers et al. in J. Biol. Chem. 258 (1983), 2426-2431 beschrieben.

Ein typisches Ergebnis dieser Studie gibt Fig. 36 wieder. Sowohl r-VAC als auch VAC zeigen identische Bindungskinetik an die Doppelschicht, wenn sie in einer Konzentration von 1 µg VAC/ ml dieser Doppelschicht zugesetzt wurden. Die Bindung erfolgt in Anwesenheit von Ca²⁺ und ist, wie durch die Zugabe von EDTA gezeigt werden konnte, reversibel.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß r-VAC biologisch aktiv ist und von natürlichem VAC nicht zu unterscheiden ist.

Beispiel 11

Konstruktion Tetracyclin-resistenter VAC-alpha und VAC-beta Expressionsvektoren (pGN25, pGN26)

l μg pAT153 wurde in 50 μl Lösung mit EcoRI geschnitten. Die Enzymaktivität wurde durch Erhitzen auf 70°C zerstört, und die überhängenden Enden durch Zusatz von DNA-Polymerase I/Klenow Fragment (PolIK)(5 units) und den vier Desoxyribonukleosidtriphosphaten (je 20 μM Endkonzentration) in einer fill in Reaktion begradigt. Nach Erhitzen auf 70°C zur Zerstörung der PolIK Aktivität wurde die DNA mit Äthanol ausgefällt. Die linearisierte DNA wurde in 50 μl mit PvuI nachgeschnitten.

pRH291 bzw. pRH292 wurden zunächst mit SphI linearisiert und das 3' überhängende Ende durch die 3' exonukleolytische Aktivität der PolIK in Gegenwart von dGTP abgebaut. Nach Fällen der DNAs wurden diese mit PvuI nachgeschnitten. Die Fragmente aus allen drei Verdauen wurden auf einem Agarosegel getrennt und die entsprechenden Fragmente eluiert (pAT153: 3032 bp, pRH291: 1987 bp, pRH292: 2607 bp). 50 ng pAT153 Fragment wurden mit 50 ng pRH291 bzw. pRH292 Fragment versetzt und in 10 µl ligiert. 100 µl kompetenter E.coli HB101 wurden mit 5 µl der Ligaselösung versetzt und transformiert. Die Selektion erfolgte auf LB-Agar, der 100 μg/ml Ampicillin enthielt. Von den entstandenen Klonen wurden einige auf LB-Agar mit 12,5 µg/ml Tetracyclin ausgestrichen. Die darauf wachsenden Klone wurden zur Herstellung von Plasmid DNA verwendet. Die in einer Minipräparation hergestellte Plasmid-DNA wurde mit verschiedenen Restriktionsenzymen geschnitten und so die Richtigkeit der Konstruktion überprüft. Jeweils ein Klon wurde ausgewählt und mit pGN25 (VAC-alpha) oder pGN26 (VAC-beta) hezeichneE.coli HB101/pGN25 bzw. HB101/pGN26 wurden, wie in Beispiel 7 beschrieben, einer Fermentation unterzogen, wobei diesmal anstelle des Amicillins 5 mg/l Tetracyclin in der Vorkultur verwendet wurden. Während der Hauptfermentation wurden Aliquots entnommen und auf einem 15% Acrylamid/0,1% SDS Gel nach Lämmli untersucht. Es wurde kein Unterschied zu den Fermentationen von E.coli HB101/pRH291 bzw. HB101/pRH292 festgestellt. Aus der Biomasse der Fermentation wurde VAC-alpha und VAC-beta gereinigt. Die Proteinanalyse ergab ebenfalls keinen Unterschied zu den entsprechenden rekombinanten Proteinen aus den Fermentationen der Klone HB101/pRH291 und HB101/pRH292.

Beispiel 12

Reinigung von rekombinantem VAC-B

Ausgangsmaterial: E.coli HB101/pRH 292.

Die Zellen waren zentrifugiert und bei -70°C eingefroren worden.

a) Zell Homogenisierung und Extraktion

100 g gefrorener Zellkuchen wurde in 500 ml eiskaltem Lyse-Puffer (100 mM TRIS/HCl, 50 mM EDTA und 200 mM NaCl, pH 7,5) suspendiert und mit einem Ultra-Turrax (5 kurze Impulse) zur Zerstörung von Klumpen behandelt. Die Suspension wurde danach 3-mal durch eine Manton-Gaulin Presse bei 6.000 psi geführt. Zuletzt wurde die Presse mit 300 ml Lyse-Puffer gespült. Zur homogenisierten Suspension

wurde langsam eine 5%ige Lösung PEI (Polyethylenimin, Molekulargewicht 30.000-40.000), das mit 5 N HCl auf pH8 eingestellt worden war, bis zu einer Endkonzentration von 0,5% PEI, hinzugefügt. Nach 30-minütigem Rühren in einem Eisbad wurde die Lösung bei 9.000 g, 60 min. und 4°C unter Verwendung einer Beckmann J2-21 Zentrifuge geklärt (roher Extrakt).

b) Chromatographie an Silica

Silica Catalyst Carrier, Grade 953W (Grace GmbH, Worms, BRD) wurde in destilliertem Wasser geklärt und in eine Chromatographiesäule von 5 cm

Durchmesser und 20 cm Höhe gefüllt. Nach

Äquilibrierung mit Lys-Puffer wurde der rohe Extrakt auf die Säule aufgetragen und mit 3 l Lys-Puffer gewaschen. VAC-B wurde mit einem Lineargradienten von Tetraethylammoniumchlorid in Lys-Puffer (0-1 M in 200 ml Puffer) eluiert. Fraktionen des Eluats wurden durch SDS-PAGE auf VAC-B unter Verwendung von Referenz-Material kontrolliert. VAC-B enthaltende Fraktionen wurden gesammelt.

c) Chromatographie an DEAE-SEPHAROSE FAST FLOW

Die gesammelten Silica-Fraktionen wurden gegen 20 mM TRIS/HCl pH 8,4 dialysiert und auf eine 175 ml DEAE-FF-Sepharose-Kolonne (26 x 330 mm, Pharmacia), die mit 20 mM TRIS/HCl pH 8,4 equilibriert worden war, aufgetragen. Die Kolonne wurde mit 500 ml Pufferlösung gewaschen und VAC-β mit einem

Gradienten von 0-500 mM NaCl in 875 ml Pufferlösung (5 Kolonnen Volumen) eluiert. Das Eluat wurde bei 280 nm kontrolliert und durch SDS-PAGE, unter Verwendung eines Referenz-Materials analysiert. VAC-B enthaltende Fraktionen wurden gesammelt und unter Verwendung einer AMICON Ultrafiltrationszelle und eines PM 10-Typ Ultrafilters konzentriert.

d) Chromatographie an Sephacryl S-200 "High Resolution"

Eine Pharmacia K 26/100 Kolonne (500 ml) wurde mit Sephacryl S-200 HR (Pharmacia) beladen und mit 20 mM Bis-TRIS/HCl + 100 mM NaCl pH 8,4 bei einer Durchflußrate von 120 ml/Stunde equilibriert. 4 ml Aliquots des konzentrierten DEAE-FF-Sepharose-Pools wurden auf die Säule aufgetragen und die Durchflußrate auf 60-80 ml/Stunde reduziert. Das Eluat wurde bei 280 nm überwacht. Der VAC-ß repräsentierende Peak war der einzige Peak des UV-Profils. Er wurde gesammelt, wobei hochmolekulare Verunreinigungen, die ebenfalls im UV-Profil detektierbar waren verworfen wurden. Das gereinigte VAC-ß wurde durch SDS-PAGE analysiert und bei -20°C aufbewahrt.

Tabelle: Reinigung von rekombinantem VAC-B

Ausgangsmaterial: 100 g gefrorener Zellkuchen

	Volumen(n	nl) mg Protein/ml ^{x)}	mg total
ROHEXTRAKT	810	16,1	13.040
SILICA DURCHFLUSS	2270	0,35	795
VAC-beta SILICA POOL	380	5,0	1.900
VAC-beta DEAE-FF-POOL	120	2,6	312
DEAE-FF-POOL KONZENTRAT	4	58	232
VAC-beta SEPHACRYL-POOL	33,5	2,2	74
			•

Protein bestimmt durch BIO-RAD Protein Assay (Standard: bovine serum albumin)

Beispiel 13

Analytik und Charakterisierung von VAC-beta

Als In Process Kontrolle zwischen den einzelnen Reinigungsschritten wurde die SDS-Gelelektrophorese verwendet. Die genaue Durchführung dieser Analyse erfolgte gleich wie bei den Endkontrollen und ist dort beschrieben. Eine Serie der während einer Reinigung erhaltenen SDS-Gele ist im Beispiel 12 (Reinigung von VAC-beta) enthalten.

Als Endkontrollen und zur Charakterisierung des gereinigten Proteins wurden die folgenden Methoden verwendet:

- a) Gelpermeations-HPLC
- b) Reverse Phase HPLC
- c) Aminosäureanalyse
- d) N-terminale Sequenzierung
- e) SDS-Gelelektrophorese
- f) Isoelektrische Fokussierung
- a) Gelpermeations-HPLC

Säule: Waters, Protein Pak I 125, 2 x (7,8 x 300

mm), 10 µm Teilchendurchmesser,

Raumtemperatur

Eluens: $0.5 \text{ M Na}_2\text{SO}_4$, $0.02 \text{ M NaH}_2 \text{ PO}_4$, pH

7,0, 0,04% Tween 20, 25% Propylenglykol

FluBrate: 0,5 ml/min

Detektion: UV-Absorption, 214 nm, 0,5 AUFS

Das Chromatogramm (Fig. 40) von gereinigtem VAC-beta zeigt den Hauptpeak des VAC-beta Monomeren bei einem Molekulargewicht von 29.000, daneben ist eine geringe Menge dimeres VAC-beta (M etwa 50.000) nachweisbar. Diese Werte für das Molekulargewicht liegen relativ weit unterhalb des erwarteten Wertes (M 37.000), was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, daß die hier verwendete Gelpermeations-Säule nach der Molekülgröße bzw. -gestalt trennt und nicht nach dem Molekulargewicht

b) Reverse Phase HPLC

Säule: Bakerbond WP C₁₈, 4,6 x 250 mm, 5 µm
Teilchendurchmesser, 30 nm Porendurchmesser, Raumtemperatur

Eluens A: 0,1% Trifluoressigsäure in Wasser

Eluens B: 0,1% Trifluoressigsäure in Acetonitril

Gradient: 20% B für 2 min, 20 - 68% B in 24 min,

68% B für 10 min, 68 - 20% B in 1 min .

FluBrate: 1 ml/min

Detektion: UV-Absorption, 214 nm, 0,5 AUFS

Das Chromatogramm (Fig. 41) stammt direkt aus dem Eluat der letzten Reinigungsstufe und zeigt hauptsächlich den Peak des oxidierten VAC-beta (2 Disulfidbrücken, t_R = 26,6 min). Daneben sind etwa 9% reduziertes VAC ß (t_R =27,4 min) sowie einige kleinere Peaks von restlichen Verunreinigungen nachweisbar.

Das Chromatogramm (Fig. 42) zeigt dieselbe VAC-beta Probe nach 2 Stunden Inkubation in 3 M Harnstoff, 0,05 M Dithiotreitol. Das Protein liegt hauptsächlich in der reduzierten Form ($r_p = 27,4$ min) vor.

c) Aminosäureanalyse

Gereinigtes VAC-beta wurde über Reverse Phase HPLC (Methode siehe unter b) entsalzt. Der Hauptpeak von VAC-beta wurde in einem Hydrolyseröhrchen gesammelt und getrocknet.

Die Hydrolyse erfolgte mit 6 N Salzsäure (mit 1% Phenol) in der Gasphase (110°C, 22 Stunden).

Die Bestimmung der Aminosäuren erfolgte mit einem Aminosäureanalysator ((Typ 6300, Fa. Beckman) über eine Nachsäulenderivatisierung mit Ninhydrin.

Die Aminosäureanalyse (Fig. 43) einer VAC-beta Probe weist eine Gesamtabweichung gegenüber der theoretischen Zusammensetzung von 6.56% auf.

d) N-terminale Sequenzierung

Gereinigtes VAC-beta wurde über Reverse Phase HPLC (Methode siehe unter b) entsalzt. Der Hauptpeak von VAC-beta wurde gesammelt und getrocknet.

Der Rückstand wurde in 75 µl 0,1% Trifluoressigsäure gelöst und direkt für die Sequenzierung verwendet.

Die Sequenzierung erfolgte mit einem Gasphasensequenator der Fa. Applied Biosystems (Modell 470 A9) mit dem Programm 39apth.

Mit einer Ausgangsmenge von etwa 1 nM konnte bis zur 39. Aminosäure sequenziert werden. Es wurde 100%ige Übereinstimmung mit der erwarteten Sequenz gefunden. N-terminales Methionin wurde offensichtlich zu 100% abgespalten. (Fig. 44)

ě

e) SDS-Gelelektrophorese

Die SDS-Gelelektrophoresen wurden weitgehend nach der Originalvorschrift von U.K. Lämmli durchgeführt. Für in Process Kontrollen wurden VAC-beta-Proben vor dem Auftragen mit Dithiothreitol versetzt und aufgekocht. Endkontrollen erfolgten sowohl unter reduzierenden als auch unter nicht reduzierenden Bedingungen. Die Färbung der Gele erfolgte mit Coomassie Blue.

Fig. 45 zeigt ein SDS-Gel von VAC-beta Proben.

Spur 1 und 10: Molekulargewichtsmarker

Spur 2 und 3: In Process Probe von VAC-beta mit und

ohne DTT (Dithiothreitol)

Spur 4 und 6: 10 µg VAC-beta nicht reduziert

Spur 5 und 7: 10 μg VAC-beta mit DTT reduziert

Spur 8 und 9: 1 µg VAC-beta nicht reduziert

VAC-beta ohne Reduktionsmittel ist als Doppelbande nachweisbar. Die intensivere untere Bande bei M etwa 36.000 ist die oxidierte Form, die obere Bande bei M etwa 38.000 die reduzierte Form von VAC-beta. Die mengenmäßige Verteilung der beiden Formen ist besser aus den Spuren 8 und 9 ersichtlich.

Nach Zugabe von DTT als Reduktionsmittel ist daher nur mehr die obere Bande sichtbar (siehe Spur 3, 5 und 7). Da die Spuren 4 bis 7 Stark überladen sind, sind neben den VAC-beta Banden auch einige Banden von restlichen Verunreinigungen sichtbar.

f) Isoelektrische Fokussierung

Die Färbung erfolgte mit Coomassie Blue.

Die isoelektrische Fokussierung Fig. 46 (3.3.1988/51) von weitgehend gereinigtem VAC-ß zeigt, daß VAC-ß direkt aus der letzten Reinigungsstufe (Spur 2 und 3) zwei Hauptbanden bei pH 5,35 bzw. 5,45 ergibt. Der isoelektrische Punkt (pI) von VAC-ß ist damit deutlich basischer als der von VAC- α (pI=4,9), was denErwartungen entspricht, da VAC-ß weniger saure Aminosäuren enthält.

Nach der Reduktion mit Dithiothreitol (Spur 4 und 5) ist die Hauptbande bei pH 5,45 stark angereichert. Diese stellt offensichtlich die reduzierte Form von VAC-8 dar.

Beispiel 14

Biologische Aktivitäten von VAC-α und VAC-β

1. Effekt von VAC- α und VAC- β auf die Prothrombinase Aktivität.

Der Prothrombinase Komplex wurde aus gereinigten bovinen Koagulationsfaktoren und Phospholipiden rekonstituiert. Er bestand aus 0,3 nM Faktor Xa, 0,6 nM Faktor Va, 1 µM Prothrombin, 2 µM Phospholipid Vesikeln (25% Dioleoyl-phosphatidyl-serin, 75 % Dioleoyl-phosphatidylcholin) und 3 mM CaCl₂.

Prothrombin Aktivierung wurde folgendermaßen gemessen: Faktor Xa, Va, Phospholipide, Ca⁺⁺ und variierende Mengen VAC wurden zwei Minuten bei 37°C inkubiert. Die Aktivierung des Prothrombin wurde durch dessen Zugabe gestartet. Zu verschiedenen Zeiten wurden Proben der Mischung in folgendem Puffer aufgenommen:

50 mM TRIS/HCl, 175 mM NaCl, 0,5 mg/ml BSA, 20 mM EDTA und 0,23 mM S2238. Amidolytische Aktivität wurde bei 405 nm verfolgt. Aus einer Standardkurve, die mit bekannten Mengen Thrombin erstellt worden war, wurde anschließend die Menge an aktiviertem Prothrombin bestimmt. Fig. 47 gibt das Ergebnis wieder.

2. Phospholipase Inhibitor Aktivitäten von VAC

E.coli wurde metabolisch mit ³H-Ölsäure markiert und weiterbehandelt wie beschrieben (Davidson, F.F. et al. (1987) J. Biol. Chem. 262, 1690-1705). Die E.coli Membran Präparation enthielt 198 µM Phospholipide mit einer spezifischen Aktivität von 1,2 x 104 cpm/nMol Phospholipid. Diese Membran Präparation diente als Phospholipasesubstrate in dem Assay, der wie folgt durchgeführt wurde: 103 μl 0,1 M TRIS/HCl, pH 8,0, unterschiedliche Mengen an VAC und Ca++ enthaltend und 10 µl E.coli Membranen wurden bei Raumtemperatur inkubiert. Zum Zeitpunkt 0 wurden 10 μ l 0,1 M TRIS/HCl, pH 8,0, 2 ng bovine Pankreas Phospholipan A_2 enthaltend zugegeben. Nach zwei Minuten wurde die Reaktion durch Zugabe von 50 µl 2N HCl und 50 μ l 0,1 M TRIS/HCl pH 8,0, das 100 ng/ml BSA enthielt, gestoppt. Die Mischung wurde bei 14.000 rpm fünf Minuten zentrifugiert. Die Menge an freigesetzter ³H-Ölsäure wurde durch Szintillationszählung des Überstandes bestimmt. Prozent Inhibition der Phospholipase A2 Aktivität wurde folgendermaßen berechnet :

100%-[(cpm_{pla+vac}-cpm_{blank})/(cpm_{pla}-cpm_{blanc})]*100%

Hierbei bedeutet $\operatorname{cpm}_{\operatorname{pla+VAC}}$, $\operatorname{cpm}_{\operatorname{pla}}$ und $\operatorname{cpm}_{\operatorname{blank}}$ die cpm, die in den Überständen der Mischungen, entweder Phospholipase A_2 und VAC, Phospholipase A_2 oder VAC enthaltend, gemessen wurden. Die Ergebnisse finden sich in den Figuren 48, 49, 50 und 51.

Beispiel 15

Herstellung von monoklonalen Antikörpern gegen $VAC-\alpha$

1. Kopplung von VAC- α an "keyhole limpet" - Hämocyanin (KLH)

VAC-α wurde folgendermaßen kovalent an "keyhole limpet" - Hämocyanin (KLH; SIGMA chemical company, St. Louis, USA, Katalog-Nummer H-2133) gekoppelt.

- 1.1 VAC-α/KLH Präparation 1:
 - 0,51 mg VAC-α wurden in 1,5 ml isotoner phosphat-gepufferter Natriumchlorid-Lösung pH 7,2 (im folgenden "PGS" abgekürzt) gelöst und mit 0,12 ml einer KLH-Lösung (8 mg/ml in PGS) gemischt. 0,017 ml einer 25%igen Glutardialdehydlösung wurden hinzugefügt und das Gemisch 45 Minuten lang bei Raumtemperatur inkubiert. Danach wurde über Nacht gegen 1 l PGS dialysiert. Portionen dieser Lösung wurden bei -20°C gelagert.
- 1.2 VAC-α/KLH Präparation 2:
 2,54 mg VAC-α wurden in 2 ml 0,1 M
 Kaliumphosphat-Puffer pH 7,0 gelöst und mit 0,3 ml
 KLH-Lösung (siehe 1.1) gemischt. 0,023 ml einer

25%igen Glutardialdehyd-Lösung wurden hinzugefügt und das Gemisch 45 Minuten lang bei Raumtemperatur inkubiert. Danach wurde über Nacht gegen 1 1 PGS (siehe 1.1) dialysiert. Portionen dieser Lösungen wurden bei -20°C gelagert.

2. Immunisierung

Eine 10 Wochen alte weibliche Balb/c-Maus wurde folgendermaßen immunisiert:

Immunisierung	Tag	VAC-α/KLH Präparation	Adjuvans
1	1	1 (0.15 ml)	komplett
2	24	1 (0.15 ml)	inkomplett
3	49	1 (0.15 ml)	inkomplett
4	188	2 (O.1 ml)	inkomplett
5	225	2 (O.1 ml)	inkomplett
. 6	258	2 (O.1 ml)	inkomplett
7	265	2 (O.1 ml)	inkomplett
8	271	2 (O.1 ml)	inkomplett
9	272	2 (0.1 ml)	inkomplett
10	273	2 (0.1 ml)	kein

Alle Immunsierungen, ausgenommen die letzte, erfolgten durch intraperitoneale Injektion einer Emulsion gleicher Volumina von Antigen-Lösung und Freund'schem Adjuvans.

3. Zellfusion und Hybridom-Selektion

Peritoneale Zellen wurden aus Balb/c Mäusen durch Spülen mit einer sterilen Saccharose-Lösung (110 g/l in deionisiertem Wasser) gewonnen, durch Zentrifugation gesammelt und in Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium mit Natrium-Penicillin G (100 Einheiten/ml) und Streptomycin (50 Einheiten/ml) (im folgenden "Kulturmedium genannt) mit 10% fötalem Kalbsserum in einer Zelldichte von etwa 3.5 x 10⁴ Zellen/ml suspendiert. O.1 ml - Aliquots wurden in die Vertiefungen von Gewebekulturplatten (96 Vertiefungen pro Platte) pipettiert; die Platten wurden über Nacht inkubiert.

Einen Tag nach der letzten Immunisierung wurde die Maus in Äther anästhesiert und getötet. Die Milz wurde aseptisch entnommen und die Milzzellen wurden durch vorsichtiges Schaben auf einem Stahlgitter gewonnen. Die Zellen wurden in 10 ml Kulturmedium suspendiert und durch Zentrifugation gesammelt.

P3x63Ag8,653 Maus-Myelomzellen (Kerney et al., J. Immunol. 123, 1548, 1979) wurden in stationärer Suspensionskultur in Kulturmedium mit 10% fötalem Kalbsserum gezüchtet. Etwa 10⁸ Zellen wurden durch Zentrifugation gesammelt. Die Myelomzellen wurden zu den Milzzellen zugegeben; die gemischte Zellpopulation wurde neuerlich durch Zentrifugation gesammelt und in 3 ml einer sterilen Lösung von 40% Polyäthylenglycol 4000 (Merck, Darmstadt BRD, Katalognummer 9727) in Kulturmedium suspendiert. Die Suspension wurde 1,5 Minuten bei Raumtemperatur vorsichtig geschüttelt und anschließend 1 Minute stehen gelassen. 3 ml Kulturmedium wurden unter ständigem Schütteln über einen Zeitraum von 1,5 Minuten zugetropft, die Suspension dann eine Minute stehengelassen. Anschließend wurden weitere 6 ml Kulturmedium unter Schütteln über 1,5 Minuten zugetropft und 1 Minute stehen gelassen. Die Suspension wurde in der Folge unter Schütteln mit 12 ml Kulturmedium mit 10% fötalem Kalbsserum tropfenweise während drei Minuten verdünnt, dann 15 Minuten bei Raumtemperatur stehen gelassen. Die Zellen wurden durch Zentrifugation gesammelt und in 150 ml Kulturmedium mit 20% fötalem Kalbsserum, Thymidin (1,6 x 10⁻⁵M), Hypoxanthin (10⁻⁴ M) und Aminopterin (4 x 10⁻⁷) (in der Folge "HAT-Medium" genannt) suspendiert. Je 0,1 ml dieser Suspension wurden in die Vertiefungen einer Zellkultur-Platte pipettiert, in die am Vortag peritoneale Zellen eingesetzt worden waren (siehe oben); die Platten wurden drei Tage inkubiert. 0,075 ml HAT-Medium wurden zugegeben, anschließend wurden die Kulturen weitere 8 Tage inkubiert. Alle Inkubationen der Zellkulturen wurden bei 37°C in einer wasserdampf-gesättigten Atmosphäre von 5% CO₂ in Luft ausgeführt.

3. Screening nach Hybridomen, die Antikörper gegen VAC-α produzieren

Das Screening wurde mit Hilfe eines Enzym-Immuntest durchgeführt. Die Vertiefungen einer für Enzym-Immuntests geeigneten Mikrotiter-Platte wurden mit VAC- α beschichtet (0,005 mg/ml in 0,1 M Natriumkarbonat-Puffer pH 9,6; über Nacht bei 2-8°C oder eine Stunde bei 37°C). Die Lösung-wurde entfernt und ie Platten wurden einmal mit deionisiertem Wasser gewaschen. Freie Protein-Bindungsstellen wurden mit einer Lösung von Rinderserum-Albumin (5µ/ml in isotoner phosphat-gepufferter Kochsalzlösung pH 7,2 [PGS]) eine Stunde bei Raumtemperatur blockiert, anschließend einmal mit Wasser gewaschen. In jede Vertiefung wurden 0,1 ml Hybridom-Überstand zugegeben und 2-3 Stunden bei Raumtemperatur inkubiert. Anschließend wurden die Überstände entfernt, die Vertiefungen wurden dreimal mit Wasser gewaschen.

0,05 ml einer Lösung von mit Meerrettich-Peroxidase konjugierten Kaninchen-Antikörpern gegen Maus-Immunglobuline (Dakopatts, Kopenhagen, Dänemark, Katalognummer P161; 1:2000 in PGS mit 5 mg/ml Rinderserumalbumin wurden zugegeben und drei Stunden bei Raumtemperatur inkubiert, anschließend dreimal mit Wasser gewaschen. 0,1 ml einer frisch hergestellten Mischung gleicher Volumina von Lösungen von ortho-Phenylendiamin (8,65 mg/ml in 0,1 M Kaliumzitrat pH 5), Natrium Perborat (3,75 mg/ml in 0,1 M Kaliumzitrat pH 5) und Wasser wurden zugegeben. Nach 30 Minuten Inkubation bei Raumtemperatur wurden 0,1 ml 4 N H₂SO₄ zugegeben. Die optische Dichte der Lösungen wurde in einem Mehrkanal-Photometer für Mikrotiter-Platten bei 492 nm bestimmt. Zellkultur-Medium mit 20% fötalem Kalbsserum wurde als negative Kontrolle, Serum der immunisierten Maus (in PGS mit 5 mg/ml Rinderserumalbumin verdünnt) als positive Kontrolle verwendet. Kulturüberstände aller Hybridom-Kulturen wurden in zwei unabhängigen Tests ll bzw. 13 Tage nach der Zellfusion getestet. Kulturen, die in beiden Tests ein positives Signal gaben, wurden in weiteren Screening-Test untersucht, in denen sowohl unbeschichtete als auch mit VAC-a beschichtete Testplatten eingesetzt wurden. Zwei der Kulturen gaben wiederholt positive Ergebnisse mit beschichteten, nicht aber mit unbeschichteten Platten. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefaßt:

** • • • • • • • • • • •

	Exper	iment 1	Experiment 2				
bes	chichtet unb	eschichtet	beschichtet · unbe	schichtet			
Mausserum 1: 100	0,291	0,152	1,735	0,475			
Hybridom VAA-8	1,061	0,102	1,169 .	0,108			
Hybridom VAA-9	0,552	0,187	0,387	0,109			
Negative Kontrolle	0,032	0,031	0,071	0,055			

147

Beispiel 16:

Herstellung der Expressionsvektoren pRH281/n und pRH281/nT (n=5,6,7,8,9)

Der in der EPA Nr. 186 098 beschriebene Expressionsvektor pRH100 hat verschiedene Nachteile: a) konstanter und nicht optimaler Abstand zwischen

ribosomaler Bindungsstelle (RBS) und

Translationsstart-ATG

- b) Zwischen RBS und ATG gibt es einige C's und G's
- c) die -35 Region des Serratia marcescens trp Promotors ist verglichen mit der E.coli Sequenz nicht optimal (TTGACT statt TTGACA)

d) die EcoRI-Stelle vor dem Promotor ist überflüssig.

Es wurde ein Satz von Oligonukleotiden mit folgender Sequenz synthetisiert:

:Trp-1-> ::Trp-3->

AATTGACGCTGATGGCTAAAACATTGTGCAAAAAGAGGGTTGACATTGCC CTGCGACTACCGATTTTGTAACACGTTTTTCTCCCCAACTGTAACGG

<-Trp-2::

:-->Transkriptionsstart

::Trp-5->

TTCGCGAACCAGTTAACTAGTACACAAGTTCACGGCTCGAGACGGTAAGG AAGCGCTTGGTCAATTGATCATGTGTTCAAGTGCCGAGCTCTGCCATTCC

<-Trp-4:: --

RBS

SstI ClaI

AGGTTTAATATGAGCTCGAATTCAT TCCAAATTATACTCGAGCTTAAGTAGC

---- <-Trp-6:

RBS Translationsstart-ATG

: n=5 :

Jeweils 100 pMol der Oligonukleotide Trp-2, Trp-3, Trp-4 und Trp- 5 wurden in 10 µl phosphoryliert. Nach der Reaktion wurden äquimolare Mengen (je 100 pMol) Trp-1 und Trp-2, Trp-3 und Trp-4 sowie Trp-5 und Trp-6 vereint, auf 100°C erhitzt und durch langsames Abkühlen hybridisiert. Die Oligonukleotidpaare wurden vereint und in 55 µl ligiert. pAT153 wurde mit EcoRI und ClaI doppelt geschnitten und das große Vektorfragment isoliert. 50 ng pAT153 Fragment wurden mit 20 pMol synthetischer Promotor DNA in 20 µl ligiert. Kompetente E.coli HBlOl wurden mit dem entstandenen

Plasmid transformiert. Von den entstandenen Kolonien wurden einige ausgesucht, die Plasmid DNA isoliert und der Bereich der eingefügten DNA durch Sequenzieren überprüft. Ein Plasmid wurde ausgewählt und mit pRH281/5 bezeichnet, wobei 5 die Zahl der Nukleotide zwischen der RBS und dem Translationsstart- ATG symbolisiert.

Ausgehend von diesem Expressionsvektor wurde das XhoI-SstI Insert durch folgende Oligonukleotidpaare wie oben beschrieben ersetzt:

a)	TCGAGACGGTAAGGAGGTTTAAATATGAGCT	Trp-9
	CTGCCATTCCTCCAAATTTATAC	Trp-10
		. Trp-11
b)	TCGAGACGGTAAGGAGGTTTAAATAATGAGCT	. ILD-II
	CTGCCATTCCTCCAAATTTATTAC	Trp-12
c)	TCGAGACGGTAAGGAGGTTTAAAATAATGAGCT	Trp-13
	CTGCCATTCCTCCAAATTTTATTAC	Trp-14
• •	TCGAGACGGTAAGGAGGTTTAAAAATAATGAGCT	Trp-15
d)		•
	CTGCCATTCCTCCAAATTTTTATTAC	Trp-16

Die resultierenden Expressionvektoren wurden pRH281/6, pRH281/7, pRH281/8 und pRH281/9 benannt.

Diese neuen Expressionsvektoren weisen folgende Eigenschaften auf:

- a) die originale EcoRI-Stelle von pAT153 wurde zerstört.
- b) die -35 Region des Serratia marcescens Promotors ist jener des trp-Promotors aus E.coli angepaßt.
- c) vor der artifiziellen ribosomalen Bindungsstelle befindet sich eine singuläre XhoI-Stelle, die das Einbringen einer anderen RBS erlaubt.

- d) Das G des Tanslationsstart-ATG ist die erste Base einer SstI (=SacI) Stelle. Durch Schnitt nit SstI und anschließendem Abbau des 3' Überhanges entsteht ein gerades Ende, an das eine beliebige cDNA oder ein Gen ligiert werden kann. Beginnt diese DNA mit der ersten Base des zu translatierenden Bereichs, erfolgt eine korrekte Transkription und Translation in E.coli.
- e) 3'seitig dieser SstI Stelle befinden sich eine singuläre EcoRI, ClaI und HindIII Stelle, die für ein gerichtetes Klonieren einer zu exprimierenden DNA verwendet werden kann. Außerdem können auch die singulären Schnittstellen im Tetracyclin Resistenzgen zu diesem Zweck gebraucht werden.
- f) Die Variation /5 bis /9 erlaubt, den optimalen Abstand zwischen RBS und ATG für das jeweilige Gen zu bestimmen.

Manchmal ist es für eine optimale Expression und für die Stabilität des Plasmides nötig, hinter das exprimierte Gen einen Transkriptionsterminator zu setzen (R.Gentz et al., Proc.Natl.Acad.Sci.USA 78 (1981), 4936-4940). Das HindIII-SalI Fragment des pRH281/5 wurde durch Doppelverdau herausgeschnitten. Das fehlende Stück wurde durch ein den phoA Transkriptionsterminator (H.Shuttleworth et al., Nucl.Acids Res. 14 (1986), 8689; C.N.Chang et al., Gene 44 (1986), 121-125) enthaltendes Oligonukleotidpaar ersetzt:

:EBI-456->

AGCTTGGATCCGTCGACCGCCCGGCAGTGAATTTTCGCTGCCGGGTGG
ACCTAGGCAGCTGGCGGGGCCGTCACTTAAAAGCGACGGCCCACC

:--------BamHI ----HindIII SalI

TTTTTTTGCTGC AAAAAAACGACGAGCT

<-EBI-459:

10 pMol des hybridisierten Oligonukleotidpaares wurden mit 100 ng HindIII-SalI doppelt geschnittenen pRH281/5 Vektorteil in 20 µl ligiert. Nach Transformation von E.coli HB101, Isolierung der Plasmid-DNA einiger Kolonien und deren Sequenzüberprüfung wurde ein Plasmid ausgewählt und mit pRH281/5T bezeichnet.

In analoger Weise wie oben beschrieben wurde aus diesem Plasmid die Reihe pRH281/6T, pRH281/7T, pRH281/8T und pRH281/9T unter Verwendung der Oligonukleotide Trp-9 bis Trp-16 hergestellt.

Beispiel 17:

Mutanten des VAC-alpha

Folgende Mutationen wurden an der VAC-alpha DNA durchgeführt (die Aminosäurenummerierung und die Basennummerierungen beziehen sich auf die Figur 4):

a) Verkleinerung des VAC-Moleküls: VAC-alpha besitzt eine vierfach repetierte 67/68 Aminosäuren lange Sequenz mit einer singulären N-terminalen Extension (Fig.6). Drei verkürzte Formen wurden hergestellt: i) Deletion der Aminosäuren 2 bis 18: Eliminierung der singulären N-terminalen Extension, Met-l sitzt vor Ala-19.

- ii) Deletion der dritten und vierten Repeat: das Arg-161 Codon wurde zu einem Stopcodon mutiert.
 iii) Deletion der N-terminalen singulären Extension, sowie der ersten und zweiten Repeat. Met-1 sitzt vor Ala-165.
- b) Ein möglicher Angriffspunkt beim proteolytischen Abbau des VAC-alpha stellt vielleicht das Arg-161 dar. Diese Aminosäure wurde daher mutiert:
- i) Arg-161 zu Glu-161
- ii) Arg-161 zu Gln-161.
- c) Durch Einbau einer Faktor Xa-Schnittstelle zwischen der zweiten und dritten Repeat kann vielleicht ein der Inhibition der Koagulationskaskade entkommender Faktor Xa an VAC gebunden werden und/oder dieses sogar in zwei funktionelle Hälften zerlegen, und so die Wirksamkeit von VAC-alpha erhöhen. Es wurde daher folgende Mutation durchgeführt: Asp-168 zu Glu-168, Glu-169 zu Gly-169 und Ala-170 zu Arg-170. Daraus ergibt sich die Faktor Xa Erkennungssequenz Ile-Glu-Gly-Arg.
- d) Um die Frage der Wichtigkeit des Cysteins-316 für die biologische Wirksamkeit zu beantworten, und zugleich seine Beteiligung an der Dimerenbildung zu überprüfen, wurde
- i) Cys-316 zu Ser-316 und
- ii) Cys-316 zu Val-316 mutiert.
- e) Um den Einfluß der N-terminalen Extension zu studieren, wurde diese Extension (Ala-2 bis Ala-19) ersetzt durch die jeweiligen N-Termini aus Lipocortin I, Calpactin I und VAC-beta.

Als erster Schritt wurde aus dem Expressionsvektor pRH291 der Expressionsvektor pGN10 hergestellt. Dieser Expressionsvektor besitzt die Phagen Lambda cII RBS an Stelle der in pRH291 verwendeten STII-RBS. pRH291 wurde mit XhoI und KpnI doppelt geschnitten. Das große Fragment wurde isoliert. 40 pMol des Oligonukleotidpaars EBI-725/EBI-727 mit folgender Sequenz:

EBI-725 TCGAGTTATCTAAGGAAATACTTACATATGGCACAGGTTCTCAGAGGTAC
EBI-727 CAATAGATTCCTTTATGAATGTATACCGTGTCCAAGAGTCTC
XhoI RBS ATG KpnI

wurden in 6 µl hybridisiert und anschließend mit ca. 200 ng pRH291/großes Fragment in 20 µl Lösung ligiert. Kompetente E.coli HB101 wurden transformiert. Von den entstandenen Ampicillin- resistenten Kolonien wurden die Plasmide einiger Klone isoliert und die Sequenz des neuen Stücks DNA überprüft. Ein Klon wurde ausgewählt und mit pGN10 bezeichnet.

Als Vorbereitung für die Mutagenesereaktionen wurde aus pGN10 das PvuII-SphI Fragment isoliert. PvuII schneidet im phoA Promotor Teil, SphI in der nicht translatierten Region der VAC-alpha cDNA. Das die VAC-alpha cDNA enthaltende Fragment wurde gereinigt und in die SmaI/SphI doppelt geschnittene Doppelstrangform des M13mpl8 kloniert. Von den entstandenen Plaques nach Transformation von E.coli JM101 wurde eine ausgewählt, und die M13/VAC-alpha Einzelstrang DNA in größerem Maßstab präpariert.

Die Mutationsreaktionen wurden mit Hilfe des "Oligonucleotide- directed in vitro mutagenesis system" (Amersham, code RPN.2322) unter genauer Einhaltung des beigefügten Protokolls durchgeführt.

Nach der Sequenzüberprüfung der enstandenen Mutanten wurde die entsprechende Doppelstrangform der rekombinanten M13mp8/VAC-alpha Phagen-DNA in Form einer Plasmid Minipräparation isoliert. Mit Ausnahme der Mutation mit EBI-977 (ClaI-Stelle auf Nt.105-110) wurden diese DNAs mit XhoI und SphI doppelt geschnitten, und das die VAC-cDNA enthaltende Fragment isoliert. Ca. 50 ng dieses Fragments wurden mit 50 ng XhoI-SphI doppelt geschnittenem pRH281/5 Vektorteil in 10 ul Lösung ligiert und das entstandene Plasmid in kompetente E.coli HB101 transformiert. Die Plasmide einiger resultierender Kolonien wurden isoliert und durch Restriktionsenzymverdau auf die Richtigkeit der Konstruktion überprüft. Außerdem wurde die letztendlich ausgewählte Kolonie im Labormaßstab fermentiert, und die Proteine des Bakteriums einer Westernblotanalyse unter Verwendung des Rabbit-anti-VAC- Antiserums unterzogen.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die hergestellten Mutanten:

Mutations- Oligo	resultierender Expressionsvektor	Eigenschaften des neuen Klons
EBI-1051	pGN42	Deletion von Ala-2 bis Arg-18
EBI-964	pGN29	Translationsstop auf 161 (Deletion von Arg-161 bis Asp-320)
EBI-1105	pGN43	Deletion von Ala-2 bis Asp-164

EBI-1103	pGN44	Arg-161 zu Gln-161
EBI-1104	pGN45	Arg-161 zu Glu-161
EBI-960	pGN30	Faktor Xa-Schnittstelle auf 167 bis 170
EBI-961	pGN41	Cys-316 zu Ser-316
EBI-959	pGN46	Cys-316 zu Val-316
EBI-977	pGN31	ClaI-Stelle auf Nt.105 bis 110

Die Sequenzen der Mutationsoligos sind (5'-->3'):

EBI-1051:	CCGAAGAGTTTCTGCATCAGCCATATGTAAGTATTTCCTTAG
EBI-964:	AATTCCAGCATCAGGGTCTTAGTTAGCCTGAAGGAGAAC
EBI-1105:	AGCTTCATCAATTCCAGCCATATGTAAGTATTTCC
EBI-1103:	AATTCCAGCATCAGGGTCCTGGTTAGCCTGAAGGAGAAC
EBI-1104:	AATTCCAGCATCAGGGTCTTCGTTAGCCTGAAGGAGAAC .
EBI-960:	GCCTGAGCATCTTGTTCAACTTGACGACCTTCAATTCCAGCA
	TCAGGGTCTCTG
EBI-961:	CGTTAGTCATCTTCTCCTGAGAGCAGCAGAAGAGC
EBI-959:	CGTTAGTCATCTTCTCCCACGAGCAGCAGAAGAGC
EBI-977:	CAACAGAGTCAGGATCGATTCCTCATCTGTGCCC
EBI-1104: EBI-960: EBI-961: EBI-959:	AATTCCAGCATCAGGGTCTTCGTTAGCCTGAAGGAGAAC GCCTGAGCATCTTGTTCAACTTGACGACCTTCAATTCCAGCA TCAGGGTCTCTG CGTTAGTCATCTTCTCCTGAGAGCAGCAGAAGAGC CGTTAGTCATCTTCTCCCACGAGCAGCAGAAGAGC

Die angegebenen Sequenzen sind komplemetär zu der DNA-Sequenz in Figur 4, was durch die Klonierung der VAC-alpha cDNA in den Ml3mpl8 bedingt ist.

Die mutierte DNA mit der ClaI-Stelle auf Nt.105 bis 110 wurde mittels EcoRI-HindIII Doppelverdau aus der Doppelstrangform des rekombinanten M13mpl8 freigesetzt, isoliert und in EcoRI-HindIII doppelt geschnittenen Bluescribe M13+ (Stratagene, La Jolla, Kalifornien, USA) kloniert. Das entstandene Plasmid wurde pGN31

genannt. pGN31 wurde mit ClaI und XhoI doppelt geschnitten, und das große Fragment isoliert. Durch Einsatz verschiedener Oligonukleotidpaare wurde der für Lipocortin I (K.-S. Huang et al. Cell 46 (1986), 191-199), Calpactin I (=Lipocortin II, K.-S. Huang et al. Cell 46 (1986), 191-199) und VAC-beta spezifische N- Terminus eingefügt:

a) Lipocortin I-spezifischer N-Terminus

:EBI-972-> :Start Lipocortin

TCGAGAGGTTGAGGTGATTTTATGGCAATGGTATCAGAATTCCTCAAGCA

CTCCAACTCCACTAAAATACCGTTACCATAGTCTTAAGGAGTTCGT

GGCCTGGTTTATTGAAAATGAAGAGCAGGAATATGTTCAAACTGTGAAGT CCGGACCAAATAACTTTTACTTCTCGTCCTTATACAAGTTTGACACTTCA

::EBI-977->

CATCCAAAGGTGGTCCCGGATCAGCGGTGAGCCCCTATCCTACCTTCAAT
GTAGGTTTCCACCAGGGCCTAGTCGCCACTCGGGGATAGGATGGAAGTTA

<-EBI-988::

:Fortsetzung VAC-alpha
CCATCCTCGGATGCAGAAACTCTTCGGAAGGCTATGAAAGGCTTGGGCAC
GGTAGGAGCCTACGTCTTTGAGAAGCCTTCCGATACTTTCCGAACCCGTG

AGATGAGGAAT
TCTACTCCTTAGC
<-EBI-982:

Je l pMol EBI-978 und EBI-988 wurden gemeinsam in 6 µl phosphoryliert. Die Reaktion wurde durch Erhitzen auf 100°C gestoppt, jeweils l pMol EBI-972 und EBI-982 zugesetzt, die Lösung nochmals auf 100°C erhitzt und

langsam abgekühlt. Die beiden Oligonukleotidpaare wurden durch Zugabe von Ligase miteinander ligiert. Danach wurde ca. 1 µg pGN31 ClaI-XhoI großes Fragment zugesetzt, das Volumen auf 40 µl erweitert und ligiert. Nach der Transformation von kompetenten E.coli JM101 wurden einige Kolonien ausgesucht und deren Plasmide gemäß dem Bluescribe-Protokoll von Stratagene mit Hilfe eines Helperphagen in Einzelstrang-DNA überführt und sequenziert. Eines der richtigen Plasmide wurde ausgewählt und mit pGN32 bezeichnet. Mit XhoI und HindIII (befindet sich hinter der SphI-Stelle in der Multiklonierstelle des Bluescribe M13+) wurde das Insert aus dem Vektor geschnitten und gereinigt. pRH281/5 wurde ebenfalls mit XhoI und HindIII doppelt verdaut und das Vektorfragment isoliert. 200 ng pGN32 Insert und etwa 50 ng pRH281/5-Vektorteil wurden in 20 ul ligiert. Die DNA wurde in E.coli HB101 transformiert, und die Plasmid-DNA einiger Ampicillin-resistenter Klone durch Restriktionsenzymanalyse auf die Richtigkeit der Konstruktion überprüft. Außerdem wurde die letztendlich. ausgewählte Kolonie im Labormaßstab fermentiert, und die Proteine des Bakteriums einer Westernblotanalyse unter Verwendung des Rabbit-anti-VAC- Antiserums unterzogen. Das resultierende Expressionsplasmid für das Lipocortin I/VAC-alpha-Hybrid wurde pGN35 genannt.

b) Calpactin I spezifischer N-Terminus:

:EBI-990-> Start Calpactin

TCGAGAGGTTGAGGTGATTTTATGTCTACTGTTCACGAAATCCTGTGCAA

CTCCAACTCCACTAAAATACAGATGACAAGTGCTTTAGGACACGTT

:

GCTCAGCTTGGAGGGTGATCACTCTACACCCCCAAGTGCATATGGGTCTG CGAGTCGAACCTCCCACTAGTGAGATGTGGGGGTTCACGTATACCCAGAC ::EBI-1001->

:Fortsetzung VAC-alpha

TCAAAGCCTATACTAACTTTGATGCTGAGCGGGATGCAGAAACTCTTCGG
AGTTTCGGATATGATTGAAACTACGACTCGCCCTACGTCTTTGAGAAGCC
EBI-985::

AAGGCTATGAAAGGCTTGGGCACAGATGAGGAAT
TTCCGATACTTTCCGAACCCGTGTCTACTCCTTAGC
<-EBI-994:

Die Herstellung des rekombinanten Bluescribe M13+
Plasmids pGN33, seine Sequenzüberprüfung und das
Umklonieren in den Expressionsvektor pRH281/5 erfolgte
analog zu der für das Lipocortin I - Hybrid
beschriebenen Prozedur. Das resultierende
Expressionsplasmid (Calpactin I/VAC-alpha-Hybrid) wurde
pGN36 genannt.

c) VAC-beta spezifischer N-Terminus:

:EBI-987-> :VAC-beta Start

TCGAGAGGTTGAGGTGATTTATGGCCTGGTGGAAATCCTGGATTGAACA

CTCCAACTCCACTAAAATACCGGACCACCTTTAGGACCTAACTTGT

:VAC-

GGAGGGTGTCACAGTGAAGAGCAGCTCCCACTTCAACCCAGACCCTGATG CCTCCCACAGTGTCACTTCTCGTCGAGGGTGAAGTTGGGTCTGGGACTAC

alpha Fortsetzung
CAGAAACTCTTCGGAAGGCTATGAAAGGCTTGGGCACAGATGAGGAAT
GTCTTTGAGAAGCCTTCCGATACTTTCCGAACCCGTGTCTACTCCTTAGC
<-EBI-989:

Zur Herstellung des rekombinanten BluescribeM13+ Plasmids pGN34 wurde hier nur das Oligonukleotidpaar (je l pMoI in 6 ul) durch Erhitzen und langsames Abkühlen hybridisiert und anschließend wie oben in den KhoI-ClaI doppelt geschnittenen pGN31 Vektor ligiert. Die Herstellung des Expressionsvektors pGN37 (VAC-beta/VAC-alpha-Hybrid in pRH281/5) erfolgte wie oben beschrieben.

Patentansprüche

- DNA, kodierend für ein Polypeptid/Protein mit im wesentlichen den biologischen Eigenschaften der vascular-antikoagulierenden Proteine.
- DNA nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie der Formel 2. ATG GCA CAG GTT CTC AGA GGC ACT GTG ACT GAC TTC CCT GGA TTT GAT GAG CGG GCT GAT GCA XXX ACT CTT CGG AAG GCT ATG AAA GGC TTG GGC ACA GAT GAG GAG AGC ATC CTG ACT CTG TTG ACA TCC CGA AGT AAT GCT CAG CGC CAG GAA ATC TCT GCA GCT TTT AAG ACT CTG TIT GGC AGG GAT CTT CTG GAT GAC CTG AAA TCA GAA CTA ACT GGA AAA TTT GAA AAA TTA ATT GTG GCT CTG ATG AAA CCC TCT CGG CTT TAT GAT GCT TAT GAA CTG AAA CAT GCC TTG AAG GGA GCT GGA ACA AAT GAA AAA GTA CTG ACA GAA ATT ATT GCT TCA AGG ACA CCT GAA GAA CTG AGA GCC ATC AAA CAA GTT TAT GAA GAA GAA TAT GGC TCA AGC CTG GAA GAT GAC GTG GTG GGG GAC ACT TCA GGG TAC TAC CAG CGG ATG TTG GTG GTT CTC CTT CAG GCT AAC AGA GAC CCT GAT GCT GGA ATT GAT GAA GCT CAA GTT GAA CAA GAT GCT CAG GCT TTA TTT CAG GCT GGA GAA CTT AAA TGG GGG ACA GAT GAA GAA AAG TTT ATC

.. - ------

ACC ATC TTT GGA ACA CGA AGT GTG TCT CAT TTG AGA AAG GTG TTT

GAC AAG TAC ATG ACT ATA TCA GGA TTT CAA ATT GAG GAA ACC ATT

GAC CGC GAG ACT TCT GGC AAT TTA GAG CAA CTA CTC CTT GCT GTT

GTA AAA TCT ATT CGA AGG AGT ATA CCT GCC TAC CTT GCA GAG ACC CTC

TAT TAT GCT ATG GTT TCC AGG AGT GAG ATT GAT GAT CAT AAC ATC AGG

AAG GTC ATG GTT AGG AAG AAT TTT GCC ACC TCT CTT TAT TCC ATG ATT

AAG GGA GAT ACA TCT GGG GAC TAT AAG AAA GCT CTT CTG CTC

TGT GGA GAA GAT GAC TAA

entspricht, wobei XXX für GAA oder GAC steht und degenerierte Formen dieser DNA.

 ATG TAT CCG CCA TAC AGA TAC GAA GCC AAG GAG CTG CAT GAC GCC ATG AAG GGC TTA GGA ACC AAG GAG GGT GTC ATC ATT GAG ATC CTG GCC TCT CGG ACC AAG AAC CAG CTG CGG GAG ATA ATG AAG GCG TAT GAG GAA GAC TAT GGG TCC AGC CTG GAG GAG GAC ATC CAA GCA GAC ACA AGT GGC TAC CTG GAG AGG ATC CTG GTG TGC CTC CTG CAG GGC AGC AGG GAT GAT GTG AGC AGC TTT GTG GAC CCG GCA CTG GCC CTC CAA GAC GCA CAG GAT CTG TAT GCG GCA GGC GAG AAG ATT CGT GGG ACT GAT GAG ATG AAA TTC ATC ACC ATC CTG TGC ACG CGC AGT GCC ACT CAC CTG CTG AGA GTG TTT GAA GAG TAT GAG AAA ATT GCC AAC AAG AGC ATT GAG GAC AGC ATC AAG AGT GAG ACC CAT GGC TCA CTG GAG GAG GCC ATG CTC ACT GTG GTG AAA TGC ACC CAA AAC CTC CAC AGC TAC TIT GCA GAG AGA CTC TAC TAT GCC ATG AAG GGA GCA GGG ACG CGT GAT GGG ACC CTG ATA AGA AAC ATC GTT TCA AGG AGC GAG ATT GAC TTA AAT CTT ATC AAA TGT CAC TTC AAG AAG ATG TAC GGC AAG ACC CTC AGC AGC ATG ATC ATG GAA GAC ACC AGC GGC GAC TAC AAG AAC GCC CTG CTG AGC CTG GTG GGC AGC GAC CCC TGA

entspricht und degenerierte Formen dieser DNA.

163

עובוטןטט עוו

4. DNA nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie der Formel ATG GCA CAG GTT CTC AGA GGC ACT GTG ACT GAC TTC CCT GGA TTT GAT GAG CGG GCT GAT GCA XXX ACT CTT CGG AAG GCT ATG AAA GGC TTG GGC ACA GAT GAG GAG AGC ATC CTG ACT CTG TTG ACA TCC CGA AGT AAT GCT CAG CGC CAG GAA ATC TCT GCA GCT TTT AAG ACT CTG TTT GGC AGG GAT CTT CTG GAT GAC CTG AAA TCA GAA CTA ACT GGA AAA TTT GAA AAA TTA ATT GTG GCT CTG ATG AAA CCC TCT CGG CTT TAT GAT GCT TAT GAA CTG AAA CAT GCC TTG AAG GGA GCT GGA ACA AAT GAA AAA GTA CTG ACA GAA ATT ATT GCT TCA AGG ACA CCT GAA GAA CTG AGA GCC ATC AAA CAA GTT TAT GAA GAA GAA TAT GGC TCA AGC CTG GAA GAT GAC GTG GTG GGG GAC ACT TCA GGG TAC TAC CAG CGG ATG TTG GTG GTT CTC CTT CAG GCT AAC AGA

entspricht, wobei gegebenenfalls XXX für GAA oder GAC steht und/oder nach dem letzten AGA ein Stop-Codon steht und degenerierte Formen dieser DNA.

5. DNA nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie der Formel GAC CCT GAT GCT

GGA ATT GAT GAA GCT CAA GTT GAA CAA GAT GCT CAG GCT TTA TTT

CAG GCT GGA GAA CTT AAA TGG GGG ACA GAT GAA GAA AAG TTT ATC

ACC ATC TTT GGA ACA CGA AGT GTG TCT CAT TTG AGA AAG GTG TTT

GAC AAG TAC ATG ACT ATA TCA GGA TTT CAA ATT GAG GAA ACC ATT

GAC CGC GAG ACT TCT GGC AAT TTA GAG CAA CTA CTC CTT GCT GTT

GTG AAA TCT ATT CGA AGT ATA CCT GCC TAC CTT GCA GAG ACC CTC

TAT TAT GCT ATG AAG GGA GCT GGG ACA GAT GAT CAT ACC CTC ATC

AGA GTC ATG GTT TCC AGG AGT GAG ATT GAT CTG TTT AAC ATC AGG

AAG GAG TTT AGG AAG AAT TTT GCC ACC TCT CTT TAT TCC ATG ATT

AAG GGA GAT ACA TCT GGG GAC TAT AAG AAA GCT CTT CTG CTG CTC

entspricht, wobei gegebenenfalls vor dem ersten GAC ein Initiationscodon steht und degenerierte Formen dieser DNA.

 11 - 00,0,0,0

AAG TCT GAG CTC AGT GGC AAG TTT GAG AGG CTC ATT GTG GCC CTT

ATG TAT CCG CCA TAC AGA TAC GAA GCC AAG GAG CTG CAT GAC GCC

ATG AAG GGC TTA GGA ACC AAG GAC GGT GTC ATC ATT GAG ATC CTG

GCC TCT CGG ACC AAG AAC CAG CTG CGG GAG ATA ATG AAG GCG TAT

GAG GAA GAC TAT GGG TCC AGC CTG GAG GAC ATC ATC CAA GCA GAC

ACA AGT GGC TAC CTG GAG AGG ATC CTG GTG TGC CTC CTG CAG GGC

entspricht, wobei gegebenenfalls nach dem letzten AGG ein Stopcodon steht und degenerierte Formen dieser DNA.

7. DNA nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie der Formel

CAA GAC GCA CAG GAT CTG TAT GCG GCC GCA AAG ATT CGT GGG
ACT GAT GAG ATG AAA TTC ATC ACC ATC CTG TAC GAG AAA ATT CGT GCC
AAG AAG ATC ATC ACC ATC AAG AAA TTC ATC AAC AAC ATC CAC AAC CAT GGC AAC
AAG AGC ATT GAG GAC ACC ACT GTG GTG AAA TGC AAC CAT GGC TCA
ACC CAC TAC TTT GCA AAG AGA CTC TAC TAC AAC ATC GTT TCA AGG AGC GAG

ATT GAC TTA AAT CTT ATC AAA TGT CAC TTC AAG AAG ATG TAC GGC

AAG ACC CTC AGC AGC ATG ATC ATG GAA GAC ACC AGC GGC GAC TAC

AAG AAC GCC CTG CTG AGC CTG GTG GGC AGC GAC CCC TGA

entspricht, wobei gegebenfalls vor dem ersten GAT ein Initiationscodon steht und degenerierte Formen dieser DNA.

- DNA nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß in den Abschnitt, der für die Linker-Sequenz zwischen der zweiten und dritten Repeat-Struktur kodiert, ein Oligonukleotid eingefügt wird, das für eine Erkennungssequenz einer spezifischen Protease kodiert.
- 9. DNA nach einem der Ansprüche 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das für Arginin +161 (VAC-α) bzw. +167 (VAC-β) kodierende Triplett ersetzt wird durch ein Codon, das für eine Aminosäure kodiert, die nicht von Trypsin als bevorzugte Spaltstelle erkannt wird, beispielsweise für Histidin.
- 10. DNA nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die für Lysin und/oder Arginin kodierenden Tripletts gezielt ersetzt werden durch Tripletts, die für Histidin kodieren.
- 11. DNA nach einem der Ansprüche 1 bis 3 und 5 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß das oder gegebenenfalls die für Cystein kodierenden Tripletts ersetzt wird/werden durch für Serin oder Valin kodierende Tripletts.
- 12. DNA nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie für ein Polypeptid/Protein mit Repeat-Bereichen kodiert.

- 13. DNA nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß sie für eine der Repeat-Bereiche kodiert.
- 14. DNA nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die für die vollständigen Repeats kodierenden Bereiche umgeordnet sind.
- 15. DNA nach einem der Ansrpüche 1-14, dadurch gekennzeichnet, daß die für die 17 Aminosäuren der konservierten Region kodierenden Bereiche modifiziert sind.
- 16. DNA nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die für die 17 Aminosäuren der konservierten Region kodierenden Bereiche vollständig oder teilweise ersetzt werden
 - a. bei den VAC-Proteinen durch Bereiche, die die entsprechenden Aminosäuren bei den Lipocortinen kodieren,
 - bei VAC-alfa durch Bereiche die die entsprechenden Aminosäuren des VAC-beta kodieren und umgekehrt,
 - c. bei Lipocortin I durch Bereiche, die die entsprechenden Aminosäuren des Lipocortins II kodieren und umgekehrt,
 - d. bei den Lipocortinen durch Bereiche, die die entsprechenden Aminosäuren bei den VAC-Proteinen kodieren oder
 - e. bei den übrigen Polypeptiden/Proteinen durch Bereiche, die die entsprechenden Aminosäuren der jeweils anderen Polypeptide/Proteine kodieren.
- 17. DNA nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Bereiche, die für das N-terminale Peptid kodieren ausgetauscht werden durch Oligonukleotide, die für das N-terminale Peptid eines der anderen, eine Repeat-Struktur aufweisenden Proteine kodiert.
- 18. DNA nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß dem N-terminalen 5'-Ende eine für den jeweiligen Wirt homologe Signalsequenz vorangestellt ist.

- 19. DNA nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, daß die Signalsequenz am 3'-Ende eine spezifische Erkennungs-Spaltstelle für eine Protease kodiert.
- 20. DNA nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß dem N-terminalen 5'-Ende eine für einen Fusionsproteinanteil kodierende Sequenz vorangestellt ist.
- 21. DNA nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, daß die für den Fusionsproteinanteil kodierende DNA am 3'-Ende eine spezifische Erkennungs-Spaltstelle für eine Protease kodiert.
- 22. DNA, dadurch gekennzeichnet, daß sie ein Allel zu einer der in der vorhergehenden Ansprüchen beschriebenen DNA darstellt.
- 23. DNA, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine degenerative Form einer der in den vorhergehenden Ansprüchen beschriebenen DNA darstellt oder daß sie aus Kombinationen verschiedener vollständiger oder Teil-Sequenzen einer der vorhergehenden Ansprüche besteht, kodierend für Hybridproteine im wesentlichen m,it vascular-antikoagulierenden Eigenschaften.
- 24. DNA, dadurch gekennzeichnet, daß sie mit einem der DNA-Moleküle nach einem der Ansprüche 1 bis 23 unter Bedingungen hybridisieren, die eine Homologie größer als 85%, vorzugsweise größer als 90% erkennen lassen, wobei die DNA aus natürlichen, synthetischen oder halbsynthetischen Ursprungs sein kann und mit den DNA-Molekülen nach einem der Ansprüche I bis 23 durch Mutation, Nukleotid-Substitutionen, Nukleotid- Deletionen, Nukleotid-Insertionen und Nukleotid- Inversionen verwandt sein kann und für ein Polypeptid/ Protein mit im wesentlichen den biologischen Eigenschaften der vascular-antigoagulierenden Proteine kodiert.

- 25. DNA nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie in einen Vektor eingefügt ist.
- 26. DNA nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daß die DNA nach einem der vorhergehenden Ansprüche in einem Vektor in funktioneller Verbindung mit einer Expressionskontrollsequenz verknüpft ist, in Mikroorganismen und Säugetierzellen replizierbar.
- 27. DNA nach einem der Ansprüche 25 oder 26, dadurch gekennzeichnet, daß der Vektor ein Plasmid ist, replizierbar in Prokaryoten.
- 28. DNA nach einem der Ansprüche 25 oder 26, dadurch gekennzeichnet, daß der Vektor ein Plasmid ist, replizierbar in Eukaryoten.
- 29. DNA nach einem der Ansprüche 25 oder 26, dadurch gekennzeichnet, daß sie in Säugetierzellen replizierbar ist.
- 30. Wirtsorganismus, dadurch gekennzeichnet, daß er mit einer DNA nach einem der Ansprüche 25 bis 29 transformiert ist.
- 31. Wirtsorganismus nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, daß er ein Prokaryot, vorzugsweise E.coli ist.
- 32. Wirtsorganismus nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, daß er ein Eukaryot ist.
- 33. Wirtsorganismus nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, daß er eine Säugetierzellinie ist.
- 34. Verfahren zur Herstellung von DNA-Molekülen die für Polypeptide/Proteine im wesentlichen mit den Eigenschaften der vascular antikoagulierenden Proteine kodieren, dadurch gekennzeichnet, daß man aus einer genomischen DNA-Bibliothek das für dieses Polypeptid kodierende Gen isoliert oder aus der zu

diesem Gen gehörenden mRNA eine komplementäre für dieses Polypeptid kodierende DNA mit Hilfe des Enzyms Revese Transkiptase herstellt oder daß die für dieses Polypeptid kodierende DNA mit Hilfe chemisch und/oder enzymatischer Verfahren hergestellt wird.

- 35. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, daß die DNA einer der in den Ansprüchen 1 bis 23 beschriebenen entspricht.
- 36. Verfahren zur Herstellung einer DNA nach einem der Ansprüche 25 bis 29, dadurch gekennzeichnet, daß man in eine mit Hilfe von Restriktionsendonukleasen geschnittene Vektor-DNA eine mit entsprechenden Enden versehene DNA einfügt, die für ein Polypetid im wesentlichen mit den Eigenschaften der vaskularantikoagulierenden Proteine kodiert.
- 37. Verfahren zur Herstellung einer DNA nach einem der Ansprüche 26 bis 29, dadurch gekennzeichnet, daß man in eine mit Restriktionsendonukleasen geschnittene Vektor-DNA, die Expressionskontrollsequenzen enthält, eine mit entsprechenden Enden versehene DNA, die für ein Polypeptid mit im wesentlichen den Eigenschaften von vaskular-antikoagulierenden Proteinen kodiert, so einfügt, daß die Expressionskontrollsequenzen die eingefügte DNA reguliert.
- 38. Verfahren zur Herstellung transformierter Wirtsorganismen nach einem der Ansprüche 30 bis 33, dadurch gekennzeichnet, daß man den Wirtsorganismus mit einem der Vektoren nach einem der Ansprüche 25 bis 29 transformiert.
- 39. Polypeptid, im wesentlichen mit den Eigenschaften der vascular-antikoagulierenden Proteine.
- 40. Polypeptid nach Anspruch 39, dadurch gekennzeichnet, daß es von einer DNA gemäß einem der Ansprüche 1 bis 23 kodiert wird.

41. Polypeptid nach Anspruch 39, dadurch gekennzeichnet, daß es der Formel

Met Ala Gln Val Leu Arg Gly Thr Val Thr Asp Phe Pro Gly Phe Asp Glu Arg Ala Asp Ala XX Thr Leu Arg Lys Ala Met Lys Gly Leu Gly Thr Asp Glu Glu Ser Ile Leu Thr Leu Leu Thr Ser Arg Ser Asn Ala Gln Arg Gln Glu Ile Ser Ala Ala Phe Lys Thr Leu Phe Gly Arg Asp Leu Leu Asp Asp Leu Lys Ser Glu Leu Thr Gly Lys Phe Glu Lys Leu Ile Val Ala Leu Met Lys Pro Ser Arg Leu Tyr Asp Ala Tyr Glu Leu Lys His Ala Leu Lys Gly Ala Gly Thr Asn Glu Lys Val Leu Thr Glu Ile Ile Ala Ser Arg Thr Pro Glu Glu Leu Arg Ala Ile Lys Gln Val Tyr Glu Glu Glu Tyr Gly Ser Ser Leu Glu Asp Asp Val Val Gly Asp Thr Ser Gly Tyr Tyr Gln Arg Met Leu Val Val Leu Leu Gln Ala Asn Arg Asp Pro Asp Ala

	•													
	-			170		-			175					180
Glv	Ile	Asp	Glu	Ala	Gln	Val	Glu	Gln	Asp	Ala	Gln	Ala	Leu	Phe
5				•		٠.						•		
				185				•	190			•		195
Gln	· Δ 1 a ·	Glv	Glu		Lvs.	Trp	Glv	Thr	Asp	Glu	Glu	Lvs	Phe	Ile
							. – .					•		
				200				•	205					210
The	T10	Dho	G1 v		Δησ	Ser	Val	Ser		Leu	Arg	I.vs	Val	
·	116	FILE	GIJ	THE		DCI	141				0	-,-		
				215					220					225
•	7		. 1/		T10	. 604	C1 11	Dho		TIO	Clu	Clu	The	
Asp	Lys	Tyr	met	Inr	tre	ser	GIY	Phe	GIII	116	GIU	GIU	TILL	ire
		•		220			•		225					240
		٠.		230	01		T	01	235	Tan	τ	T au	A 1 m	
Asp	Arg	GIU	Inr	26L	GIA	ASII	reu	Glu	GIII	Leu	Leu	Leu	HIG	Vai
				0 % 5	•		•		250					255
	_			245					250	.	41-		77 h	255
Val	Lys	Ser	He	Arg	Ser	He	Pro	Ala	Tyr	ren	Ala	GIA	ınr	Leu
								•						0.50
				260					265				_	270
Tyr	Tyr	Ala	Met	Lys	Gly	Ala	Gly	Thr	Asp	Asp	His	Thr	Leu	He
				275					280					285
Arg	Val	Met	Val	Ser	Arg	Ser	Glu	Ile	Asp	Leu	Phe	Asn	Ile	Arg
									-				•	•
				290				•	295					300
Lys	Glu	Phe	Arg	Lys	Asn	Phe	Ala	Thr	Ser	Leu	Туг	Ser	Met	Ile
				305					310					315
Lys	Gly	Asp	Thr	Ser	Gly	Asp	Tyr	Lys	Lys	Ala	Leu	Leu	Leu	Leu

320

Cys Gly Glu Asp Asp *

entspricht, wobei XX für Glu oder Asp steht und gegebenenfalls an Position 1 das Methionin abgespalten ist und das Alanin an Position 2 gegebenenfalls blockiert ist und/oder wobei gegebenenfalls Aggregationen durch beispielsweise intermolekulare Disulfidbrücken zwischen den Cysteinen an Position 316 vorliegen.

42. Polypeptid nach Anspruch 39, dadurch gekennzeichnet; daß es der Formel

Met Ala Trp Trp Lys Ala Trp Ile Glu Gln Glu Gly Val Thr Val Lys Ser Ser His Phe Asn Pro Asp Pro Asp Ala Glu Thr Leu Tyr Lys Ala Met Lys Gly Ile Gly Thr Asn Glu Gln Ala Ile Ile Asp Val Leu Thr Lys Arg Ser Asn Thr Gln Arg Gln Gln Ile Ala Lys Ser Phe Lys Ala Gln Phe Gly Lys Asp Leu Thr Glu Thr Leu Lys Ser Glu Leu Ser Gly Lys Phe Glu Arg Leu Ile Val Ala Leu Met Tyr Pro Pro Tyr Arg Tyr Glu Ala Lys Glu Leu His Asp Ala Met Lys Gly Leu Gly Thr Lys Glu Gly Val Ile Ile Glu Ile Leu Ala Ser Arg Thr Lys Asn Gln Leu Arg Glu Ile Met Lys Ala Tyr

				140					145					150
Glu	Glu	Asp	Tyr	Gly	Ser	Şer	Leu	Glu	Glu	Asp	Ile	Gln	Ala	Asp
												•		165
	٠.	•		155					160	_	_	_		165
Thr	Ser	Gly	Tyr	Leu	Glu	Arg	Ile	Leu	Val	Cys	Leu	Leu	Gln	Gly
•				170					175	-				180
Ser	Arg	Asp	Asp		Ser	Ser	Phe	Val	Asp	Pro	Ala	Leu	Ala	Leu
•														
		. •		185					190		•			195
Gln	Asp	Ala	Gln	Asp	Leu	Tyr	Ala	Ala	Gly	Glu	Lys	Ile	Arg	Gly
				200					205		-			210
Thr	Asp	Glu	Met		Phe	Ile	Thr	Ile	Leu	Суѕ	Thr	Arg	Ser	Ala
				•										
				215					220					225
Thr	His	Leu	Leu	Arg	Val	Phe	Glu	Glu	Tyr	Glu	Lys	Ile	Ala	Asn
				220					225					240
_		*	01	230	0	T1.	T	C	235	Th-	W = -	Clre	Con	
Lys	Ser	116	Glu	Asp	2er	Tie	гàз	ser	GIU	THE	urs	Gly	Ser	Leu
				245					250				٠	255
Glu	Glu	Ala	Met	Leu	Thr	Val	Val	Lys	Cys	Thr	Gln	Asn	Leu	His
										·				
				260				_	265		_			270
Ser	Tyr	Phe	Ala	Glu	Arg	Leu	Tyr	Tyr	Ala	Met	. Lys	Gly	Ala	Gly
			•	275					280)				285
Thr	Arg	Asp	Gly	Thr	Leu	ı Ile	e Arg	, Asn	Ile	Val	Ser	Arg	Ser	Glu
						•								
				290					295				_	300
Ile	Asp	Let	ı Asn	ı Leu	Ile	E Lys	5 Суз	s His	? Phe	e Lys	Lys	s Met	. Туг	Gly
				305	j;				310)	•			315
Lys	Thi	Lei	ı Ser	: Ser	Met	t Ile	e Met	t Gli	1 A5	The	: Sei	Gly	Asp	Туг

320

325

Lys Asn Ala Leu Leu Ser Leu Val Gly Ser Asp Pro *

entspricht, wobei gegebenenfalls an Position 1 das Methionin abgespalten ist und das Alanin an Position 2 gegebenenfalls blockiert ist und/oder wobei gegebenenfalls intramolekulare Disulfidbrücken zwischen den Cysteinen an den Positionen 161 und/oder 206 und/oder 250 und/oder 293 und/oder Aggregationen durch intermolekulare Disulfidbrücken zwischen den genannten Positionen vorliegen.

43. Polypeptid nach Anspruch 39, dadurch gekennzeichnet, daß es der Formel

1 5 10 15

Met Ala Gln Val Leu Arg Gly Thr Val Thr Asp Phe Pro Gly Phe

20 25 30

Asp Glu Arg Ala Asp Ala XX Thr Leu Arg Lys Ala Met Lys Gly

35 40 45

Leu Gly Thr Asp Glu Glu Ser Ile Leu Thr Leu Leu Thr Ser Arg

50 55 60

Ser Asn Ala Gln Arg Gln Glu Ile Ser Ala Ala Phe Lys Thr Leu

65 70 75

Phe Gly Arg Asp Leu Leu Asp Asp Leu Lys Ser Glu Leu Thr Gly

80 85 90

Lys Phe Glu Lys Leu Ile Val Ala Leu Met Lys Pro Ser Arg Leu

95 100 105

Tyr Asp Ala Tyr Glu Leu Lys His Ala Leu Lys Gly Ala Gly Thr

•		Asn	Glu	Lys	Val	Leu	Thr	Glu	Ile	Ile	Ala	Ser	Arg	Thr	Pro	Glu
						125					130					135
		Glu	Leu	Arg	Ala	Ile	Lys	Gln	Val	Tyr	Ģlu	Glu	Glu	Tyr	Gly	Ser .
						140					145			:		150
		Ser	Leu	Glu	Asp	Asp	Val	Val	Gly	Asp	Thr	Ser	Gly	Tyr	Tyr	Gln
					٠	155					160			•		
		Arg	Met	Leu	Val	Val	Leu	Leu	Gln	Ala	Asn	Arg				
					ei XX Meth:											lls an
					bener										an	
					Aggre						und	ode	L WO	ne i		
									,	•		•				
44	Poly	рер	tid :	nach	Ansr	ruct	30	dad	duzoi			:-1		3 _ 6		_
	•		· ·	ilucii		e acı		, uai	aurei	r ger	cenna	serci	inet	, dai	s es	der
	Form					yr uci		, ua	urci	ı ger	cennz	zeici	inec	, dai	s es	der
						or aci		, ua		ı ger	cenn,	zeici	inet	, dai	s es	
								, ua		ı ger	cenn,					5
								, ua		ı ger	·			Pro		5
						10	. 39	, ua	·	r ger	. 15					5
		nel			Glu	10					. 15	X	Asp	Pro	Asp	5 Ala 20
		nel				10 Ala					15 Asp	X	Asp	Pro	Asp	5 Ala 20 Phe
	Form	nel Gly	Ile	Asp	Glu	10 Ala 25	Gln	Val	G1u	Gln	15 Asp 30	X Ala	Asp Gln	Pro Ala	Asp Leu	5 Ala 20 Phe
	Form	nel Gly	Ile	Asp		10 Ala 25	Gln	Val	G1u	Gln	15 Asp 30	X Ala	Asp Gln	Pro Ala	Asp Leu	5 Ala 20 Phe
	Form	nel Gly	Ile	Asp	Glu	10 Ala 25	Gln	Val	G1u	Gln	15 Asp 30	X Ala	Asp Gln	Pro Ala	Asp Leu	5 Ala 20 Phe
	Form	Gly Gln	Ile	Asp	Glu	10 Ala 25 Leu	Gln Lys	Val Trp	Glu	Gln	15 Asp 30 Asp	X Ala Glu	Asp Gln Glu	Pro Ala Lys	Asp Leu Phe	5 Ala 20 Phe 35 Ile
	Form	Gly Gln	Ile	Asp	Glu Glu	10 Ala 25 Leu 40 Thr	Gln Lys	Val Trp	Glu	Gln	15 Asp 30 Asp 45 His	X Ala Glu	Asp Gln Glu	Pro Ala Lys	Asp Leu Phe	5 Ala 20 Phe 35 Ile 50 Phe
	Form	Gly Gln Thr	Ile Ala	Asp Gly Phe	Glu Glu	10 Ala 25 Leu 40 Thr	Gln Lys	Val Trp Ser	Glu Gly Val	Gln Thr	15 Asp 30 Asp 45 His	X Ala Glü Leu	Asp Gln Glu Arg	Pro Ala Lys	Asp Leu Phe Vai	5 Ala 20 Phe 35 Ile 50 Phe

				70					75					80
Asp	Arg	Glu	Thr	Ser	Gly	Asn	Leu	Glu	Gln	Leu	Leu	Leu	Ala	Val
				85					90					95
Val	Lys	Ser	Ile		Ser	Ile	Pro	Ala	Tyr	Leu	Ala-	Glu	Thr	Leu
				100					105					110
Tyr	Tyr	Ala	Met	Lys	Gly	Ala	Gly	Thr	Asp	Asp	His	Thr	Leu	Ile
				115					120					125
Arg	Val	Met	Val		Arg	Ser	Glu	Ile	Asp	Leu	Phe	Asn	Ile	Arg
				130					135					140
Lys	Glu	Phe	Arg		Asn	Phe	Ala	Thr	Ser	Leu	Tyr	Ser	Met	Ile
				145					150					155
Lys	Gly	Asp	Thr			Asp	Tyr	Lys	Lys	Ala	Leu	Leu	Leu	Leu
				160										
Cys	Gly	Glu	Asp	Asp	*									
									• •	4	- 00	at ob	+	4/04

entspricht, wobei X für Methionin oder Wasserstoff steht und/oder wobei gegebenenfalls Aggregationen durch beispielsweise intermolekulare Disulfidbrücken zwischen den Cysteinen an Position 156 vorliegen.

45. Polypeptid nach Anspruch 39, dadurch gekennzeichnet, daß es der Formel

15
Met Ala Trp Trp Lys Ala Trp Ile Glu Gln Glu Gly Val Thr Val

20
Lys Ser Ser Ser His Phe Asn Pro Asp Pro Asp Ala Glu Thr Leu

				35					40					45
Tyr	Lys	Ala	Met	Lys	Gly	Ile	Gly	Thr	Asn	Glu	Gln	Ala	Ile	Ile
				50	•				55					60
Asp	Val	Leu	Thr	Lys	Arg	Ser	Asn	Thr	GIn	Arg	Gln	Gln	Ile	Ala
•			-						•					
				65					70					75
Lvs	Ser	Phe	Lys		Gln	Phe	Glv	Lvs	Asp	Leu	Thr	Glu	Thr	Leu
1 3 3			2,5		•			-3-		•••				
			•	80					85					90.
Γ α	Con	C1	Leu		Clar	Tire	Dha	·C111		I All	Tlo	Va 1	Δla	-
LУS	ser	GIU	Leu	Ser	GIA	Lys	rne	Glu	т. 6	beu	116	Val	Alu	Beu.
				٥.	٠				7.00					105
	_	_	_	95		_			100			•••		105
Met	Tyr	Pro	Pro	Tyr	Arg	Tyr	Glu	Ala	Lys	Glu	Leu	HIŞ	Asp	Ala
								•						
				110					115					120
Met	Lys	Gly	Leu	Gly	Thr	Lys	Glu	Gly	Val	Ile	Ile	Glu	Ile	Leu
				•										
				125				•	130					135
Ala	Ser	Arg	Thr	Lys	Asn	Gln	Leu	Arg	Glu	Ile	Met	Lys	Ala	Tyr
														•
		į		140	•				145					150
Glu	Glu	Asp	Tyr	Glv	Ser	Ser	Leu	Glu	Glu	Asp	Ile	Gln	Ala	Asp
						•	•			•				-
			•	155					160	•				165
ም ክ –	°-2	C1.	Tyr		C1	A == ~	TIO	Lau			T Au	Ιρυ	Gln	
THE	ser	GIY	TÀL	ren	GIU	Tr. R	TIE	. Leu	val	oy 5	חבמ	ne a	GIII	GIA

Ser Arg

entspricht, wobei gegebenenfalls an Position 1 das Methionin abgespalten ist und das Alanin an Position 2 gegebenenfalls blockiert ist und/oder wobei gegebenenfalls Aggregationen durch beispielsweise intermolekulare Disulfidbrücken zwischen den Cysteinen an Position 161 vorliegen.

46. Polypeptid nach Anspruch 39, dadurch gekennzeichnet, daß es der Formel

X Asp Asp Val Ser Ser Phe Val Asp Pro Ala Leu Ala Leu Gln Asp Ala Gln Asp Leu Tyr Ala Ala Gly Glu Lys Ile Arg Gly Thr Asp Glu Met Lys Phe Ile Thr Ile Leu Cys Thr Arg Ser Ala Thr His Leu Leu Arg Val Phe Glu Glu Tyr Glu Lys Ile Ala Asn Lys Ser Ile Glu Asp Ser Ile Lys Ser Glu Thr His Gly Ser Leu Glu Glu Ala Met Leu Thr Val Val Lys Cys Thr Gln Asn Leu His Ser Tyr Phe Ala Glu Arg Leu Tyr Tyr Ala Met Lys Gly Ala Gly Thr Arg Asp Gly Thr Leu Ile Arg Asn Ile Val Ser Arg Ser Glu Ile Asp Leu Asn Leu Ile Lys Cys His Phe Lys Lys Met Tyr Gly

150 155 160

Lys Asn Ala Leu Leu Ser Leu Val Gly Ser Asp Pro *

Lys Thr Leu Ser Ser Met Ile Met Glu Asp Thr Ser Gly Asp Tyr

entspricht, wobei X für Methionin oder Wasserstoff steht und/oder wobei gegebenenfalls intramolekulare Disulfidbrücken zwischen den Cysteinen an den Positionen 40 und/oder 84 und/oder 127 und/oder Aggregationen durch intermolekulare Disulfidbrücken zwischen den genannten Positionen vorliegen.

- 47. Polypeptid nach einem der vorhergehenden Ansprüche, völlig frei von homologen Polypeptiden.
- 48. Polypeptid nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es ein Leader-Peptid enthält.
- 49. Polypeptid nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
 - a.daß es einen Fusionsproteinanteil enthält und/oder b.daß es aus Teilbereichen der Polypeptide nach einem der vorhergehenden Ansprüche besteht (Hybridproteine) und/oder c. daß es als Dimeres, Trimeres, Tetrameres oder Multimeres vorliegt.
- 50. Verfahren zur Herstellung von Polypeptiden im wesentlichen mit den Eigenschaften der vascular-antikoagulierenden Proteine, dadurch gekennzeichnet, daß
 - a. ein geeigneter Wirtsorganismus mit genetischen Informationen, kodierend für ein VAC-Protein transformiert,
 - b. die Information zur Produktion des VAC-Proteins im Wirtsorganismus exprimiert und
 - c. das VAC-Protein isoliert wird.
- 51. Verfahren nach Anspruch 50, dadurch gekennzeichnet, daß der Wirtsorganismus gemäß den Ansprüchen 30 bis 33 definiert ist.

- 52. Verfahren nach Anspruch 50 oder 51, dadurch gekennzeichnet, daß die genetischen Informationen in den DNA-Molekülen gemäß einem der Ansprüche 1 bis 29 enthalten sind.
- 53. Verfahren nach einem der Ansprüche 50 bis 52, dadurch gekennzeichnet, daß das VAC-Protein gemäß einem der Ansprüche 39 bis 49 definiert ist.
- 54. Polypeptid herstellbar nach einem der Ansprüche 50 bis 53.
- 55. Pharmazeutisch tolerierbare Salze der Polypeptide nach einem der Ansprüche 39 bis 49 oder 54.
- 56. Verwendung der Polypeptide nach einem der Ansprüche 39 bis 49 oder 54 zur therapeutischen oder prophylaktischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers.
- 57. Verwendung der Polypeptide nach einem der Ansprüche 39 bis 49 oder 54 zur Herstellung pharmazeutischer Präparate.
- 58. Verwendung der Polypeptide nach einem der Ansprüche 39 bis 49 oder 54 als blutgerinnungshemmende Mittel.
- 59. Verwendung der Polypeptide nach einem der Ansprüche 39 bis 49 oder 54 als antiinflammatorische Mittel.
- 60. Verwendung der Polypeptide nach einem der Ansprüche 39 bis 49 oder 54 als antirheumatisches Mittel.
- 61. Verwendung der Polypeptide nach einem der Ansprüche 39 bis 49 oder 54 in den für die Lipocortine geltenden Indikationen.
- 62. Verwendung der Polypeptide/Proteine, die Repeat-Bereiche aufweisen als blutgerinnungshemmende Mittel.

- 63. Verwendung der Polypeptide/Proteine, die Repeat-Bereiche aufweisen als Thrombin-inhibierendes Mittel.
- 64. Verwendung der Polypeptide/Proteine, die Repeat-Bereiche aufweisen als antiinflammatorische Mittel.
- 65. Verwendung der Polypeptide/Proteine, die Repeat-Bereiche aufweisen als antirheumatisches Mittel.
- 66. Verwendung der Lipocortine als blutgerinnungshemmende Mittel.
- 67. Verwendung der Lipocortine als Thrombin-inhibierende Mittel.
- 68. Verwendung der Lipocortine in den für die Proteine nach einem der Ansprüche 39 bis 49 oder 54 geltenden Indikationen.
- 69. Verwendung der Polypeptide nach einem der Ansprüche 39 bis 49 oder 54 als Thrombin-inhibierende Mittel.
- 70. Mittel zur therapeutischen Behandlung, dadurch gekennzeichnet, daß es neben pharmazeutisch inerten Trägerstoffen eine wirksame Menge eines Polypeptides nach einem der Ansprüche 39 bis 49 oder 54 enthält.
- 71. Hybrid-Zellinie, dadurch gekennzeichnet daß sie monoklonale Antikörper gegen eines der Polypeptide nach einem der Ansprüche 39 bis 49 oder 54 sezerniert.
- 72. Monoklonale Antikörper dadurch gekennzeichnet, daß sie spezifisch die Wirkung der Polypeptide nach einem der Ansprüche 39 bis 49 cder 54 ganz oder teilweise neutralisieren oder spezifisch an eines der besagten Polypeptide binden.
- 73. Verwendung der monoklonalen Antikörper nach Anspruch 73 zur qualitativen und/oder quantitativen Bestimmung eines der Polypeptide nach einem der Ansprüche 39 bis 49 oder 54

- 74. Verwendung der monoklonalen Antikörper nach Anspruch 73 zur Reinigung eines der Polypeptide nach einem der Ansprüche 39 bis 49 oder 54
- 75. Test Kit zur Bestimmung von Polypeptiden nach einem der Ansprüche 39 bis 49 oder 54 dadurch gekennzeichnet, daß er monoklonale Antikörper nach Anspruch 73 enthält.
- 76. Verfahren zur Herstellung von monoklonalen Antikörpern nach Anspruch 73 dadurch gekennzeichnet, daß Wirtstiere mit einem der Polypeptide nach einem der Ansprüche 39 bis 49 oder 54 immunisiert, B-Lymphozyten dieser Wirtstiere mit Myelomzellen fusioniert, die die monoklonalen Antikörper ausscheidenden Hybrid-Zellinien subkloniert und in vitro oder in vivokultiviert werden.
- 77. Pharmazeutisch tolerierbare Addukte und kovalente Verbindungen zwischen den Polypeptiden nach einem der Ansprüche 39 bis 49 oder 54 mit einem inerten Träger, zur therapeutischen oder prophylaktischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers.
- 78. Pharmazeutisch tolerierbare Addukte oder kovalente Verbindungen zwischen den Polypeptiden nach einem der Ansprüche 39 bis 49 oder 54 mit zum Beispiel Polyethylenglykol, zur therapeutischen oder prophylaktischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers.
- 79. Verwendung der Polypeptide nach einem der Ansprüche 39 bis 49 oder 54 als blutkonservierende Mittel.


Tryptic peptides

```
HALK
25
      GETSGDYK
P7
      WGTDEEK
P11/I
      TPEELR
P11/II
      GAGTDDHTLIR
P12
       QEISAAFK
P14
        LFGR
P15
       LYDAYELK
P16/I
      W?LYDAYELK
P16/II
       VLTEIIASR
P17
        TVTDFPGFDER
P18
       QVYEEEYGSSLEDDVVGDTS
P20/I
        YYQR
       G
        IVALMK
P20/II
       SEIDLFNIRK
P21/I
       FITIFGTR
P23/I
       KNFATSLYSMIK
P24
       S?G T D E E K F I T I F G T
P25
       DLLDDLKSELTGKFEK
P27
       GLGTDEESILTLLTSR
P29/I
       MLVVLLQANRDPDAGIDEAQ
P29/II
       VXQXAQALFQA
       XIPAYLAETLYYAMK
P30/I
       ETXGNLEQLLLAVVK
P30/II
```

BrCN-Peptides

```
BrCN 1 K G A G T D D H T L I R V
BrCN 4 I K G D T S G D Y K K A
BrCN 15 K P S R L Y D A Y E L K H A L K G A G T
N E K V L T E I I
BrCN 22 K G L G T D E E S I L T L L T S X X N A
```

F1G.0.1



j

4




FIG. 0.4/1

2.






FIG. 0. 4/2



F1G. 0.6



```
Tryptic peptide Pl6/II
```

Staph-A Peptide P20/I/6 (Subfragment of the tryptic peptide P20/I)

D D V V G D T S G Y Y R

mRNA

F1G. 1.

Tryptic peptide P30/I

X I P A Y L A E T L Y Y A M K
5' ...GAAACNCUNUACUACGCNAUGAAA... 3' MRNA
G U U G
UUA
G

3' CTCTGIIAIATIATICGITACTT 5' EBI - 118 3' CTTTGIIAIATIATICGITACTT 5' EBI - 119

VAC-alpha -285 FIG. 3. **- 18S**

VAC-alpha cDNA

CCTGCTTCACCTTCCCCTGACCTGAGTAGTCGCT

l Met ATG	Ala GCA	Gln CAG	Val GTT	5 Leu CTC	Arg (Gly T	Thr ACT	Val GTG	io Thr ACT	Asp GAC	Phe TTC	Pro CCT	Gly GGA	15 Phe TTT	45
Asp GAT	Glu GAG	Arg CGG	Ala GCT	20 Asp GAT	Ala GCA	Glu ' GAA	Thr ACT	Leu CTT	25 Arg CGG	Lys AAG	Ala GCT	Met ATG	Lys AAA		90
Leu TTG	Gly GGC	Thr ACA	Asp GAT	35 Glu GAG	Glu GAG	Ser AGC	Ile ATC	Leu CTG	40 Thr ACT	Leu CTG	Leu TTG	Thr	Ser TCC		135
Ser AGT	Asn AAT	Ala GCT	Gln CAG	50 Arg CGC	Gln CAG	Glu GAA	Ile ATC	Ser TCT	.55 Ala GCA	Ala GCT	Phe TTT	Lys aag	Thr		180
Phe TTT	Gly GGC	Arg AGG	Asp GAT	65 Leu CTT	Leu CTG	Asp GAT	Asp GAC	Leu CTG	70 Lys AAA	Sec TCA	Glu GAA	Leu CTA	Thr ACT		225
Lys AAA	Phe TTT	Glu GAA	Lys AAA	80 Leu TTA	Ile ATT	Val GTG	Ala GCT	Leu CTG	85 Met ATG	Lvs	Pro CCC	Ser TCI	· Arg	90 Leu CTT	270
Tyr	Asp GAT	Ala GCT	Tyr	95 Glu GAA	V	Lys AAA	His CAT	Ala GCC	100 Leu	I.VS	Gly GGA	A GC	a Gly r GG/	105 Thr A ACA	315
Ast AA	n Glu	ı Ly:	s Val	llo Leu A CTO		Glu GAA	Ile ATT	Ile ATT	115 Ala GCT	SAT	Arg AGO	Th:	r Pro A CC	120 Glu GAA	360
G l : GA:	u Le	u Ar G AG	g Ale A GC	125 a ile C ATO		Gln CAA	Val	l Tyt	130 G G L G G A	n Gi	u Gl A GA	u Ty A TA	r Gl T GG	135 y Ser C TCA	405
S e A G	r Le C CT	u Gl G GA	u As A GA	140 p Asi T GA	11-1	Val	Gl; GG	y As G GA	14 p Th C AC	r 5e	r Gl A GG	y Ty G TA	r Ty C TA	150 r Gln C CAG	450

Arg CGG	Met ATG	Leu TTG	Val GTG	155 Val GTT	Leu CTC	Leu CTT	Gln CAG	Δla	160 Asn AAC	Arg AGA	Asp GAC	Pro CCT	Asp GAT	165 Ala GCT	495
				170 Ala GCT	a 1 -	1/a 1	C1	Cla	175 ASD	Δla	Gln	Ala	Leu	180 Phe	540
				185 Leu CTT	fa	Two	Cly	 Thr	190	Ç. Glu	Glu	Ĺvs	Phe	195 Ile	585
Thr	Ile ATC	Phe TTT	Gly	200 Thr ACA	Arg CGA	Ser AGT	Val GTG	Ser TCT	205 His CAT	Leu TTG	Arg AGA	Ĺys AAG	Val GTG	210 Phe TTT	630
Asp GAC	Lys aag	Tyr TAC	Met	215 Thr	Ile ATA	Ser TCA	Gly GGA	Phe TTT	Gln CAA	Tie	Glu GAG	Glu GAA	Thr	225 Ile ATT	675
				230	0 1		Lau	Clu	235 Gln	i Leu	. Leu	Leu	. Ala	240 Val GTT	720
Val GTC	Lys AA	s Set	r Ile	245 Arg CGA		Ile ATA	Pro	Ala GCC	250 Tyr	1.01	ı Ala r GC	a Glu A GAO	I The	255 r Leu c CTC	765
Tyt	Ty:	- Ala	a Mei	260 L Lys G AAG		y Ala A GCT	GG(The	265 Asy A GA	3 A S 1	P Hi:	s Thi	r Le C CT	270 u Ile C ATC	810
Ar;	g Va A GT	l Me C AT	t Va G GT	27 l Sei T TC	_ 4 _	g Set	r Gl	u Ile G AT	280 a Asi T GA	o Le	u Ph G TT	e As T AA	n Il C AT	-285 e Arg C AGG	855
Ly AA	s Gl G GA	u Ph G TT	e Ar	29 g Ly G AA	- Ac	n Pho	e Al T GC	a Th C AC	29 r Se C TC	r Le	u Ty T TA	r Se T TC	r Me	300 t Ile G ATT	900
Ly AA	s Gl	y As A GA	sp Th	30 Ir Se IA TO	- C1	y As	p Ty C TA	r Ly T AA	31 s Ly .G AA	'S A1	a Le IT CI	eu Le T CI	eu Le IG C1	315 eu Leu IG CTC	
Cy To	's Gi	ly GI	iu As AA GA	32 sp As AT GA	•	LA CG	TGT	CACGG	igga <i>l</i>	\GAG(CTCC	CTGCT	rgtg'	IGCCIG	99

CACCACCCCACTGCCTTCCTTCAGCACCTTTAGCTGCATTTGTATGCCAGTGCTTAACA	1057
CATTGCCTTATTCATACTAGCATGCTCATGACCAACACATACACGTCATAGAAGAAAAT	1116
AGTGGTGCTTCTTTCTGATCTCTAGTGGAGATCTCTTTGACTGCTGTAGTACTAAAGTG	1175
TACTTAATGTTACTAAGTTTAATGCCTGGCCATTTTCCATTTATATATA	1234
GGCTAGAGTGCTTTTAGCCTTTTTTAAAAACTCCATTTATATTACATTTGTAACCATGA	1293
TACTTTAATCAGAAGCTTAGCCTTGAAATTGTGAACTCTTGGAAATGTTATTAGTGAAG	1358
TTCGCAACTAAACTAAACCTGTAAAATTATGATGATTGTATTCAAAAGATTAATGAAAA	141
ATAAACATTTCTGTCCCCCTG-polyA	1437

FIG. 4/3

Sequenced VAC-peptides: comparison with sequence

BrCN 22 KGLGTD P29/I P18 GLGTD GTVTDFPGFDER MAQVLRGTVTDFPGFDERADAETLRKAMKGLGTD . 20 10 E E S I L T L L T S X X N A Q P14 P15 QEISAAFKTLFGRDLL E.E.SILTLLTSR EESILTLLTSRSNAQRQEISAAFKTLFGRDLL 60 50 BrCN 15 KPSRLYDAYELKH P16/II W?LYDAYELK P16/I P20/II LYDAYELKH D D L K S E L T G K F E K L I V A L M K D D L K S E L T G K F E K L I V A L M K P S R L Y D A Y E L K H 90 80 70 ALKGAGTNEKVLTEII P11/II . P17 VLTEIIASRTPEELR QVYE ALKGAGTNEKVLTEIIASRTPEELRAIKQVŸĒ 120 110 100 P29/II EEYGSSLEDDVVGDTSGYYQRMLVVLLQANRD EEYGSSLEDDVVGDTSGYYQRMLVVLLQANRD 160 150 140 P11/I WGTDEEK P23/I P25 PDAGIDEAQVXQXAQALFQA S?G T D E E K F P D A G I D E A Q V E Q D A Q A L F Q A G E L K W G T D E E K F 190 180 170 ITIFGTR ITIFGT ITIFGTRSVSHLRKVFDKYMTISGFQIEETID 220

210

200

P30/II
E T X G N L E Q L L L A V V K E I P A Y L A E T L Y Y A
R E T S G N L E Q L L L A V V K S I R S I P A Y L A E T L Y Y A
230 250

BrCN 4
I K G D T S G D Y K K A

P7

N F A T S L Y S M I K G E T S G D Y K
N F A T S L Y S M I K G D T S G D Y K K A L L L L C G E D D *

320

FIG. 5/2

F16. 6.

VAC-alpha: Quadruplication of a.67 amino acid long sequence

MADVI.RCTVTDFPGFDERA

		•
DAETLRKAMKG -LGTDEESILTLTSRSN	DAETLRKAMKG -LGTDEESILTLLTSRSNAQRQEISAAFKTLFGRDLLDDLKSELTGKFEKLIVALMK	PSRLY
DAYELKHALKG-AGTNEKVLTETTASRTP	FNEKVLTE I I ASRTPEELRA I KOVYEEEYGSSLEDDVVGDTSGYYORMLVVLLO	ANRDPDAGIDEAQVI
DAQALFQAGELKWGTDEEKFITIFGTRSV	DAGALFQAGELKWGTDEEKFITIFGTRSVSHLRKVFDKYMTISGFQIEETIDRETSGNLEOLLLAVVK	SIRSIPAY
LAETLYYAMKG AGTDDHTLIRVMVSRSE	LAETLYYAMKG AGTODHTI.IRVMVSRSEIDLFNIRKEFRKNFATSLYSMIKGOTSGDYKKALLI.L.CG	EDD* .
KG-hGTDExxL1p1LApR	000000	٠
DAetl AmkG aGIDEc 1111 SRS	Lr 1 y t fG sLeddikgeTSG yeklival k d	
"Consensus":	x: 50% of amino acids identical X: 75% of amino acids identical X: 100% of amino acids identical	
: "000000"	Hydrophobic region	

11 - 00,0,0,0

VAC-beta cDNA

AGGCCTGCTCACTCCTCAGCTGCAGGAGCCAGACGTGTGGAGTCCCA GCAGAGGCCAACCTGTGTCTCTTCATCTCCGTGAGAAAGGTGCCCCCGAAGTGAAAGAG 10 5 Met Ala Trp Trp Lys Ala Trp Ile Glu Gln Glu Gly Val Thr Val ATG GCC TGG TGG AAA GCC TGG ATT GAA CAG GAG GGT GTC ACA GTG 20. Lys Ser Ser His Phe Asn Pro Asp Pro Asp Ala Glu Thr Leu AAG AGC AGC TCC CAC TTC AAC CCA GAC CCT GAT GCA GAG ACC CTC 90 35 Tyr Lys Ala Met Lys Gly Ile Gly Thr Asn Glu Gln Ala Ile Ile TAC AAA GCC ATG AAG GGG ATC GGG ACC AAC GAG CAG GCT ATC ATC 135 55 50 180 70 Lys Ser Phe Lys Ala Gin Phe Gly Lys Asp Leu Thr Glu Thr Leu AAG TCC TTC AAG GCT CAG TTC GGC AAG GAC CTC ACT GAG ACC TTG 225 85 80 Lys Ser Glu Leu Ser Gly Lys Phe Glu Arg Leu Ile Val Ala Leu AAG TCT GAG CTC AGT GGC AAG TTT GAG AGG CTC ATT GTG GCC CTT 270 100 95 Met Tyr Pro Pro Tyr Arg Tyr Glu Ala Lys Glu Leu His Asp Ala ATG TAT CCG CCA TAC AGA TAC GAA GCC AAG GAG CTG CAT GAC GCC 315 115 Met Lys Gly Leu Gly Thr Lys Glu Gly Val Ile Ile Glu Ile Leu ATG AAG GGC TTA GGA ACC AAG GAG GGT GTC ATC ATT GAG ATC CTG 360 130 125 Ala Ser Arg Thr Lys Asn Gln Leu Arg Glu Ile Met Lys Ala Tyr GCC TCT CGG ACC AAG AAC CAG CTG CGG GAG ATA ATG AAG GCG TAT 405 150 145 140 Glu Glu Asp Tyr Gly Ser Ser Leu Glu Glu Asp Ile Gln Ala Asp GAG GAA GAC TAT GGG TCC AGC CTG GAG GAG GAC ATC CAA GCA GAC 450

17/66

				155					160					165	
Thr ACA	Ser AGT	Gly GGC	Tyr TAC	_	Glu GAG	Arg AGG	Ile ATC	Leu CTG	Val GTG	Cys TGC	Leu CTC	Leu CTG	Gln CAG	GGC Gly	495
				170	C	Ser AGC	Pho	V = 1	175	Pro	Ala	Leu	Ala	180 Leu	540
Gln CAA	Asp GAC	Ala GCA	Gln CAG	185 Asp GAT	Leu CTG	Tyr TAT	Ala GCG	Ala GCA	190 Gly GGC	Glu GAG	Lys AAG	Ile	Arg CGT	195 Gly GGG	585
Thr	Asp GAT	Glu GAG	Met ATG	200 Lys AAA	n	Ile ATC	Thr	Ile ATC	205 Leu CTG	Cys TGC	Thr	Arg CGC	Ser AGT	210 Ala GCC	630
				215		n h o	Clu	Clu	220 Tvr	Glu	Lvs	·Ile	. Ala	225 Asn AAC	675
				230)			Sor	235	The	· #15	: Glv	r Sei	240 Leu CTG	720
				24:	5	- 17-1	17 - 1	lve	250 CVs) - : ፕե	- Gli	n Asi	n Lei	255 u His C CAC	765
Ser AGC	Tyr TAC	Phe	e Ala	260 a G1 A GA	•	g Let A CT(ı Tyt	Tyr	265 Ala GC0	a Me	t Ly G AA	s Gl: G GG:	y Al A GC	270 a Gly A GGG	810
Thr	· Arg	S As	p Gl	27 y Th G AC		u Ile G AT	e Arg	g Ast A AA(280 n Ile C AT	e Va	l Se T TC	r Ar A AG	g Se G AG	285 r Glu C GAG	855
				29	0		a Cv	e #1	29 < Ph	5 e 1.v	s Lv	's Me	t Ty	300 C GGC	900
				30)5	. TI	a Ma	+ G1	31 11 As	.0 :n Tt	ır Se	er Gl	iy As	· 315 sp Tyr AC TAC	945
				3:	20	[V=	.i Gl	32 v Se	25 er As	so Pi	ro	*	GCACAG	

AAGAACAAGAGCAAAGACCATGAAGCCAGAGTCTCCAGGACTCCTCACTCA	1050
CATGGACGCAGGTTGGGTGTGAGGGGGGTCCCAGCCTTTCGGTCTTCTATTTCCCTATT	1109
TCCAGTGCTTTCCAGCCGGGTTTCTGACCCAGAGGTGGAACCGGCCTGGACTCCTCTTC	1168
CCAACTTCCTCCAGGTCATTTCCCAGTGTGAGCACAATGCCAACCTTAGTGTTTCTCCA	1227
GCCAGACAGATGCCTCAGCATGAAGGGCTTGGGGACTTGTGGATCATTCCTTCC	1286
GCAGGAGCTTCCCAAGCTGGTCACAGAGTCTCCTGGGCACAGGTTATACAGACCCCAGC	1345
CCCATTCCCATCTACTGAAACAGGGTCTCCACAAGAGGGGCCAGGGAATATGGGTTTTT	1404
AACAAGCGTCTTACAAAACACTTCTCTATCATGCAGCCGGAGAGCTGGCTG	1463
TTTGTTTTAGAACACACCTCCAGCAGCTGAGAAATGAACACGAATCCATCC	1522
GAGATGCCATTAACATTCATCTAAAAATGTTAGGCTCTAAATGGACGAAAAATTCTCTC	1581
GCCATCTTAATAACAAAATAAACTACAAATTCCTGACCCAAGGACACTGTGTTATAAGA	1640
GGCGTGGGCTCCCCTGGTGGCTGACCAGGTCAGCTGCCCTGGGCCTTGCACCCCTCTGCA	1699
TGCAGCACAGAAGGGTGTGACCATGCCCTCAGCACCACTCTTGTCCCCACTGAACGGCA	1758
ACTGAGACTGGGTACCTGGAGATTCTGAAGTGCCTTTGCTGTGGTTTTCAAAATAATAA	1817
AGATTTGTATTCAACTC-polyA	1834

FIG. 7/3

F16. 8

VAC-beta: Quadruplication of a 67 amino acid long sequence

MAWWK AVI EQECUTVKSSSIIFNPDP

AAI I DVLTKRSNTQRQQI AKSFKAQFGKDLTETLKSELSGKFERLI VALMY PPYRY	YGSSLEEDIQADTSGYLERILVCLLQ GSRDDVSSFVDPALALQ	ANKSI EDSIKSETHGSLEEAMLTVVK CTONLHSY	YGKTLSSMIMEDTSGDYKNALI.SLVG SDP*	000000		yGKsLee IkseTSG lEralv Lvk
	EAKELHDAMKG-LGTKEGVIIEILASRTKNOLREIMKAYEEDYGSSLEEDIOADTSGYLERILVCLLO	DAQDI.YAAGEKIRGTDEMKFITILCTRSATHI.LRVFEEYEKIANKSIEDSIKSETHGSLEEAMI.TVVK	FAERLYYAMKG-AGTRIJGTLIRNIVSRSEIDI.NLIKCHFKKMYGKTLSSMIMEDTSGDYKNALL.SLVG	KG-hGTDExxLlp1LApR	dhe LY AMKG GT Eg 11 1L sgs tql. I k ykk yGKsLee IkseTSG lEraly Lvk	•

x: 50% of amino acids identical X: 75% of amino acids identical X: 100% of amino acids identical "Consensus":

"000000" : Hydrophobic region

Amino acid composition

	VA	C-alpha	VAC-beta		
Ala Cys Asp Asn Glu Gln Phe Gly His Ile Lys Leu Met Pro Arg Ser Thr Val Trp Tyr	26 1 25 6 29 12 13 22 3 18 22 38 5 19 21 23 16 1	(8,1%) (0,3%) (7,8%) (1,9%) (9,1%) (3,8%) (4,1%) (6,9%) (5,6%) (11,9%) (11,9%) (11,9%) (11,9%) (11,9%) (5,6%) (5,6%) (5,6%) (5,6%) (5,6%) (6,8%) (6,8%) (7,2%) (6,8%) (7,2%) (7,2%) (7,2%) (7,2%) (7,2%) (7,2%) (7,2%)	25 4 20 9 29 12 9 20 6 23 27 33 11 6 15 27 21 13 3	(7,7%) (1,2%) (6,1%) (2,8%) (8,9%) (3,7%) (2,8%) (6,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%) (10,1%	
	MW	MW	= 36837.		
charged:	98	(30,6%)	97	(29,6%)	

F1G. 9.




FIG. 10.

F16.11.

Comparison of VAC-alpha and VAC-beta

	PSRLY .	ANRDPDAG-IDEAQVEQ GSDVSSFV.P.LAL.	SIRSIPAY CTONLHS.	EDD* S.P*
MAQVLRGTVTDFPGFDERA	атрћа DAETLRKAMKGLGTDEESILTLLTSRSNAQRQEISAAFKTLFGRDLLDDLKSELTGKFEKLIVALMK	афра DAYELKHALKGAGTNEKVLTEIIASRTPEELRAIKQVYEEEYGSSLEDDVVGDTSGYYQRMLVVLLQ	alpha Dagalfgagelkwgtdeekfitifgtrsvshlrkvfdkymtisgfgieetidretsgnleglllavvk	alpha laetlyyamkgagtddhtlirvmvsrseidlfnirkefrknfatslysmikgdtsgdykkallllg
MAWMKAWIEQEGVKSSSH.NPDP	betaYIN.QA.IDVKTQ.AKSAQKTETSRY	beta E.KHD.MLK.G.IILКNQE.МКАDE.IQALE.IС	betaD.YaKirmLcAtlree.ek.anksds.KsH.SEam.T	bela FRR.GNINL.KCH.K.MYGKT.SMENS.V.
alpha	a I pha	a I pha	alpha	alpha
beta	bet <i>ë</i>	beta	bet	bet


Comparison of VAC-alpha and beta cDNA

VA VB	ATGGCACAGGTTCTCAGAGGCACTGTGACTTCCCTGGA ATGGCCTGGTGGAAAGCCTG.ATTG.ACAGGAGG.T.TAAGAG.AG.T.CCAC	42 60
VA VB	TTTGATGAGCGGGCTGATGCAGAAACTCTTCGGAAGGCTATGAAAGGCTTGGGCACAGATCA.CCCAGACC	102 120
VA VB	GAGGAGAGCATCCTGACTCTGTTGACATCCCGAAGTAATGCTCAGCGCCAGGAAATCTCTCGCTA.CGA.GC.CCAAGACCA.GGC.GG.C	162 180
VA VB	GCAGCTTTTAAGACTCTGTTTGGCAGGGATCTTCTGGATGACCTGAAATCAGAACTAACT	222 240
VA VB	GGAAAATTTGAAAAATTAATTGTGGCTCTGATGAAACCCTCTCGGCTTTATGATGCTTAT	282 300
VA VB	GAACTGAAACATGCCTTGAAGGGAGCTGGAACAAATGAAAAAGTACTGACAGAAATTATTGC.TG.CACTTACGGGGTCA.C.TTGCC.G	342 360
VA VB	GCTTCAAGGACACCTGAAGAACTGAGAGCCATCAAACAAGTTTATGAAGAAGAATATGGCCTCCAAGA.CC.GC.G.AGA.TGA.G.CGG	402 420
VA VB	TCAAGCCTGGAAGATGACGTGGTGGGGGACACTTCAGGGTACTACCAGCGGATGTTGGTGCGGA.CCAA.CAAAGTCCTGGACC	462 480
VA VB	GTTCTCCTTCAGGCTAACAGAGACCCTGATGCTGGAATTGATGAAGCTCAAGTTGAACAA TGCGGC.GGTGATGAGCA.CTTGCCCGGC.C.G.CC.TC	522 540
VA VB		582 600
AV EV		639 660


/A /B	ATGACTATATCAGGATTTCAAATTGAGGAAACCATTGACCGCGAGACTTCTGGCAATTTAGAAATG.CAACAAGAGCC.GCA.GA.TCCATCAC.G	699 720
VA VB	GAGCAACTACTCCTTGCTGTTGTGAAATCTATTCGAAGTATACCTGCCTACCTTGCAGAGG.GGCCA.GCAGC.CC.AACC.C.ACAGT	759 780
A V B V	ACCCTCTATTATGCTATGAAGGGAGCTGGGACAGATGATCATACCCTCATCAGAGTCATGGGGGGG	819 840
VA VB	GTTTCCAGGAGTGAGATTGATCTGTTTAACATCAGGAAGGA	879 900
VA VB	ACCTCTCTTATTCCATGATTAAGGGAGATACATCTGGGGACTATAAGAAAGCTCTTCTG .AGA.CCAGCAGC.TACCAGCCCCCG	939 960
VA VB	CTGCTCTGTGGAGAAGATGAC	960 981

FIG. 12/2

HYDROPHOBIC | HYDROPHILIC



HYDROPHOBIC | HYDROPHILIC




Comparison VAC/VAC-beta/Lipocortin 1/Lipocortin 11

	PSRLY PPYRY TPAQF TPAQY	ANRDPDAG-IDEAQVEQ GSRDDVSSFVDPALALO GDRSEDFGVNED-LADS GRRAEDGSVIDYELIDQ	SIRSIPAY CTQNLHSY CATSKPAF CIQNKPLY	EDD* SDP* GUS* GUD*	
MAQVLRGTVTDFPGFDERA MAWVSEFLKQAWF1ENEQEYVQTVKSSKIGPDP MSTVHE1LCKLSLEGDIISTPPSAYGSVKPYTNFDAER	DAETLYKAMKGLGTDEESILTLLTSRSNAQRQEISAAFKTLFGRDLLDDLKSELTGKFEKLIVALMK DAETLYKAMKGIGTNEQAIIDVLTKRSNTQRQQIAKSFKAQFGKDLTETLKSELSGKFERLIVALMY DVAALHKAIMVKGVDEATIIDILTKRNNAQRQQIKAAYLQETGKPLDETLKKALTGHLEEVVLALLK DALNIETAVKTKGVDEVTIVNILTNRSNVQRQDIAFAYQRHTKKELPSALKSALSGHLETVILGLLK	DAYELKHALKGAGTNEKVLTEI I ASRTPEELRA I KQVYEEEYGSSLEDDVVGDTSGYYQRMLVVLLQ EAKELHDAMKGLGTKEGVI I EI LASRTKNQLRE I MKAYEEDYGSSLEEDI QADTSGYLERI LVCLLQ DADELRAAMKGLGTDEDTLI EI LASRTNKEI RDI NRVYREELKHDLAKDI TSDTSGDFRNALLSLAK DASELKASMKGLGTDEDSLI EI I CSRTNOELQEI NRVYKEMYKTDLEKDI I SDTSGDFRKLMVALAK	DAQAL FQAGELKWGTDEEKFITI FGTRSVSHLRKVFDKYMTISGFQIEETIDRETSGNLEQLLLAVVK DAQDLYAAGEKIRGTDEMKFITILCTRSATHLLRVFEYEKIANKSIEDSIKSETHGSLEEAMLTVVK DARALYEAGERRKGTDVNVFNTILTTRSYPQLRRVFQKYTKYSKHDHNKVLDLELKGDIEKCLTAIVK DARELYDAGVKRKGTDVPKVISIMTERSVCHLQKVFERYKSYSPYDHLESIKKEVKGDLENAFLNLVQ	LAETLYYAMKGAGTDDHTLIRVMVSRSEIDLFNIRKEFRKNFATSLYSMIKGDTSGDYKKALLLLCG FAERLYYAMKGAGTRDGTLIRNIVSRSEIDLNLIKCHFKKMYGKTLSSMIMEDTSGDYKNALLSLVG FAEKLHOAMKGVGTRHKALIRIMVSRSEIDMNDIKAFYOKMYGISLCOAILDETKGDYEKILVALCG FADRLYDSMKGKGTRDKVLIRIMVSRSEVDMLKIRSEFKKKYGKSLYYYIQQDTKGDYOKALLYLCG	F16.14.
MAMVSEFI	DAETLRKAMKGLGTDEESILTLLTSRSN. DAETLYKAMKGIGTNEQAIIDVLTKRSN. DVAALIIKAIMVKGVDEATIIDILTKRNN. DALNIETAVKTKGVDEVTIVNILTNRSN	DAYELKHALKGAGTNEKVLTEI IASRTP EAKELHDAMKGLGTKEGVI I EI LASRTK DADELRAAMKGLGTDEDTLI EI LASRTN DASELKASMKGLGTDEDSLI EI I CSHTN	DAQALFQAGELKWGTDEEKFITIFGTRS DAQDLYAAGEKIRGTDEMKFITILCTRS DARALYEAGERRKGTDVNVFNTILTTRS DARELYDAGVKRKGTDVPKWISIMTERS	LAETLYYAMKGAGTDDH FAERLYYAMKGAGTRDG FAEKLHQAMKGVGTRHK FADRLYDSMKGKGTRDK	 human VAC-alpha human VAC-beta human Lipocortin I human Lipocortin II
VA VB LC1 LC11	VA VB LCI LCII	VA VB LCI LCI	VA VB LC1 LC1	VA VB LC1 LC11	VA VB LC1

27/66

Sequence of the alkaline phosphatase gene component in plasmid pRH284T

10	A CTCC A ATO	30	40	50	60
AATTGGAGATTATCGTC		CCTTCGCAA	TATGGCGCAAA	ATGACCAA	CAGCGGT
CCTCTAATAGCAG		CGAAGCGTT	ATACCGCGTTI	TACTGGTT	GTCGCCA
70	80	90	100	110	120
TGATTGATCAGGTAGAG	GGGGCGCT(STACGAGGT	AAAGCCCGATG	CCAGCATI	CCTGACG
ACTAACTAGTCCATCTC	CCCCGCGA(CATGCTCCA	TTTCGGGCTAG	CGGTCGTA	AGGACTGC
130	140	150	160	170	180
ACGATACGGAGCTGCTG	CGCGATTA	CGTAAAGAA	GTTATTGAAGC	CATCCTCGT	CAGTAAA
TGCTATGCCTCGACGAC	CGCGCTAAT	GCATTTCTT	CAATAACTTC	STAGGAGCA	AGTCATTT
190	200	210	220	230	240
AAGTTAATCTTTTCAAC	CAGCTGTCA	TAAAGTTGT	CACGGCCGAG	ACTTATAG:	CCCTTTG
TTCAATTAGAAAAGTTC	CTCGACAGT	ATTTCAACA	GTGCCGGCTC	IGAATATC	ACCGAAAC
250 TTTTTATTTTTTAATG AAAAATAAAAAATTAC	ATAAACGAG	270 <u>GAG</u> AGGTT <u>C</u> CTCTCCAAC	280 <u>SAGGT</u> GATTTT CTCCACTAAAA RBS	290 <u>ATG</u> AGCTC TACTCGAG Sacl	300 GAATTCAT CTTAAGTA ECORI C
310 CGATAAGCTTGGATCC GCTATTCGAACCTAGG laI HindIIIBamH1	CAGCTGGCG	330 GCCCGGCA GCGGCCGT	340 GTGAATTTTCG CACTTAAAAGC	350 CTGCCGGG GACGGCCC	TGGTTTTT ACCAAAAA
360 TTGCTGC AACGACGAGCT	370				




حه


Bam II


Bam! II


dun

7









F16.21








FIG. 22.










FRSATZRI ATT









ERSATZBLATT

FIG. 29. 3.2 µg VAC 0 40787 MW Marker 1/10 MW Marker 10 -3 X M 94 67 43 67 43 30 30 20.1 20.1 14.4 14.4

Coomassie — Blue

FIG. 30.

15 % SDS - PAGE

Gel part I: Silver staining

Gel part II: Coomassie staining

STACKING GEL

7.5 μl Marker (Pharmacia) 1:50 1μg rec. VACα, 996 FPLC+011 0.5μg rec. VACα, 996. FPLC+011	1 µg rec. VACCC1 996.FPLC 0.5µg rec. VACCC1 996.FPLC	1 µg rec. VACC 1 996.FPLC 0.5µg rec. VACC 005 FPLC	1 mg rec. Valoc 390. it c + 011 0.5 mg rec. Valoc 1 996. FPLC + 011	1μg nat. VAC∝ 40787
43		Gel p Coomas	part I	

FIG. 31.




FIG. 32.

LKB AMPHOLINE PAGIF pH 3.5-9.5

Coomassie staining

trypsinogen (9·3) lentil lectin—basic band (8·65) lentil lectin—middle band (8·45) lentil lectin—acidic band (8·15)	myoglobin-basic band (7·35) myoglobin-acidic band (6·85) human carbonic anhydrase B (6·5!	bovine carbonic anhydrase B (5·8	β -tactoglobutin A (5·2) soybean trypsin inhibitor (4·55	amyloglucosidase (3·5)
1.5	(1	1	1	\$
**************************************	: [[(į	4

pI Marker (Pharmacia) 10 µl 4·2µg nat. VAC 40787 4·2µg rec. VAC 1004.FPLC 1µg nat. VAC 40787 1µg rec. VAC 1004.FPLC pI Marker (Pharmacia) 10 µl








FIG. 32a.








F16.36.



₹.

æ



VACB-4 12.5% SDS - PAGE

FIG. 38.

COOMASSIEFÄRBUNG

7-5µl LMW- Marker 1:10 (Pharmacia

= CRUDE EXTRAC 0.5 µg VAC /3 - Stand \$ 200 Roh 5.55 µg Silica OL = SILICA FLOW


9.5 µg Fr. 80-102

10 µg Fr. 125 10 µg Fr. 160 10 µg Fr. 103-170 = SILICA POOL

0.5 µg VAC /3- Stand. 5200


4. VAC-8 in process Proben


FIG. 39.




15 % SDS-PAGE + DTT **₹**∂

FIG. 40.





Ŧij



9

~

*

BECKMAN AMINOSÄUREANALYSE

01. Februar 1988

Probe:

5,

.. - --, - . - . -

3vacb

Laufnummer:

22

Protein:

VAC "beta"

Fig. 43a

Chromatogramm vom: 21.04.88 3:17:38

Injiziertes Volumen: 50 µl

Standardwerte:

Durchschnittswerte von Lauf 22

Name	IST	SOLL	rel IST	rel IST (II)	rel SOLL
ATHEOUTAS SELUOYAS PRESERVACION ALEVAS MLEURES NARG	14.07 11.34 12.37 13.38 11.22 5.46 12.65 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 13.49	29 217 416 205 43 1033 149 67 15	29. 455 29. 466 23. 999 11. 31 25. 666 12. 658 12. 75 20. 75	5537139004318584616 55925512247211583	74,60-10,60-2,60,505050505050505050505050505050505050
Name	Soll	korr.IST	ger.IST	ABW	ABW (%)
AHELUOYASLTEURESS3G AHELUOYASLTEURESS3G ALEYHISS3G	29 217 160 205 130 331 496 705 15	29.23 23.16 25.64 11.81 24.81 12.5.61 12.5.39 13.60 26.29 13.60 26.29 15.01	293 2261 1255 1200 1500 1500 1500 1500 1500 150	++-+++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.777 10.283 5.0427 86.2382 1.2382 1.26666 11.35666 11.2877 11.30093
AS -	Sollwert:		=	323	

AS - Istwert:

Gesamtabweichung:

Durchschnittliche Proteinmenge:

330

21.20 AS / 6.56%

= 0,510 nanoMol

20

	FIG. 4	3b.		
3v acb	1 / 21 / 88		9:17:36	•
Acquisition method Units Channel Injection Run time Injection volume Internal standard amt Mode Version Description	ninrept None 1 -1 60.00 min -1 µL 1.00 Analysis REV 4.0	Quantitatic System num Vial Total inject Sample rate Sample amo Scale facto Response fa Channel to	ber ions unt or	ninrept 2 -1 -1 2 per sec 1.00 1.00 Replace
250.000 122.500 -5.000				
0 5 10	15 20 25	30 35 4	0 45 50	5 5
Peak Name Ret time	Minutes Area Heig	ht Type	Amount	RF
ASP 7. 67 THR 9.13 SER 9.67 GLU 12.20 PRO 13.73 GLY 16.80 ALA 18.27 CYS 19.60 VAL 20.13 MET 20.93 ILE 22.47 LEU 23.07 LYR 24.60 PHE 26.33 HIS 142.73 HIS 145.93 ARG 51.87	1 29 49 108		10. 797 7. 982 9. 327 15. 972 15. 469 9. 471 10. 8645 11. 8916 11. 8916 11. 8916 11. 856 10. 856	19342e++006666666666666666666666666666666666

Probe :3.VACB * S2BB	* FR 54- 5P		
SEQUENCER PROGRAMM A 3PAPTH	bbauschritte 1 + 3P		PIH-AS nachweisbar bis Abbauschritt Nr.3P
36µg [N/nmol] Probe gelä	st 14 75 µl Ø.1%	AM الر25×3 ; TFA	Sequenzer aufgetragen
SEQUENZ: 1 . 2 AS: 1-10 I. X _{ALA} ¹⁾ -TRP - 1 AS: 11-20 I. GLY - VAL - 1 AS: 21-3Ø I. ASN - PRO - (A AS: 31-4Ø I. LYS - X _{ALA} ¹⁾ -M	SP)41-PRO-(ASP)	-XALA"1-XGLU -THE	R — LEU — TYR—
1) PTH-ALA Nachaeis gestört dan 2) Retentionszeiten verschoben v 3)	on 1·P5' auf 2·45' — 5·50' auf 4·80'	12000000 IV(AS8)≘	nmol PTH-AS [SEQUENZER] DEFEKT!]

Mengenabschätzung:

Kompo- nente	Amino	säure bis	Menge (nmol)	Antei]
Ī	1	(3P)	~Ø.45	1
II	7			
III				
IY				
Y				
VI.				
VII				
VIII				

Vergleiche mit 1248

Gesamtmenge ~ £.45nmol (beechnet aus ILE7-8.80%RY)

FIG. 44.

VAC /3 STANDARD VERGLEICH

COOMASSIEFÄRBUNG

12.5% SDS PAGE

FIG. 45.

ILLMW-Marker 1 Stand von VACA]	10 ug VAC B- Stand Amp 1 ohne DII	1g ————————————————————————————————————	g VAC B- Stand Amp 2 ohne DII	1g mit DII	g VAC β - Stand Amp 3 verd. altes H_20	g verd. neues H20	7.5µl LMW- Marker 1:10 (Pharmacia)	
η-5 μ 1 μg	<u> </u>	10,	10 µ g	10 д д	10 Jug	1 49	1 mg	7.5	, M
			*****		i Xor	, d.			94,000 66,000 43,000
1 2 3			5	6	7	8	G G	- - - 1 10	-

FIG. 46a.

ISOELEKTRISCHE FOKUSSIERUNG (PAGIF)

pH - Bereich: 3.5-9.5


Platten-Fabrikat : LKB-PAGplate

Elektrodenlösungen: Anode 1 M Phosphorsäure

Kathode 1 M Natronlauge

Laufzeit: Präfokussierung 500 Vh


Fokussierung 3000 Vh



- IEF-Marker
- -22µg VAC B-4
- -11µg VAC B-4
- -18µg VAC B-4 +DTT
- 9µg VAC B-4 +DTT
- IEF-Marker


VAC β-4 : 1. Hauptbande pI 5.35

2. Hauptbande pI 5.45 + DTT




ERSATZBLATT


Fig. 47



% of maximal formed II_a







F13. 50





Fig. 51





INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 4: C12N 15/00, 1/20, 5/00 C12P 21/00, 21/02, A61K 37/02 A01N 1/00, G01N 33/86 C07K 13/00 (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 88/07576

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum:

6. Oktober 1988 (06.10.88)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP88/00266

A3

(22) Internationales Anmeldedatum: 26. März 1988 (26.03.88)

(31) Prioritätsaktenzeichen: P 37 10 309.1 P 37 10 364.4

P 37 10 430.6 P 37 37 367.6

(32) Prioritätsdaten: 28. März 1987 (28.03.87)

28. März 1987 (28.03.87) 28. März 1987 (28.03.87)

November 1987 (04.11.87)

(33) Prioritätsland:

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US):
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH [DE/DE]; Postfach 200, D-6507 Ingelheim am
Rhein (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HAUPTMANN, Rudolf [AT/AT]; Döllachstr. 22, A-2483 Ebreichsdorf (AT). MAURER-FOGY, Ingrid [AT/AT]; Lindauergasse 35, A-1238 Wien (AT). BODO, GERHARD [AT/AT]; Belghofergasse 27/5, A-1120 Wien (AT). SWETLY, Peter [AT/AT]; Hietzinger Hauptstr. 40B, A-1130 Wien (AT). STRATOWA, Christian [AT/AT]; Schellinggasse 3/9, A-1010 Wien (AT). FALKNER, Edgar [AT/AT]; Strohberggasse 9/6, A-1120 Wien (AT). ADOLF, Günther [AT/AT]; Stiftgasse 15-17/10, A-1070 Wien (AT). REUTLINGSPERGER, Christian, Maria, Peter [NL/NL]; Looiersgracht 17, NL-6211 JK Maastricht (NL).

(81) Bestimmungsstaaten: DK, FI, HU, JP, KR, NO, SU, US.

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 26. Januar 1989 (26.01.89)

(54) Title: VASCULAR ANTICOAGULANT PROTEINS, DNAs WHICH CODE FOR THEM, MANUFACTURE AND APPLICATION THEREOF


(54) Bezeichnung: VASCULAR-ANTIKOAGULIERENDE PROTEINE, DNA DIE DIESE KODIEREN, UND HERSTELLUNG VERWENDUNG

(57) Abstract

The subject matter of the invention concerns biologically active proteins, DNA molecules which code for them, process for manufacturing them, and the application of said proteins.

(57) Zusammenfassung

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind biologisch aktive Proteine, die für diese kodierenden DNA-Moleküle, Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwendung.



LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT AU BB BE BG BJ BR CF CG CM DE DK FI	Österreich Australien Barbados Belgien Bulgarien Benin Brasilien Zentrale Afrikanische Republik Kongo Schweiz Kamerun Deutschland, Bundesrepublik Dänemark Finnland	FR GA GB HU IT JP KP KR LI LK LU MC MG ML	Frankreich Gabun Vereinigtes Königreich Ungarn Italien Japan Demokratische Volksrepublik Korea Republik Korea Liechtenstein Sri Lanka Luxemburg Monaco Madagaskar Mali	MR MW NL NO RO SD SE SN SU TD TG US	Mauritanien Malawi Niederlande Norwegen Rumänien Sudan Schweden Senegal Soviet Union Tschad Togo Vereinigte Staaten von Amerika
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		International Application No PC	r/EP88/00266	
I. CLASS	IFICATION OF SUBJECT MATTER (If several cla	ssification symbols apply, Indicate all) ⁶		
	to International Patent Classification (IPC) or to both I 5/00; C 12 P 21/00 Cl. 4 37/02; A 01 N 1/00;	National Classification and IPC C12N; 21/02; A 61 K G01N 33/86; C07K 13/0	15/00; 1/20;	
	SEARCHED	00 (N 33/00) CO/N 13/0		
		mentation Searched 7		
Classification	n System	Classification Symbols		
	.			
Int.	C1.4 C12N; A 61 K			
		er than Minimum Documentation ents are included in the Fields Searched ⁶		
III. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		1	
Category *	Citation of Document, 11 with Indication, where	appropriate, of the relevant passages 12	Relevant to Claim No. 13	
X	EP, A, 0181465 (BOEHRINGMBH) 21 May 1986, see (cited in the application)	the whole document	1,2,3,39, 40,41,42, 58,70	
A	WO, A, 86/06100 (BIOTEC PARTNERS LTD) 23 Octobe			
Х	WO, A, 86/04094 (BIOGEN see the whole document	N N.V.) 17 July 1986,	39	
E	WO, A, 88/05659 (ZYMOGE August 1988, see the wh		66,67	
T	European Journal of Bio 1988, (Amsterdam, NL) I "Cloning and expression vascular anticoagulant, phospholipid-binding pr 592, see the whole docu	. Maurer-Fogy et al. of cDNA for human a Ca ² +-dependent otein", pages 585-	1-79	
Т	Cell, vol. 55, no. 1-3, Cell Press (Cambridge, et al.: "Diversity in t	MA, US) M.R. Crompton	/	
*Special categories of cited documents: 10 "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "CERTIFICATION "T" later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying to principle or theory underly				
Date of the	Actual Completion of the International Search Ovember 1988 (29.11.88)	Date of Mailing of this International Se 14 December 1988		
_	al Searching Authority Opean Patent Office	Signature of Authorized Officer		

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM THE SECOND SHEET	-2-
Calpactin Family", pages 1-3, see the whole document	66,67
V. OBSERVATIONS WHERE CERTAIN CLAIMS WERE FOUND UNSEARCHABLE 1	
This interestings search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2) (a) for	r the following reasons:
1. Claim numbers because they relate to subject matter not required to be searched by this Author	rity, namely:
The transmission of complete the part complete	vith the prescribed require-
2. Claim numbers, because they relate to parts of the international application that do not comply we ments to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:	
	and and third settlences of
3. Claim numbers because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the sec PCT Rule 6.4(a).	ore and and some or
VI. OBSERVATIONS WHERE UNITY OF INVENTION IS LACKING 2	
This international Searching Authority found multiple inventions in this international application as follows:	
See form PCT/ISA 206 dated 15 September 1988	
1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report co	overs all searchable claims
As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international those claims of the international application for which fees were paid, specifically claims:	
No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search invention first mentioned in the claims; it is covered by claim numbers:	arch report is restricted to
MIE INTERNATION TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	
4. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, the International S	iearching Authority did not
Invite payment of any additional fee. Remark on Protest	
The additional search fees were accompanied by applicant's protest.	
No protest accompanied the payment of additional search fees.	

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

EP 8800266

SA 21678

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 05/12/88

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP-A- 0181465	21-05-86	DE-A- 3533516 AU-A- 4768285 NL-A- 8402904 JP-A- 61137822 US-A- 4736018 NL-A- 8500601	03-04-86 27-03-86 16-04-86 25-06-86 05-04-88 01-10-86
WO-A- 8606100	23-10-86	AU-A- 5770786 EP-A- 0218696 JP-T- 63500561	05-11-86 22-04-87 03-03-88
WO-A- 8604094	17-07-86	AU-A- 5318286 EP-A- 0209568 JP-T- 62501679	29-07-86 28-01-87 09-07-87
WO-A- 8805659	11-08-88	Keine	

I. KLASSIFIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehreren Klassifikationssymbolen sind alle anzugeben) 6					
Nach o	Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC 10t. Cl. 2 N 15/00; 1/20; N 5/00; C 12 P 21/00; 21/02; A 61 K 37/02; A 01 N 1/00; G 01 N 33/86; C 07 K 13/00				
			77 10 257 00		
II. RECH	ERCHIERT	E SACHGEBIETE . Recherchierter M	indomnaifmatt7		
			Klassifikationssymbole		
Klassifikat	ionssystem		Klassifikationssymoole		
Int. Cl.4		C 12 N; A 61 K			
		Recherchierte nicht zum Mindestprüfstoff g unter die recherchierte	ehörende Veröffentlichungen, soweit diese en Sachgebiete fallen ⁸		
III. EINSC	HLÄGIGE	VERÖFFENTLICHUNGEN ⁹		**************************************	
Art°		nung der Veröffentlichung ¹¹ ,soweit erforderlich	n unter Angabe der maßgeblichen Teile ¹²	Betr. Anspruch Nr. 13	
	EP, A, 21 si	0181465 (BOEHRINGER IN . Mai 1986, ehe das ganze Dokument r Anmeldung erwähnt)		1,2,3,39, 40,41,42, 58,70	
A		86/06100 (BIOTECHNOLOG D) 23. Oktober 1986	Y RESEARCH PARTNERS		
X		86/04094 (BIOGEN N.V.) ehe das ganze Dokument	17. Juli 1986,	3,9	
E	WO, A, 88/05659 (ZYMOGENETICS INC.) 11. August 66,67 1988, siehe das ganze Dokument				
T	(A I. ex an bi	an Journal of Biochemist msterdam, NL) Maurer-Fogy et al.: "C pression of cDNA for hu ticoagulant, a Ca ²⁺ -depending protein", Seiten	loning and man vascular endent phospholipid-	1-79	
		ehe das ganze Dokument			
"A" Veröf defini "E" ältere tional	ffentlichung iert, aber ni s Dokumen ien Anmelde	n von angegebenen Veröffentlichungen 10: , die den allgemeinen Stand der Technik cht als besonders bedeutsam anzusehen ist t, das jedoch erst am oder nach dem interna- datum veröffentlicht worden ist	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach der meldedatum oder dem Prioritätsdatum ist und mit der Anmeldung nicht kollic Verständnis des der Erfindung zugru oder der ihr zugrundeliegenden Theorie	veröffentlicht worden liert, sondern nur zum ndeliegenden Prinzips angegeben ist	
zweif fentli nannt ander	"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genammten Veröffentlichung belagt werden scil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruch te Erfindung kann nicht als neu oder auf erfinderischer Tätig- keit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruch te Erfindung kann nicht als neu oder auf erfinderischer Tätig- keit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruch te Erfindung kann nicht als neu oder auf erfinderischer Tätig- keit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruch "Y" Veröffentlichung von besonderer Be				
**To veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht **To veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht **To veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldeda- **To veröffentlichung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung für einen Fachmann naheliegend ist					
tum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffent- licht worden ist					
	EINIGUNG				
		sses der internationalen Recherche er 1988	Absendedatum des internationalen Recherc	EC 1988	
[nterns	Internationale Recherchenbehörde Unterschrift des bevoordischtigten Bediensteten				
113651116		Europäisches Patentamt		IN DER PUTTEN	

		3		
WEITER	RE ANGABEN ZU BLATT 2			
T	Cell, Band 55, Nrn. 1-3, 7. Oktober 1988 Cell Press (Cambridge, MA, US) M.R. Crompton et al.: "Diversity in the Lipocortin/Calpactin Family", Seiten 1-3 siehe das ganze Dokument	66,67		
	AND GEOLOGICAL SPINIES	N HARENI		
٧.	BEMERKUNGEN ZU DEN ANSPRÜCHEN, DIE SICH ALS NICHT RECHERCHIERBAR ERWIESE	rernationalen		
Gemäß Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a sind bestimmte Ansprüche aus folgenden Gründen nicht Gegenstand der internationalen Recherche gewesen: 1. Ansprüche Nr weil sie sich auf Gegenstände beziehen, die zu recherchieren die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich				
2. Ansprüche Nr, weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich				
з. 🔲	Ansprüche Nr, weil sie abhängige Ansprüche und nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6	.4 a) PCT abgefaßt sind.		
141 [44]	BEMERKUNGEN BEI MANGELNDER EINHEITLICHKEIT DER ERFINDUNG ²			
VI.X BEMERKUNGEN BEI MANGELNDER EINHEITEIGNACH DER EINHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIGHEITEIG				
	Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche der internationalen Anmeldung.			
2. 🗀	Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, e tionale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche der internationalen Anmeldung, für die Gebühren gezahlt w	orden sind, nämlich		
3.	Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der int bericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; sie ist in folgenden Ar	ernationale Recherchen- Isprüchen erfaßt:		
Bemerku	Da für alle recherchierbaren Ansprüche eine Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden k sätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Internationale Recherchenbehörde eine solche Gel Ing hinsichtlich eines Widerspruchs zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.	onnte, der eine zu- bühr nicht verlangt.		
∑ Die	Zahlung zusätzlicher Gebühren erfolgte ohne Widerspruch.			

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.

EP 8800266 SA 21678

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten

Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am 05/12/88 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP-A- 0181465	21-05-86	DE-A- 3533516 AU-A- 4768285 NL-A- 8402904 JP-A- 61137822 US-A- 4736018 NL-A- 8500601	03-04-86 27-03-86 16-04-86 25-06-86 05-04-88 01-10-86
WO-A- 8606100	23-10-86	AU-A- 5770786 EP-A- 0218696 JP-T- 63500561	05-11-86 22-04-87 03-03-88
WO-A- 8604094	17-07-86	AU-A- 5318286 EP-A- 0209568 JP-T- 62501679	29-07-86 28-01-87 09-07-87
WO-A- 8805659	11-08-88	Keine	